

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| Id | Quesito | Risp_esatta | Risp_errata_1 | Risp_errata_2 | Risp_errata_3 | Materia |
|-----------|--|---|---|---|---|--------------------------|
| 1 | Cos'è la compromissione della mobilità? | La compromissione della mobilità è una diagnosi infermieristica | La compromissione della mobilità è un problema collaborativo | La compromissione della mobilità è una complicanza clinica | La compromissione della mobilità è una diagnosi riabilitativa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 2 | NANDA accetta proposte per nuove diagnosi, da quale dei seguenti soggetti? | Qualsiasi infermiere interessato | Organizzazione mondiale della sanità | Esperti di riconosciuto valore | Ordini infermieristici | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 3 | In cosa consiste la consegna infermieristica? | Una sorta di diario di reparto su cui è riportato tutto ciò che attiene alla vita del reparto stesso | Una relazione sul lavoro del caposala | Una tabella per segnare le ore di straordinario | Una scheda contenente il nome dei farmaci da somministrare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 4 | Secondo NANDA, quali sono gli elementi di una diagnosi infermieristica reale: | Titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati | Titolo, definizione, caratteristiche definenti, eziologia | Titolo, definizione, sintomi, fattori correlati | Categoria, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 5 | Per quanto tempo la cartella clinica viene conservata: | per tempo illimitato | per dieci anni | fino alla morte del paziente | per cinque anni dopo la dimissione o il decesso | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 6 | L'assistenza infermieristica si realizza attraverso quale tipi di intervento: | specialistico, autonomi e complementari, di natura tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativi | interventi pratici, soprattutto di somministrazione farmaci | interventi di assistenza tecnica e relazionale del paziente mai autonomi | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 7 | Cos'è l'assistenza infermieristica o nursing: | è una disciplina che consiste essenzialmente nell'assistere e prendersi cura degli individui, delle famiglie e delle comunità per ottenere, riottenere e mantenere lo stato di salute | è caratterizzata prettamente dall'assistenza del malato in ospedale | non interessa la comunità ma il singolo individuo | non è regolata da un codice etico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 8 | Qual è il modello concettuale di salute che rende più evidente la specificità della professione infermieristica: | il modello bio-psico-sociale | il modello bio-organicistico | il modello psico-sociale | il modello biologico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 9 | Cosa si intende per procedura: | una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri standard | una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri induttivi | una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri prestabiliti di appropriatezza ed efficacia | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 10 | Come è denominato il costrutto teorico di nursing transculturale elaborato da Purnell e Paulanka: | modello della competenza culturale | modello della salute-malattia | modello della diversità | modello globalizzato | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 11 | Il protocollo infermieristico ha la funzione di: | uniformare i diversi comportamenti infermieristici | informare il paziente circa le prestazioni che l'équipe assistenziale è in grado di offrire | definire in collaborazione con il caposala/coordinatore le attività del reparto | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 12 | Nel modello concettuale elaborato da Calista Roy, come sono definiti gli agenti di stress: | stimoli ambientali che richiedono una risposta adattiva | reazioni essenzialmente patologiche alle sollecitazioni ambientali | azioni in grado di scatenare reazioni abnormi | stimoli abnormi in risposta a situazioni problematiche | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 13 | Secondo le ipotesi teoriche di F. Nightingale, il concetto di ambiente è: | essenzialmente fisico | essenzialmente psico-sociale | inteso in senso globale | essenzialmente sociale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 14 | Si può parlare di ambito disciplinare un insieme di conoscenze che ha almeno: | un proprio oggetto di studio, uno scopo e un metodo | strumenti disciplinari e non disciplinari | una tradizione culturale | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 15 | La prima azione della cosiddetta catena della sopravvivenza prevede: | la chiamata del 118 | l'applicazione della ventilazione artificiale | l'uso del defibrillatore | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 16 | Da chi è stato introdotto l'approccio interpretativo fenomenologico nel nursing: | M. Rogers | M. Leininger | F. G. Abdellah | V. Henderson | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 17 | Cosa rappresenta il piano di assistenza infermieristica: | rappresenta un metodo idoneo per comunicare e organizzare l'assistenza | rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento assistenziale | è la rappresentazione grafica del metodo di lavoro adottato all'interno di un'équipe assistenziale | rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento delle professioni sanitarie | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 18 | Com'è denominato il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linea di attività: | modello tecnico o per compiti | modello per piccole équipe | modello primary care | modello personalizzato di cure | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 19 | Da chi è stato elaborato il concetto di self care: | Dorothea Orem | Nathan Roper | Maria Montessori | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 20 | Qual è l'obiettivo della terapia palliativa: | il miglioramento della qualità della vita | la guarigione clinica del paziente | la possibilità di evitare una terapia chirurgica | la riduzione delle dimensioni del tumore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 21 | Quali sono le dimensioni della salute: | fisica, psichica, emotiva, relazionale, spirituale, sociale | fisica, psichica, emotiva, relazionale, spirituale, territoriale | fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, sociale | fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, economica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 22 | Cosa NON includono i modelli funzionali (fisiologici) specificati da Gordon: | la prevenzione dei rischi | l'attività ed esercizio fisico | la sessualità e riproduzione | il riposo e sonno | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 23 | Il testo teorico di maggior rilievo di Virginia Henderson è: | The Principles and Practice of Nursing | The Foundations of Nursing | Nursing: a general Theory | Theory and Practice of Nursing | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 24 | Cosa definisce il concetto di empowerment: | un processo intenzionale orientato allo sviluppo della capacità dei membri di risolvere i problemi in modo adeguato, utilizzando specifiche competenze | la mobilitazione delle risorse a disposizione degli individui in relazione ai diversi carichi di lavoro | l'azione di un gruppo di lavoro che deve migliorare il sistema di qualità aziendale | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 25 | Quali sono le fasi essenziali del nursing secondo le ipotesi teoriche di Peplau: | orientamento, identificazione, utilizzazione, risoluzione | raccolta dati, identificazione, formulazione degli obiettivi, valutazione | orientamento e definizione del campo problematico | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 26 | Quale filosofa del nursing definisce il bisogno come «una qualsiasi esigenza da parte della persona ammalata che può essere soddisfatta da un infermiere professionale»? | J. Travelbee | D. Orem | J. Watson | E. Adam | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 27 | La NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) come definisce le diagnosi infermieristiche: | un giudizio clinico sulle risposte di un individuo, di una famiglia o di una comunità a processi di salute/vita reali o potenziali | un obiettivo infermieristico | una singola definizione concettuale come obesità o malnutrizione | un sintomo come, per esempio, il vomito | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 28 | Qual è la sequenza corretta del processo di assistenza: | accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione | diagnosi, accertamento, attuazione, pianificazione, valutazione | accertamento, pianificazione, diagnosi, attuazione, valutazione | accertamento, valutazione, diagnosi, pianificazione, attuazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 29 | La celebrazione della giornata dell'infermiere cade ogni anno il 12 maggio, perchè: | è nata Florence Nightingale | è nata Virginia Henderson | è stata istituita la prima scuola per infermiere in Gran Bretagna | è stato fondato il consiglio nazionale delle infermiere (ICN) | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 30 | Qual è la differenza fra segno e sintomo? | Il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva | Si manifesta sempre prima il sintomo e poi il segno | Il sintomo segue sempre il segno | Il sintomo viene riferito ad un organo interno, il segno ad una zona esterna dell'organismo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 31 | Secondo Carpenito gli infermieri hanno la responsabilità di trattare: | diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi | interventi clinici e diagnostici secondo prescrizione medica | interventi di infermieristica avanzata | diagnosi infermieristiche e prescrizioni mediche | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 32 | La Carta di Ottawa definisce i parametri del concetto di salute con riferimento a: | aspirazioni, bisogni, modificazione dell'ambiente o adattamento ad esso | esitamento e riduzione dei danni e delle patologie | interventi di infermieristica avanzata | concetto di salute, concetto di malattia, concetto di intervento sanitario | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 33 | Chi è l'infermiere: | il professionista responsabile dell'assistenza infermieristica | la persona che fa da tramite tra il paziente e il medico | colui che dipende in ogni sua azione dal medico | colui che mette in pratica le terapie prescritte dal medico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 34 | Qual è il ruolo dell'infermiere: | assistere l'ammalato ma anche supportare emotivamente i suoi familiari | partecipare all'assistenza del paziente eseguendo solo istruzioni mediche | assistere l'ammalato prescindendo dai suoi familiari | assistere solo ed esclusivamente il paziente accentrando tutta la sua attenzione su di lui | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 35 | Cos'è la cartella infermieristica: | è uno strumento di supporto cartaceo e/o informatico atto a contenere la registrazione dei dati e l'insieme dei documenti di pertinenza | è compilata solo ed esclusivamente dal medico di turno | nessuna delle altre risposte è corretta | non è considerata un documento valido per una buona pratica infermieristica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 36 | Qual è il metodo attualmente più diffuso per la valutazione del rischio nelle strutture sanitarie: | il metodo MAPO | la misura dinamometrica | la valutazione del numero dei posti letto | il metodo NIOSH | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 37 | Indicare la finalità del triage all'ingresso in pronto soccorso: | l'agevolazione dell'accesso alle cure non sulla base dell'ordine di arrivo ma della gravità delle condizioni | la compilazione della cartella clinica | nessuna delle altre risposte è corretta | l'assegnazione ad ogni paziente di un numero che definisca l'ordine di arrivo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 38 | La teoria di Madeleine Leininger tratta i problemi dell'infermieristica rivolti: | alla multiculturalità e transculturalità | all'ambiente e relazione | all'adattamento e consapevolezza | al self-care | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 39 | Cosa implica la nozione di pianificazione assistenziale: | l'acquisizione di dati, la previsione delle condizioni future, la definizione degli obiettivi | esclusivamente la previsione delle condizioni future | nessuna delle altre risposte è corretta | l'acquisizione delle caratteristiche strutturali dell'azienda presa in esame, la conoscenza delle condizioni di budget attuali e la definizione degli obiettivi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 40 | La teoria dei bisogni, nelle discipline infermieristiche, è un modello teorico elaborato da: | V. Henderson | A. Maslow | J. Travelbee | D. Snell | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 41 | Cosa si intende per profilo di cura: | un piano di cura interdisciplinare creato per rispondere ai problemi diagnostici e clinici di gruppi di pazienti | la continuità assistenziale tra strutture ospedaliere e strutture territoriali | il piano di cura proposto dal medico di base | un piano di cura creato per rispondere al profilo psicologico di gruppi di pazienti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 42 | Cosa implica il concetto di sviluppo sostenibile: | uno sviluppo economico compatibile con il complesso degli ecosistemi, in regime di equilibrio ambientale | un'iniziativa legislativa circa un progetto ambientale sviluppato in linea con le normative nazionali | nessuna delle altre risposte è corretta | il rapporto genericamente positivo tra progetti umani e ambiente fisico | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|--------------------------|
| 43 | La prospettiva emic nel nursing transculturale indica il: | punto di vista folk o popolare | punto di vista appreso e trasmesso a livello formale | rapporto supportivo che intercorre tra due persone, infermiere e utente, che ricoprono ruoli paritetici | processo del prendersi cura | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 44 | Con l'espressione "Evidence Based Nursing" cosa si intende: | l'uso, nella pratica infermieristica, di verifiche empiriche in associazione con diagnosi cliniche | l'accentuazione delle problematiche socio-sanitarie in contesti politico-istituzionali | nessuna delle altre risposte è corretta | l'uso, nella pratica infermieristica, di modelli logici e procedure deduttive | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 45 | Non è un sistema di classificazione dell'assistenza infermieristica: | il DRG | il NOC | il NANDA | il NIC | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 46 | Quando un bisogno diventa una richiesta sanitaria? | Quando un individuo, sano o malato, si rivolge alla struttura sanitaria | Quando un individuo non presenta alcun problema medico | Nessuna delle altre risposte è corretta | Quando un individuo prenota un check-up completo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 47 | I piani assistenziali standardizzati cosa contengono: | linee guida che indicano l'assistenza da erogare in situazioni tipiche | standard di procedure organizzative di specifiche unità assistenziali | problemi ed obiettivi personalizzati | problemi, obiettivi ed interventi personalizzati di assistenza infermieristica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 48 | Un gruppo di pazienti, il cui il lavoro è basato sulla pianificazione e l'integrazione, prende il nome di: | modello per piccole équipes | modello primary care | modello dell'équipe multidisciplinare | modello tecnico o per compiti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 49 | Cos'è l'unità del malato? | Lo spazio e gli accessori dati in uso al paziente durante la sua degenza | La terapia e la diagnosi | Il materiale necessario per la terapia durante la degenza | L'équipe medica e infermieristica addetta alla sua degenza | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 50 | La legge n. 42 del 1999 sostituì la denominazione professione sanitaria ausiliaria in: | professione sanitaria | professione ausiliaria | lavoratore in campo sanitario | lavoratore sanitario | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 51 | Quale provvedimento ha istituito la qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario? | Il d.lgs. 229/1999 | La legge 261/2002 | La legge 261/2000 | La legge 271/2000 | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 52 | L'infermiere è tenuto a mantenere il segreto professionale, in quali casi: | sia per obbligo giuridico che come espressione del rapporto di fiducia creatosi con il paziente | può agire come meglio crede senza particolari obblighi | solo per obblighi giuridici | per acquisire la fiducia del paziente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 53 | Il principio fondamentale della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari è: | il potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati | nessuna delle altre risposte è corretta | l'agevolazione concessa ad utenti bisognosi circa l'utilizzo dei servizi sanitari pubblici | il rispetto del dettato costituzionale in materia socio-sanitaria | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 54 | Il modello funzionale di salute identificato da M. Gordon è rappresentato: | dall'attività ed esercizio | dai sistemi corporei | dall'autorealizzazione | dalla continuità assistenziale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 55 | Cosa si intende per accreditamento professionale: | costituisce un sistema standardizzato di valutazione della qualità delle prestazioni professionali in strutture private | può contribuire a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate | definisce i prerequisiti di una struttura privata ai fini di ottenere la possibilità di erogare servizi pubblici | corrisponde alla verifica periodica dei requisiti funzionali minimi di una struttura socio-sanitaria | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 56 | Il processo di nursing è definibile come: | un metodo d'identificazione e di soluzione dei problemi infermieristici | nessuna delle altre risposte è corretta | un metodo d'identificazione degli interventi più appropriati | un processo dinamico di individuazione delle aree di competenza del nursing | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 57 | Per ospedalizzazione domiciliare si intende: | una forma di ospedalizzazione alternativa al ricovero | una forma di preospedalizzazione | il confino di un paziente affetto da una malattia infettiva contagiosa | l'assistenza domiciliare prestata a pazienti affetti da malattie | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 58 | L'ambiente in cui si svolge l'interazione infermiere/paziente si definisce terapeutico quando: | il modello organizzativo dell'assistenza è basato sulla multidisciplinarietà | il modello organizzativo dell'assistenza è basato sul riduzionismo teorico di alcune discipline rispetto ad altre | sussiste una netta divisione dei compiti all'interno dell'équipe assistenziale | prevale una concezione organicistica della salute dell'uomo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 59 | Le tecniche ergonomiche si occupano di: | definire le condizioni migliori affinché il lavoro possa adattarsi all'uomo | nessuna delle altre risposte è corretta | legiferare in materia di prevenzione sugli infortuni del lavoro | ottimizzare le performance in lavori che implicano l'utilizzo di macchinari complessi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 60 | Il sistema di sorveglianza delle infezioni ospedaliere risulta efficace quando: | è continuativo e si basa sulla raccolta dei dati di laboratorio, sulle notifiche dei casi da parte dei medici delle unità operative e sulla raccolta dei dati effettuati | nessuna delle altre risposte è corretta | si basa sulla raccolta di dati microbiologici derivati dall'effettuazione di analisi sui campioni biologici dei pazienti ritenuti infetti | non è continuativo ma implica frequenti controlli a campione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 61 | Di cosa si occupa la semeiotica: | dello studio dei sintomi di una determinata patologia | nessuna delle altre risposte è corretta | dell'individuazione delle specie dei semi | dello studio dei processi culturali di significazione in genere | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 62 | Fabbisogno di personale di assistenza. Qual è uno degli indici per calcolarlo adeguatamente: | il PRN | il PCA | il PDCA | il metodo inglese | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 63 | Nella sperimentazione clinica, viene definito gruppo di controllo il gruppo: | di pazienti che non ricevono il trattamento oggetto di sperimentazione | nessuna delle altre risposte è corretta | di pazienti oggetto effettivo di sperimentazione | del campione complessivo di riferimento | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 64 | Indicare quale tra le seguenti è una fonte autorevole di revisioni sistematiche della letteratura biomedica: | Cochrane Library | Elsevier | C.I.N.A.H.L. | Google | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--------------------------|
| 65 | Nel modello di quale tra le seguenti studiosi la cura di sé è interpretata come essenziale bisogno umano? | D. Orem | E. Adam | J. Watson | E. Wiedenbach | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 66 | Il personale obiettore può rifiutarsi di prestare assistenza antecedente o conseguente all'intervento diretto, che determina l'interruzione della gravidanza alle donne che abortiscono? | No | Solo se qualcun altro può prestare assistenza al posto loro | Solo in alcune Regioni | In alcuni casi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 67 | Quale attività non è di competenza dell'operatore professionale coordinatore? | Delegare ad esterni l'attività didattica e di formazione | Partecipare ad eventuali commissioni per l'acquisto di materiali ed attrezzature | Esercitare funzioni di controllo e supervisione | Coordinare l'attività del personale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 68 | I crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) sono stati imposti: | a tutti gli operatori dipendenti o liberi professionisti, operanti sia nella sanità pubblica che in quella privata | solo ai liberi professionisti | solo agli operatori che operano nella sanità privata | solo agli operatori sanitari che operano nella sanità pubblica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 69 | Il NIC (Nursing Interventions Classification) riporta esclusivamente interventi infermieristici: | nessuna delle altre risposte è corretta | generalistici | specialistici | collaborativi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 70 | La diagnosi infermieristica: | indirizza gli interventi volti a conseguire dei risultati di cui è responsabile l'infermiere | non può mai costituire un giudizio clinico | è sinonimo di diagnosi medica | non esiste | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 71 | Nightingale istituì le prime scuole per infermiere allo scopo di: | tutte le altre risposte sono corrette | innalzare lo status sociale dell'infermiere | attrezzare le infermiere con competenze specifiche | preparare infermiere-insegnanti per le allieve infermiere | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 72 | Fra gli strumenti che hanno mostrato la maggiore utilità nella valutazione del rischio di caduta di un paziente si annovera: | la scala di Conley | la scala di Likert | la scala di Cheops | la scala ADL di Katz | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 73 | Indicare quale tra i seguenti principi non è contemplato nell'atto costitutivo dell'OMS: | nessuna delle altre risposte è corretta | la salute dei popoli | il pericolo delle condizioni di ineguaglianza tra i diversi paesi | l'ammissione di tutti i popoli ai benefici delle conoscenze acquisite dalla ricerca scientifica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 74 | Quale delle seguenti funzioni non appartiene al coordinatore professionale sanitario esperto? | Pulizia e riordino degli ambienti | Analisi del sistema organizzativo | Gestione delle dinamiche e delle motivazioni al lavoro | Esercizio della leadership | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 75 | Secondo l'approccio per attributi di Greenwood, quale tra i seguenti non è un carattere distintivo di una professione? | L'orientamento teorico del professionista | La cultura professionale | La sanzione della comunità | L'autorità professionale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 76 | Il Center for Disease Control di Atlanta, nel 2007, ha identificato delle linee guida per l'isolamento in ospedale prevedendo due livelli di intervento. Quali fra le seguenti non sono precauzioni raccomandate in tale sede? | Precauzioni generiche | Precauzioni per malattie a trasmissione aerea | Precauzioni per malattie a trasmissione attraverso droplet | Precauzioni per malattie trasmissibili attraverso il contatto | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 77 | Il Daily Routine Work è un metodo di miglioramento della qualità: | per l'outcome | per gli esiti | per obiettivi | per la struttura | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 78 | Da chi è stato elaborato il modello della salute come espansione della coscienza: | M. A. Newman | C. Roy | E. Wiedenbach | N. Roper | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 79 | L'infermieristica secondo alcune classificazioni è considerata una scienza: | prescrittiva | normativa | ecologica | descrittiva | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 80 | Indicare quale delle seguenti azioni non fa parte delle fasi del processo di assistenza infermieristica: | prevenzione dei rischi | accertamento e diagnosi | identificazione degli obiettivi | pianificazione e attuazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 81 | Il concetto di area critica implica: | una struttura complessivamente ritenuta idonea a fornire assistenza ottimale al paziente critico | mezzi ed ambiente adatti all'assistenza di un paziente in condizioni gravi | zona sorvegliata in cui può accedere solo personale autorizzato | un reparto dotato di attrezzature di terapia intensiva | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 82 | L'ambiente in cui si svolge l'interazione infermiere/paziente si definisce terapeutico quando: | propone un modello di assistenza basato su approcci multidisciplinari | sussiste una netta divisione dei compiti all'interno dell'équipe assistenziale | emerge la componente tecnica della professione infermieristica | prevale una concezione organicistica della salute dell'uomo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 83 | Come è definibile la sorveglianza sanitaria: | attività di prevenzione basata sul controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischio, al fine di proteggere la loro salute e prevenire malattie professionali e correlate al lavoro | misura di controllo delle acque di balneazione | misura di restrizione applicata ai contatti sani di un caso contagioso | misura di controllo degli animali da macello | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 84 | Nell'ambito della formazione, le competenze chiave del professionista vengono anche definite: | competenze trasversali | competenze di base | competenze esperte | competenze avanzate | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 85 | Come vengono definiti in medicina gli acufeni? | percezioni di fenomeni sonori nonostante l'assenza di stimolazione fisiologica dei recettori cocleari | mancata percezione dei suoni esterni | vertigini adolescenziali | formazioni delle cupole ampollari | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--------------------------|
| 86 | Quale patologia ha come sintomo caratteristico la diarrea ad acqua di riso? | Colera | Salmonella | Infezione da HSV | Infezione da micobatteri atipici | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 87 | Qual è la principale caratteristica delle ustioni di secondo grado: | flittene | infezione virale | escara molle | diminuzione di tessuto necrotico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 88 | La peculiarità della tossina botulinica, è: | Penetra attraverso la barriera ematoencefalica | Viene inattivata a 37 C° per 5 minuti | Inibisce la divisione cellulare | Viene prodotta dai germi comuni | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 89 | In quali casi definiamo la febbre come febbre intermittente: | la temperatura presenta dei rialzi improvvisi, separati da periodi in cui i valori sono nella norma | la temperatura rimane elevata con variazioni di un grado | la temperatura si mantiene per breve tempo a 38 °C | si alternano periodi in cui la temperatura si eleva gradualmente a periodi di stabile ipertermia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 90 | Quale occlusione intestinale non è uno strangolamento: | l'ileo biliare | il volvolo del tenue | l'ernia strozzata | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 91 | La definizione di pneumoconiosi è: | malattia professionale polmonare | broncopneumopatia maligna ostruttiva | broncopneumopatia cronica | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 92 | Il vaccino antitetanico è formato da: | anatossina | batteri vivi attenuati | batteri uccisi al calore | batteri vivi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 93 | Cos'è il botulismo? | Un'intossicazione alimentare | Un'epatite alcolica | Un avvelenamento da funghi | Un'infezione a trasmissione aerea | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 94 | La principale modalità di trasmissione del virus dell'epatite E è: | oro-fecale | transplacentale | via respiratoria | attraverso morsi di animali | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 95 | Le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni: | standard e aggiuntive | universali | per i liquidi biologici infetti | per i liquidi biologici in persone con HIV positivo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 96 | Quale tra le seguenti sostanze ha azione irritante sull'apparato broncopolmonare: | acido solforico | rame | ferro | lattice | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 97 | L'emottisi è: | emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie | emissione di sangue dall'apparato urinario | emissione di sangue con le feci | emissione di sangue proveniente dalle vie digestive | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 98 | L'origine dell'encefalomielite acuta disseminata è: | virale | batterica | parassitaria | eziologia non infettiva | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 99 | Si definisce dismorfofobia la paura di: | deformazioni corporee | malattie | buio | colori | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 100 | Quale patologia è caratterizzata dalla sindrome del dito bianco? | vibrazioni | tunnel carpale | idrargirismo | avvelenamento da solventi organici | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 101 | La Toxoplasmosi è una patologia che si trasmette tramite le feci di quale dei seguenti animali: | gatto | galline | canarino | roditori | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 102 | Si definisce sincope: | una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza | un sintomo dell'epilessia | un sinonimo di ipotermia | una perdita di coscienza irreversibile | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 103 | Le emorroidi di terzo grado sono caratterizzate da: | protrusione con il ponzamento che si riduce manualmente | protrusione nella defecazione che si riduce spontaneamente | sanguinamenti | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 104 | La Salmonella typhi nel primo settenario di malattia può essere isolata da: | sangue | liquor | urine | muco | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 105 | Con la colorazione di Ziehl-Neelsen al microscopio osserviamo: | il bacillo della tubercolosi | Stafilococchi | Neisserie | Streptococchi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 106 | Le macchie di Janeway sono tipiche di: | endocardite infettiva | tifo | rosolia | vaiolo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 107 | Quale è l'obiettivo della terapia HAART? | Bloccare la replicazione virale | Prevenire l'infezione nel soggetto esposto | Vaccinare il soggetto non esposto | Prevenire le infezioni opportunistiche AIDS correlate | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 108 | Che tipo di complicanza è più frequente nel morbillo? | Broncopolmonite | Epatite | Epilessia | Nefriti interstiziali | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 109 | Quale mitto di urina bisogna prendere per eseguire un'analisi batteriologica? | Il mitto intermedio | Il mitto iniziale | Il mitto terminale | Il mitto intermedio e quello terminale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 110 | L'adrenalina viene usata in quale caso: | fibrillazione ventricolare | tachicardia | angina pectoris | blocco atrio-ventricolare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 111 | Perché prima di eseguire una venipuntura si aspira il sangue? | Per essere sicuri di avere inserito l'ago in vena | Per ridurre il rischio di complicanze | Per operare un lavaggio fisiologico della siringa | Per ridurre le complicanze infettive | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 112 | La scala di Maslow serve per capire: | le necessità e i bisogni dell'uomo | il rischio radioattivo | lo stato di coma | lo stato di idratazione | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|--------------------------|
| 113 | A quale anno risale l'emanazione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro? | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 114 | In caso di intervento chirurgico ai polmoni cosa bisogna fare: | effettuare ginnastica respiratoria | somministrare i farmaci preanestetici | controllare la zona interessata | preparare il tavolo operatorio | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 115 | Quale procedura è indispensabile per eseguire un cateterismo vescicale? | Disinfezione del meato uretrale esterno | Porre il paziente in decubito prono | Puntura sovrapubica | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 116 | In che anno Fleming scoprì la penicillina? | 1929 | 1937 | 1945 | 1925 | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 117 | La talassemia è trasmessa con meccanismo: | autosomico recessivo | legato al cromosoma X | legato al cromosoma Y | autosomico codominante | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 118 | Il flebotatico peggiora generalmente in quale stagione: | estate | autunno | inverno | non risente di variazioni stagionali | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 119 | Quale dei seguenti fattori svolge un ruolo determinante nella formazione delle piaghe da decubito? | Perdita della sensibilità dolorifica | Stato settico | Ipossia locale per fenomeni vasospastici | Umidificazione dei tessuti cutanei | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 120 | Quale dei seguenti fattori è coinvolto nella cardiomiopatia congestizia? | Alcool | Dieta ipoproteica | Obesità | Ipercolesterolemia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 121 | Il segno più affidabile di una trombosi profonda è: | edema distale dell'arto | senso di peso e di tensione | dilatazione delle vene superficiali | rossore e infiammazione del tessuto sottocutaneo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 122 | Quale fra le seguenti malattie del connettivo presenta con maggior frequenza un interessamento dell'esofago? | Sclerodermia | Dermatomiosite | Artrite reumatoide | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 123 | Nell'endocardite infettiva dell'esame del sedimento urinario mostra pressoché costantemente: | microematuria | cilindruria | cristalluria (ossalati e urati) | tappeto di cellule delle basse vie urinarie morfologicamente alterate | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 124 | Un paziente di 60 anni presenta da tempo tosse stizzosa e febbre irregolare. Il primo esame da richiedere ai fini della diagnosi è: | Rx torace | esame citologico dell'espettorato | Tine Test | broncoscopia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 125 | La valutazione definitiva dell'arresto cardiaco si fa attraverso: | l'ECG | il riscontro di assenza del polso periferico | il riscontro della scomparsa della pressione sanguigna | il riscontro di assenza di respiro spontaneo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 126 | In quale di queste condizioni si rileva di solito tremore a riposo, bradicinesia e rigidità muscolare? | Morbo di Parkinson | Morbo di Sture-Weber | Sclerosi laterale amiotrofica | Siringomielia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 127 | La sede più comune negli arti inferiori in cui un embolo si arresta è: | femorale comune | femorale profonda | poplitea | tibiale anteriore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 128 | La definizione di focolaio epidemico si differenzia da quella classica di epidemia per il fatto che: | l'epidemia si è sviluppata improvvisamente in un contesto spaziale limitato | si sono manifestati solo uno o pochi casi di malattia in una popolazione nella quale tale patologia è normalmente assente | un agente patogeno persiste in una determinata popolazione causando un numero di casi di malattia che tende a mantenersi stabile nel tempo | l'epidemia si diffonde attraverso i continenti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 129 | Quale tra i seguenti sintomi non precede la crisi ipoglicemica? | Poliuria | Cefalea | Sudorazione | Tachicardia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 130 | Cosa indica la poichilocitosi: | la presenza di eritrociti di forme diverse | la presenza di eritrociti di dimensioni diverse | una particolare forma di leucocitosi | la presenza di eritrociti con diversa concentrazione di emoglobina | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 131 | Quale delle seguenti malattie si può trasmettere per via aerea? | Parotite | Mononucleosi | Meningite cerebrospinale epidemica | Tutte le altre risposte sono corrette | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 132 | Quale delle seguenti sostanze può determinare neuropatie? | Mercurio | Lattice | Cadmio | Talco | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 133 | La frattura di Colles è localizzata a livello di quale parte de corpo: | estremità distale del radio | estremità prossimale del femore | piede | bacino | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 134 | Che cosa si intende per acalasia: | assenza di peristalsi esofagea | contrazioni non peristaltiche con periodi di peristalsi normale | peristalsi normale con onde di ampiezza elevata | turbe aspecifiche della malattia esofagea | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 135 | Per un paziente in stato di shock ipovolemico è indicata una terapia: | infusionale-trasfusionale | antiaritmica | antiipertensiva | con alfamimetici | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 136 | Le proteine G sono: | parte del sistema di trasduzione del segnale | canali ionici | presenti nel nucleo cellulare | proteine del plasma | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 137 | In quale caso, tra i seguenti, un infermiere è tenuto ad effettuare un lavaggio antisettico delle mani? | Prima e dopo procedure invasive come l'inserzione di un catetere venoso | Prima del contatto diretto con un paziente | Dopo aver effettuato un prelievo di sangue ad un paziente apparentemente sano | Prima di una qualsiasi procedura | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 138 | Si definisce zoonosi una malattia che: | si trasmette dagli animali all'uomo | si trasmette per via aerea | è infettiva ed è trasmessa da uomo malato a uomo sano | si manifesta solo nell'uomo | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|--------------------------|
| 139 | La patologia definita cataratta dei vetrai è causata da: | radiazioni infrarosse emesse dal vetro incandescente | radiazioni X emesse dai metalli nel vetro | nessuna delle altre risposte è corretta | polvere di vetro in sospensione nell'aria | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 140 | Qual è la definizione della malattia di Becker? | Distrofia muscolare progressiva | Mucopolisaccaridosi | Gangliosidosi | Calcolosi delle vie biliari | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 141 | In quale delle seguenti condizioni si realizza la fonazione? | C'è coordinazione tra apparato respiratorio e fonatorio | Il flusso inspiratorio è diminuito | Nessuna delle altre risposte è corretta | Le corde vocali sono intatte | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 142 | Si parla di malattia da ustione quando la parte ustionata supera il: | 20% nell'adulto e 10-12% nel bambino | ogni volta che sia presente un'ustione indipendentemente dal grado | 50% nel bambino e 60% nell'adulto | 50% nell'adulto e 30% nel bambino | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 143 | Cosa si intende per tossinfezione alimentare: | una serie di sintomi causati dall'ingestione di cibi contaminati da sostanze tossiche o da microrganismi patogeni | una serie di sintomi causati dall'ingestione di cibi scaduti | un'intolleranza verso il latte | un'infezione causata da spore contenute negli alimenti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 144 | La via di trasmissione preferenziale per l'infezione da HIV è: | la via sessuale | la via oro-fecale | tutte le altre risposte sono corrette | la via materno-fetale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 145 | In Italia, le principali cause di morte in ordine decrescente sono: | malattie cardiovascolari, tumori, malattie infettive | tumore al seno, malattie cardiovascolari, nefropatie | malattie cardiovascolari, tumore della cervice uterina, malattie infettive | malattie infettive, infezioni nosocomiali, tumori, malattie cardiovascolari | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 146 | Le neoplasie sono causate anche dalle radiazioni ionizzanti perché: | inducono mutazioni in macromolecole informative (DNA, RNA, proteine) | provocano apoptosi cellulare | provocano lesioni della cute | indeboliscono l'immunità innata e acquisita | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 147 | Le epilessie sono malattie contraddistinte da: | accessi parossistici ricorrenti | perdita di coscienza | ritardo mentale | lenta insorgenza di deficit neurologici irreversibili | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 148 | La listeriosi è una malattia infettiva che generalmente si trasmette attraverso: | gli alimenti | i medicinali scaduti | i pidocchi | le mosche del genere Anopheles | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 149 | Qual è la caratteristica della miopia? | Il bulbo oculare è più lungo del normale | La completa rigidità del cristallino | Il bulbo oculare è infiammato | Una curvatura non regolare della cornea | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 150 | Il roditore è serbatoio naturale della: | peste | febbre gialla | difterite | brucellosi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 151 | Qual è una caratteristica delle verruche? | Sono più frequenti sul dorso delle mani | Hanno guarigione spontanea | Sono di origine autoimmune | Non sono contagiose | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 152 | La reazione di rigetto del trapianto è causata da: | linfociti T del ricevente | globuli rossi del ricevente | linfociti B del donatore | linfociti T del donatore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 153 | Quale tra queste è una caratteristica della meningite cerebrospinale epidemica? | Si trasmette per contatto diretto | Si trasmette con l'acqua non potabile | Si rimane contagiosi per un lungo periodo | Si trasmette dai rifiuti organici | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 154 | Quale fattore è responsabile della durata della contumacia? | Periodo di incubazione | Sintomi iniziali | Medico curante | Gravità della malattia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 155 | Quale tra i seguenti agenti eziologici è causa di miocardite acuta? | Coxsackie virus B | CMV | VZV | Staphylococcus pyogenes | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 156 | L'esantema varicellare è: | polimorfo (macule/papule/vescicole/pustole) | esclusivamente vescicolare | solo papulare | maculo-papulare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 157 | I principali antigeni dei virus influenzali sono: | emoagglutinina e neuroaminidasi | emolisina e monoaminidasi | monoaminidasi e neuroaminidasi | emolisina e neuraminidasi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 158 | Un paziente si ricovera per febbre di origine sconosciuta. I test di laboratorio evidenziano IgM anti EBV, pertanto il paziente è affetto da: | mononucleosi infettiva | salmonellosi | micobatteriosi | febbre gialla | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 159 | Cosa sono le brucelle? | Gram negative, acapsulate, asporigene | Gram positive, acapsulate, asporigene | Gram negative, capsulate, sporigene | Gram positive, capsulate, sporigene | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 160 | L'eziologia più comune dell'aneurisma dell'aorta addominale è: | arteriosclerotico | lue | HCV | ereditaria | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 161 | La pressione endoculare nel soggetto normale: | varia fra 10 e 20 mmHg | si abbassa con l'età | oscilla fra 5 e 35 mmHg | è direttamente correlata con la pressione arteriosa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 162 | Dove ritroviamo prevalentemente le verruche piane? | Volto | Tronco | Regione sacrale | Palmo delle mani | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 163 | Quale tra le seguenti malattie deve essere presa in considerazione in un paziente con dermatite seborroica grave? | Infezione da HIV | Leucemia mieloide | Sepsi gonococcica | Sifilide primaria | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--------------------------|
| 164 | Quale delle caratteristiche non è peculiare dell'herpes simplex di tipo 1? | Associazione con la dermatite erpetiforme di Duhring | E' recidivante | L'esposizione al sole può portare all'eruzione | Lesioni vescicolose | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 165 | Il BCG viene utilizzato come vaccinazione: | antitubercolare | antifungina | antitetanica | anticarbonchiosa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 166 | La diagnosi di AIDS in un soggetto sieropositivo si fa in caso di: | comparsa di patologie opportunistiche classificate | HIV-RNA nel plasma non rilevabile | HIV-RNA nel liquor cefalo-rachidiano | insorgenza di influenza | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 167 | Quale tra le seguenti non è una manifestazione clinica dell'AIDS? | Influenza A | Herpes-Zoster | Toxoplasmosi cerebrale | Retinite da Cytomegalovirus | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 168 | Prima di eseguire un intervento chirurgico in zone dove ci sono peli o capelli cosa si deve fare? | Tricotomia | Disinfezione con Dechin | Lavaggio con soluzione fisiologica | Lavaggio con alcool | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 169 | In quale distretto va eseguita la paracentesi? | Fossa iliaca sinistra | Fossa iliaca destra | Pancreas | Epigastrio | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 170 | Il ferro somministrato per via orale può causare: | disturbi gastrointestinali | policitemia | aumento delle transaminasi | prurito | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 171 | L'insulina sottocutanea va evitata in caso di: | aree cutanee ustionate | aree cutanee ricche di adipe | nessuna delle altre risposte è corretta | ciclo mestruale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 172 | La pressione arteriosa diastolica di un adulto è: | 70-90 mmHg | 40-60 mmHg | 90-110 mmHg | 80-190 mmHg | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 173 | I battiti cardiaci/minuto in un adulto sono: | 60-80 | 90-100 | >90 | 30-50 | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 174 | Prima di una mastectomia non è necessario: | posizionare correttamente l'arto interessato | fornire al paziente informazioni sull'intervento | preparare la barella per il trasporto in sala operatoria | sostegno psicologico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 175 | Il termine neurolettico: | indica le capacità di certi farmaci di ridurre la tensione nervosa e neurovegetativa producendo rilassamento | indica le patologie per le quali certi farmaci sono risultati efficaci | raggruppa tutti i farmaci attivi sul sistema nervoso | indica un'azione di stimolazione del farmaco sul SNC | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 176 | Una situazione di bisogno sanitario non percepito è esemplificata da: | malattia in fase clinicamente silente | servizi sanitari incapaci di soddisfare il bisogno sanitario | nessuna delle altre risposte è corretta | alterazione morbosa che si traduca in sintomi avvertibili | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 177 | Un aumento assoluto dei reticolociti è espressione di: | aumentata produzione di eritrociti | aumentata sopravvivenza degli eritrociti | aumentata attività del sistema reticolo-endoteliale | distruzione di eritrociti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 178 | Nel quadro dello shock settico manca: | bradicardia | brivido che precede l'ipotensione | cute calda e asciutta | ipotensione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 179 | Nell'ipertiroidismo uno di questi sintomi è per lo più assente. Quale? | Ipersensibilità al freddo | Astenia | Tremori | Perdita di peso | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 180 | Tutte le seguenti situazioni patologiche rappresentano fattori di rischio per tumori del colon retto, tranne una. Quale? | Morbo di Crohn | Dieta ad alto contenuto di grassi e proteine animali | Poliposi multipla gastrointestinale | Rettocolite ulcerosa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 181 | Quale delle seguenti patologie è nota anche come malattia di Kahler - Bozzolo? | Mieloma multiplo | Colecistite cronica | Granuloma dentario | Polmonite | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 182 | Se a distanza di 24-48 ore da una frattura di femore compare confusione mentale, allucinazioni, vomito, bisogna pensare a: | embolia cerebrale | focolaio epilettico | ictus cerebrale | emorragia cerebrale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 183 | L'anemia ipocromica è determinata da: | riduzione del contenuto emoglobinico medio | riduzione della concentrazione emoglobinica corpuscolare media | tutte le altre risposte sono corrette | riduzione del volume corpuscolare medio | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 184 | Quale di questi sintomi è sempre presente nell'ittero emolitico? | Bilirubinuria | Emoglobinemia diminuita | Reticolociti aumentati | Urobilinuria | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 185 | Nell'atelettasia di un polmone il mediastino: | si sposta dallo stesso lato | si sposta in alto | rimane fisso | si sposta controlateralmente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 186 | Quale delle seguenti è la più precoce alterazione rilevabile in corso di infarto miocardico acuto? | Sopralivellamento ST | Aumento del CPK | Aumento di LDH | Aumento della glicemia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 187 | Il sintomo più evidente di una peritonite è: | contrattura a quadrante | rigidità diffusa dell'addome | shock ipovolemico relativo | dolore spontaneo che si aggrava con la palpazione dell'addome | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 188 | Nelle malattie diarroiche è molto importante evitare l'assunzione di: | nutrienti ad elevata osmolarità | proteine | amido | liquidi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 189 | La disfagia determina: | difficoltà nella deglutizione | assunzione di quantità eccessive di liquidi | avversione per i cibi solidi | dolore post-prandiale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 190 | Il tappo di cerume è causa di: | ipoacusia di trasmissione | nessuna delle altre risposte è corretta | difficoltà nell'equilibrio | otalgia ed acufeni | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--------------------------|
| 191 | Qual è la caratteristica principale della lesione ulcerativa nel piede diabetico neuropatico? | Bordo dell'ulcera ipercheratosico | Scarsa tendenza alla riparazione se scarificata | Fondo della lesione non granuleggiante | Tendenza alla guarigione spontanea | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 192 | I criptosporidi sono responsabili di: | diarrea | polmoniti | febbre | faringiti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 193 | L'emorragia rettale in medicina è definita come: | proctorragia | nessuna delle altre risposte è corretta | papilloma | melena | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 194 | Il benzene agisce a livello di: | midollo osseo | milza | vescica | fegato | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 195 | I vaccini misti sono composti da: | germi di malattie differenti | farmaci antivirali | germi e anatossine | ceppi diversi di una stessa specie | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 196 | Cosa provoca l'intossicazione da cromo? | Dermatite ulcerativa, faringotracheite, nefropatia tubulare | Glomerulonefrite e nefropatia vascolare | Calcolosi renale | Coliche addominali, ipertensione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 197 | Chi ha inventato la scala dello sviluppo cognitivo? | Binet-Simon | Nessuna delle altre risposte è corretta | Freud | Jung | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 198 | L'azione degli anticorpi prodotti in seguito ad immunizzazione tetanica è quella di: | neutralizzare la tossina prodotta dall'agente patogeno | impedire l'invasione sistemica da parte dell'agente patogeno | opsonizzare il Clostridium tetani | aumentare l'azione delle cellule T | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 199 | Che cosa comporta il tricobezoario? | Capelli nello stomaco | Carcinoma del colon | Granuloma nel polmone | Infestazione parassitaria intestinale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 200 | Cos'è la nocicezione? | La ricezione, trasmissione ed elaborazione centrale dello stimolo doloroso | La soglia minima del dolore | La manifestazione di stimoli odorosi | Un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 201 | Nella steatosi osserviamo un accumulo di: | lipidi | carboidrati | proteine | lipasi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 202 | La terapia della meningite meningococcica prevede l'utilizzo di: | beta lattamici | antidolorifici | immunoglobuline | chinoloni | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 203 | Quale dei seguenti microrganismi non è causa di infezione opportunistica in pazienti immunodepressi? | Neisseria gonorrhoeae | Virus Varicella-zoster | Pneumocystis carinii | Aspergillus fumigatus | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 204 | Quale di queste complicanze si osserva in corso di parotite epidemica? | Tutte le altre risposte sono corrette | Nessuna delle altre risposte è corretta | Orchite | Pancreatite | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 205 | Nella sindrome da inappropriata secrezione dell'ormone antidiuretico (ADH) quale terapia è controindicata? | Idratazione | Restrizione idrica | Diuretici | Sali di litio | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 206 | Cosa producono i fibroblasti? | Fibre elastiche e collagene | Tutte le altre risposte sono corrette | Fibre muscolari | Fibre reticolari | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 207 | Il virus SV40, a quale gruppo di virus appartiene? | Papovavirus | Retrovirus | Coronavirus | Herpesvirus | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 208 | Quali batteri possono essere isolati nel paziente mediante coprocultura? | Shigella sonnei | Neisseria gonorrhoeae | Corynebacterium diphtheriae | Stafilococco aureus | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 209 | Quale dei seguenti distretti corporei non ha flora residente? | Vescica | Apparato digerente | Apparato respiratorio superiore | Apparato genitale femminile | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 210 | Quale delle seguenti manifestazioni cliniche può essere causata dalla Candida albicans? | Vulvo-vaginite | Diarrea | Febbre puerperale | Tigna | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 211 | Dove sono collocate le porine dei batteri gram negativi? | Membrana esterna | Capsula batterica | Membrana citoplasmatica | Periplasma | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 212 | Come viene definito un drenaggio di Bulao? | Drenaggio toracico | Sonda rettale | Drenaggio addominale | Drenaggio a valvola ad acqua | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 213 | Per prelievi di campioni muco-cutanei serve un tampone di: | cotone | poliestere | alginato di calcio | nylon | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 214 | Come si misura la pressione in arteria polmonare? | Con il catetere di Swan-Ganz | Con il catetere di Foley | Con la sonda di Hegar | Con la sonda di Sengstaken-Blackmore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 215 | Per la venipuntura si utilizzano aghi butterfly per: | riduzione del rischio di perforazione venosa | nessuna delle altre risposte è corretta | minor costo | maggiore sterilità | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 216 | Quanti atti ventilatori/minuto compie un adulto: | 16-18 | 19-23 | 42281 | 41547 | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|--------------------------|
| 217 | Una donna di 36 anni riferisce amenorrea negli ultimi quattro mesi. Il test di gravidanza è negativo. I livelli sierici di LH e FSH sono elevati e l'estradiolo sierico è basso. Qual è l'orientamento diagnostico? | Menopausa prematura | Somministrazione esogena di estrogeni | Panipopituitarismo | Ovaio policistico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 218 | Quale tra i seguenti non è un reperto anatomico-patologico specifico della tetralogia di Fallot? | Comunicazione interatriale | Ipertrafia ventricolare destra | Comunicazione interventricolare | Destroposizione dell'aorta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 219 | Nel trauma cranico con sindrome neurologica occorre praticare quale prima indagine: | tomografia computerizzata | angiografia | ecografia | scintigrafia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 220 | Quale tra queste non è causa di insufficienza renale acuta? | Pielonefriti | Presenza di versamenti abbondanti | Emorragie profuse | Gravi ustioni | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 221 | In un paziente con angina pectoris quale dei seguenti elementi è più importante per poter prevedere la sua sopravvivenza? | Il grado di ostruzione delle coronarie | L'entità del lavoro muscolare capace di indurre l'angor | La frequenza degli episodi anginosi | La durata della sindrome anginosa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 222 | Accertata la diagnosi di rene cistico, su quale altro organo si dovrebbe indagare con scintigrafia o ecografia? | Fegato | Cervello | Polmone | Cuore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 223 | Il paziente affetto frequentemente da micosi cutanee dovrà evitare uno dei seguenti comportamenti. Quale? | Uso di saponi alcalini | Tutte le altre risposte sono corrette | Esposizione prolungata alla luce solare | Uso di saponi acidi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 224 | Quale fra le seguenti affermazioni sulla pancreatite cronica è falsa? | Costituisce fattore di rischio per le neoplasie del pancreas | La ipertrigliceridemia familiare rappresenta un fattore di rischio per la sua insorgenza | Si possono riscontrare calcificazioni all'esame Rx diretto dell'addome in regione pancreatica | I segni clinici di insufficienza di secrezione esocrina compaiono per distruzione di parenchima superiore al 90% | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 225 | Qual è l'evenienza clinica che consegue più frequentemente ad un'embolia dell'arteria polmonare? | Infarto polmonare | Infarto cardiaco | Pneumotorace | Atelettasia polmonare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 226 | Qual è la più frequente causa di cuore polmonare acuto: | embolia polmonare | infarto miocardico anteriore | infarto miocardico posteriore | stato asmatico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 227 | La terapia farmacologica per lo shock anafilattico prevede l'uso di: | cortisonici e adrenalina | dopamina | diidralazina | valproato | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 228 | Quale tra le seguenti situazioni non è provocata da stenosi mitralica? | Ipertrafia ventricolare sinistra | Fibrillazione atriale | Ipertrafia polmonare | Ipertrafia ventricolare destra | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 229 | Qual è il sintomo che consente di fare diagnosi di paralisi progressiva sopranucleare e non di Parkinson? | Alterazione dei movimenti oculari | Tremore | Bradichinesia | Rigidità | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 230 | Cos'è un T.I.A.? | Attacco ischemico transitorio | Turba ischemica acuta | Trombosi improvvisa acuta | Trombosi istantanea acuta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 231 | Il metadone è utilizzato in sostituzione di: | eroina | cannabinoidi | cocaina | etanolo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 232 | A quale categoria di farmaci appartengono le benzodiazepine? | Sedativi | Antiarritmici | Diuretici | Miocardiotonici | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 233 | In quale forma fisica una sostanza è più rapidamente assorbibile a livello polmonare? | Gas | Nebulizzata | Solida | Liquida | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 234 | Quale tra i seguenti farmaci non appartiene alla classe degli antidepressivi triciclici? | Fluoxetina | Imipramina | Amitriptilina | Doxepina | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 235 | La mioclonia è: | una contrazione muscolare rapida seguita da rilassamento | una contrazione muscolare tonica | una forma di epilessia | una manifestazione neurodegenerativa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 236 | Su quale delle seguenti azioni si fonda l'aprassia ideativa? | Incapacità di eseguire nella giusta successione i movimenti che compongono un atto | Sostituire ai movimenti corretti di un gesto, gesti automatici o incompleti o amorfi | Mancato movimento voluto | Capacità di compiere un atto involontario | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 237 | La trasmissione di quale microrganismo è facilitata dalla presenza di acque stagnanti in zona tropicale? | Schistosoma mansoni | Neisseria gonorrea | Taenia saginata | Mycobacterium tuberculosis | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 238 | Quale malattia è stata ufficialmente eradicata a livello mondiale? | Il vaiolo | La lebbra | La tubercolosi | La brucellosi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 239 | Si definisce ritenzione urinaria: | la mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica | il bruciore durante la minzione | la produzione di urina < 400 ml/24 ore | la produzione di urina > 700 ml/24 ore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 240 | L'Amanita phalloides colpisce prevalentemente: | fegato | snc | pancreas | milza | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 241 | Quando si considera contagioso il morbillo? | Da due giorni prima a quattro giorni dopo la comparsa dell'esantema | Durante tutta la fase esantematica | Durante la fase di incubazione | Tre giorni prima della comparsa dell'esantema | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--------------------------|
| 242 | Gli agenti eziologici di meningite a liquor torbido comprendono: | S. pneumonite, N. meningitidis e H. influenzae | S. pneumoniae | N. meningitidis | M. tuberculosis | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 243 | Gli adenovirus determinano: | tutte le altre risposte sono corrette | diarrea | sindrome pertussica | cistite emorragica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 244 | Quali miceti colpiscono i soggetti immunocompromessi? | Tutte le altre risposte sono corrette | Candida | Mucor | Aspergillus | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 245 | Nella brucellosi: | l'emocultura è diagnostica nella prima settimana di malattia e la sierodiagnosi di Wright è diagnostica nella seconda settimana di malattia | l'emocultura è diagnostica nella prima settimana di malattia | la sierodiagnosi di Wright è diagnostica nella seconda settimana di malattia | la sierodiagnosi di Wright è diagnostica nella terza settimana di malattia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 246 | In Italia, quale delle vaccinazioni seguenti è obbligatoria? | Nessuna delle altre risposte è corretta | BCG | Vaiolo | Rabbia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 247 | Nella colorazione di gram risultano colorati di violetto: | i batteri gram positivi | i batteri gram negativi | i batteri sporigeni | i funghi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 248 | Quale dei seguenti cateteri viene maggiormente utilizzato per la vescica? | Foley | Broviac | Fleming | Hegar | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 249 | Quant'è il volume polmonare corrente in un individuo sano, misurabile in centimetri cubici? | 500 cm ³ | 110 cm ³ | 320 cm ³ | 430 cm ³ | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 250 | Dopo aver inserito un catetere di Foley, cosa bisogna fare per accertarsi dell'esatta posizione? | Tutte le altre risposte sono corrette | Iniettare soluzione fisiologica | Far defluire l'urina | Gonfiare il palloncino | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 251 | Quale deve essere il ruolo svolto dall'infermiere in caso di puntura lombare? | Tutte le altre risposte sono corrette | Mantenere la testa del paziente anteroflessa | Mantenere le ginocchia del paziente vicino al torace | Far assumere al paziente un decubito laterale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 252 | Quale procedura si effettua prima di un intervento chirurgico all'intestino? | Tutte le altre risposte sono corrette | Somministrazione di antibiotici non assorbibili | Purganti per tre giorni prima dell'intervento | Clisteri per tre giorni prima dell'intervento | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 253 | Quale può essere la causa di un trauma spinale? | Tutte le altre risposte sono corrette | Incidente stradale | Tuffo | Ferita da fuoco | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 254 | In che momento deve essere fatto il prelievo ematico per emocultura? | Nessuna delle altre risposte è corretta | Non appena compare uno stato febbrile | Dopo cinque giorni di terapia antibiotica | Appena si effettua il ricovero | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 255 | Cosa bisogna fare, in caso di ferita con materiale infettato dal virus HIV? | Iniziare immediatamente profilassi con AZT | Iniziare immediatamente una cura antibiotica | Fare il test HIV entro 48 ore | Contattare entro 24 ore un infettivologo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 256 | Un pap-test falso negativo può essere dovuto a: | tutte le altre risposte sono corrette | prelievo non adeguato | fattori casuali | operatore non esperto | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 257 | Quale dei seguenti è il sintomo più frequente dell'acidosi metabolica? | polipnea | nausea e vomito | astenia | cefalea | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 258 | Quale tra queste non è una complicanza intestinale della malattia di Crohn? | Poliposi | Aderenze | Fistole | Fibrosi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 259 | Nella pancreatite acuta tutte le seguenti affermazioni sul dolore sono vere, tranne una. Quale? | Dolore non associato a nausea e vomito | Insorgenza improvvisa | Localizzazione diffusa all'epigastrio | Irradiazione al dorso | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 260 | Cosa s'intende per insonnia? | Tutte le altre risposte sono corrette | Difficoltà ad iniziare e a mantenere il sonno | Difficoltà del sonno correlata a un disturbo fisico | Difficoltà del sonno correlata all'assunzione di sostanze psicoattive | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 261 | In tutte le seguenti malattie si osserva eosinofilia, tranne in una. Quale? | Brucellosi | Linfoma di Hodgkin | Dermatiti allergiche | Edema di Quincke | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 262 | La porpora si riscontra più frequentemente in caso di: | piastriopenia | vasculopatia | trombocitosi | coagulopatia congenita | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 263 | La sintomatologia caratterizzata da dolore biliare, ittero e febbre settica si riscontra nella litiasi: | del coledoco | intraepatica | della colecisti | del dotto di Wirsung | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 264 | Da quale delle seguenti condizioni è caratterizzato l'aumento della pressione arteriosa differenziale? | Insufficienza aortica | Iperensione nefrovascolare | Stenosi aortica | Stenosi polmonare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 265 | L'angina instabile per definizione è caratterizzata da: | esordio o peggioramento della sintomatologia anginosa | crisi esclusivamente a riposo | crisi associate ad aritmie | crisi con manifestazioni neurovegetative | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 266 | In quale di queste condizioni la potassiemia risulta diminuita? | Diarrea cronica | Insufficienza renale acuta | Insufficienza surrenale cronica | Crisi emolitica acuta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 267 | Quale di queste sostanze oppioidi non crea un alto rischio di dipendenza? | Codeina | Eroina | Metadone | Morfina | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 268 | La calcolosi del coledoco è caratterizzata da tutti i seguenti sintomi, tranne uno. Quale? | Ittero ingravescente | Dolore di tipo colico | Ittero intermittente | Febbre con brivido | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--------------------------|
| 269 | La complicità più frequente di una frattura esposta è: | lifezione | emorragia | formazione di ematoma | frammentazione dei monconi ossei | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 270 | L'aumento del CEA è più caratteristico per i tumori di: | grosso intestino | cervello | polmone | prostata | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 271 | Tutte le seguenti condizioni possono verificarsi in presenza di un aneurisma dissecante dell'aorta, tranne: | insufficienza mitralica acuta | anisofigmia a livello degli arti superiori | perdita di coscienza | insufficienza aortica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 272 | La leucemia mieloide cronica è: | una leucemia frequente che colpisce tutte le età | una leucemia poco frequente che colpisce l'età evolutiva | una leucemia poco frequente che colpisce i soggetti dopo i 50 anni | una leucemia poco frequente che colpisce tutte le età | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 273 | La diagnosi di stenosi valvolare cardiaca si stabilisce con: | ecodoppler con determinazione del gradiente pressorio | angiocardiografia | emogasanalisi | cateterismo coronarico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 274 | Quale delle seguenti sostanze possiede una maggiore capacità oncogena? | Cloruro di vinile monomero | Solfuro di carbonio | Toluolo | Anilina | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 275 | Sono cause di demenza non reversibile: | tutte le altre risposte sono corrette | le malattie degenerative | la malattia di Creutzfeldt-Jacob | le infezioni SNC | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 276 | La valutazione del danno d'organo in un paziente in condizioni di ipertensione comprende: | tutte le altre risposte sono corrette | esame della retina | esame dei polsi periferici | ECG e Rx torace | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 277 | Nell'anziano il rischio di cadute è dovuto essenzialmente a: | tutte le altre risposte sono corrette | alterazioni vestibolari | alterazioni visive | alterazioni della propriocezione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 278 | La valutazione della funzione piastrinica può essere effettuata attraverso: | tutte le altre risposte sono corrette | il tempo di sanguinamento | il dosaggio del fattore di von Willebrand | l'aggregometria piastrinica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 279 | In caso di avvelenamento l'emesi non può essere indotta se: | tutte le altre risposte sono corrette | il paziente è comatoso | il paziente è affetto da gravi malattie cardiovascolari | il paziente è sotto i sei mesi di vita | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 280 | In un paziente in stato di decubito, la misurazione della PVC va eseguita ponendo lo stesso: | in posizione supina | in posizione laterale sx | semiortopnoico | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 281 | Se si effettua una trasfusione di sangue incompatibile ad un paziente, questo manifesterà: | reazione emolitica | edema generalizzato | complicanze infettive | riduzione delle proteine plasmatiche | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 282 | Cosa s'intende per piombemia? | Misurazione della presenza di piombo nel sangue totale | Misurazione della presenza di piombo nei globuli rossi | Misurazione della presenza di piombo nelle feci | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 283 | Nella relazione con un paziente schizofrenico in generale non è opportuno: | tentare di dimostrare su basi razionali l'inesistenza del delirio | prestare attenzione ai sentimenti che stanno dietro al delirio | non pensare di dover sempre dire qualcosa e dare spazio all'ascolto attivo | essere autentici | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 284 | Quale dei seguenti gas viene usato nell'anestesia generale inalatoria? | Protossido di azoto | Monossido di azoto | Ossido di azoto | Anidride carbonica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 285 | Come viene definito un polso con frequenza < 60 b/mp: | bradicardico | normale | nessuna delle altre risposte è corretta | aritmico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 286 | Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente gli effetti dell'analgia peridurale? | Allevia i dolori del parto | Diminuisce l'indice di Apgar dei neonati | Diminuisce il rischio di complicanze nel parto | Aumenta il tasso dei tagli cesarei | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 287 | Per quale delle seguenti patologie viene usata la manovra di Giordano? | Renale | Polmonare | Epatica | Prostatica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 288 | Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente l'utilità del test di Amsler? | Le metamorfopsie | La trasformazione della pressione oculare | L'aumento della capacità visiva | La densità della cataratta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 289 | Primo livello di ipoacusia. L'esame indicato è: | Audiometria | Retinogramma | Nessuna delle altre risposte è corretta | Ecg | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 290 | In caso di legionella, e per scongiurare la diffusione, l'acqua potabile deve essere mantenuta: | a temperatura di acqua fredda < 20°C e acqua calda > 60°C | a temperatura di acqua fredda < 25°C e acqua calda = 55°C | nessuna delle altre risposte è corretta | a temperatura di acqua fredda = 0°C e acqua calda > 35°C | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 291 | Nei disturbi del linguaggio di tipo afasico, viene comunemente utilizzato il test di: | Token | Broca | Pinel | Binet | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 292 | Test tubercolinico positivo. Si evince: | malattia da batteri gram positivi | malattia da batteri gram negativi | tutte le altre risposte sono corrette | infezione tubercolare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 293 | La febbre intermittente è quella febbre che: | scende sempre sotto i 37 °C | a volte scende sotto i 37 °C | si accompagna a una sudorazione profusa | non scende mai al di sotto dei 37 °C | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 294 | La scala di valutazione OMS per il dolore muscolo-scheletrico consta di: | 3 livelli | 4 livelli | 5 livelli | 2 livelli | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 295 | Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente le implicazioni del processo di fonazione? | E' predominante l'espiazione | E' predominante l'inspirazione | Possibilità di azione deglutitoria | Presenza di dinamica aerea espiratoria attiva | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|--------------------------|
| 296 | Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente lo scopo della posizione di Fowler? | Una migliore funzionalità ventilatoria | La rimozione di corpi estranei dall'esofago | L'esplorazione della prostata | L'esecuzione del clistere evacuativo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 297 | Alcune ore dopo un'ustione. La reidratazione viene effettuata attraverso: | soluzione di Ringer lattato | nessuna delle altre risposte è corretta | soluzione fisiologica | siero | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 298 | Prelievo per emogasanalisi. Occorre preparare una siringa sterile da: | 2 ml eparinata | nessuna delle altre risposte è corretta | 5,5 ml non eparinata | insulina eparinata | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 299 | Parlando di monitoraggio giornaliero, un paziente si definisce oligurico quando: | la diuresi oraria è inferiore a 0,5 ml/kg | la diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml | la diuresi giornaliera è inferiore a 800 ml | la diuresi oraria è 1 ml/kg | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 300 | In ambito infermieristico, l'acronimo ASO indica: | Accertamento Sanitario Obbligatorio | Azienda Senza Operatori | Assistenza Sanitaria Operatoria | Assistenza Socio - OSS | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 301 | In ambito infermieristico, l'acronimo DSM indica: | Dipartimento Salute Mentale | Dispositivo Solo per Medici | Dispositivo Sanitario Medico | Dipartimento Solo Medico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 302 | In ambito infermieristico, l'acronimo BMI indica: | Body Mass Index | Bronco Mielite Interstiziale | Bronchite Mielite ad Intermittenza | Blood Mass Intrapheritoneal | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 303 | In ambito infermieristico, l'acronimo BLS indica: | Basic Life Support | Blood Linear Support | Linea Base Sanitaria | Bronchite Lineare Superficiale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 304 | In ambito infermieristico, l'acronimo SDO indica: | Scheda di Dimissione Ospedaliera | Scheda di Diagnosi OSS | Servizio Domiciliare di Orientamento | Servizio di Diagnosi Ospedaliera | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 305 | In ambito infermieristico, l'acronimo PA indica: | Pressione Arteriosa | Portata Atmosferica | Pressione Atmosferica | Portata Arteriosa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 306 | In ambito infermieristico, l'acronimo FC indica: | Frequenza Cardiaca | Fisiologia Cardiaca | Formazione Comune | Feci Compatte | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 307 | In ambito infermieristico, l'acronimo CV indica: | Catetere Vescicale | Catetere Vetusto | Callo Valvolare | Catetere Veicolato | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 308 | In ambito infermieristico, l'acronimo TC indica: | Temperatura Corporea | Temperatura Craniale | Temperatura Certa | Temperatura Corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 309 | In ambito infermieristico, l'acronimo PS indica: | Pronto Soccorso | Primo Soccorso | Primo Salvamento | Pronto Salvamento | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 310 | In ambito infermieristico, l'acronimo SAD indica: | Servizio Assistenza Domiciliare | Servizio Assistenza Disabili | Servizio Assistenza Demenze | Servizio Accoglienza Demenze | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 311 | In ambito infermieristico, con l'acronimo FR si indica: | Frequenza Respiratoria | Frequenza Ritmica | Frequenza Relativa | Familiarità Relazionale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 312 | In ambito infermieristico, la somministrazione SC avviene: | sottocute | solo cerotto | supercerotto | sopracute | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 313 | In ambito infermieristico, l'acronimo DPI indica: | Dispositivi di Protezione Individuale | Dispositivi Protezione Infetti | Dispositivi Protezione Inalterati | Dispositivi Protezione Inefficaci | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 314 | In ambito infermieristico, l'acronimo NE indica: | Nutrizione Enterale | Età Neonatale | Non Estensibile | Non Eccedere | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 315 | In ambito infermieristico, l'acronimo ECG indica: | Elettrocardiogramma | Elettroencefalogramma | Elettrocoagulazione | Elettromiografia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 316 | In ambito infermieristico, l'acronimo BPCO indica: | Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva | Bronchite Cronica Ostruttiva | Bronchite Persistente Cronica Ostruttiva | Broncopolmonite Cronica Ostruttiva | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 317 | In ambito infermieristico, l'acronimo RSD indica: | Residenza Sanitaria Disabili | Residenza Sociale Demenze | Residenza Sanitaria Demenze | Residenza Sociale Disabili | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 318 | In ambito infermieristico, l'acronimo IMA indica: | Infarto Miocardico Acuto | Infarto Muscolare Acuto | Infarto Malato Anziano | Infarto Medio Acuto | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 319 | In ambito infermieristico, l'acronimo RCP indica: | Rianimazione Cardiopolmonare | Respirazione Cardiopolmonare | Reazione Cardiopolmonare | Riflesso Cardiopolmonare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 320 | In ambito infermieristico, l'acronimo SSR indica: | Servizio sanitario regionale | Servizio sociale regionale | Servizio sanitario riservato | Servizio sociosanitario regionale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 321 | In ambito infermieristico, l'acronimo IM indica: | Intramuscolo | Indicazione medica | In media | In medicina | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 322 | In ambito infermieristico, l'acronimo ICA indica: | Infezioni correlate all'assistenza | Istituti contro gli abusi | Infezioni contratte all'aperto | Infezioni contratte in ambulanza | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 323 | In ambito infermieristico, l'acronimo ARDS indica: | Sindrome da distress respiratorio acuto | Sindrome da distress respiratorio nell'adulto | Sindrome da russamento acuto | Sensazione di disagio respiratorio all'aperto | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|--------------------------|
| 324 | In ambito infermieristico, l'acronimo MMG indica: | Medico di medicina generale | Medico di medicina geriatrica | Menomazione mentale generalizzata | Gestione malattia miocardica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 325 | In ambito infermieristico, l'acronimo EMG indica: | Elettromiografia | Elettromiocardigrafia | Elettrografia mensile | Elettromediografia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 326 | In ambito infermieristico, l'acronimo PEG indica: | Gastrostomia endoscopica percutanea | Progetto esterno di gestione | Portata enterale giornaliera | Pressione endogastrica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 327 | In ambito infermieristico, l'acronimo NPT indica: | Nutrizione parenterale totale | Necessario pasto tritato | Nutrizione pre trattamento | Nursing post traumatico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 328 | In ambito infermieristico, l'acronimo FANS indica: | Farmaci anti-infiammatori non steroidei | Farmaci anti-dolorifici non steroidei | Farmaci ancora non sospesi | Farmaci anti nausea sensibili | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 329 | In ambito infermieristico, l'acronimo ADI indica: | Assistenza domiciliare integrata | Assistente domestica italiana | Assistenza domiciliare interattiva | Assistenza domiciliare intensiva | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 330 | In ambito infermieristico, l'acronimo SNG indica: | Sondino naso gastrico | Sondino nasale gommato | Sondino nasale gonfiato | Sondino non gonfiato | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 331 | In ambito infermieristico, l'acronimo RSA indica: | Residenza sanitaria assistenziale | Residenza sanitaria assistita | Residenza socio assistita | Residenza socio assistenziale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 332 | In ambito infermieristico, l'acronimo MRGE indica: | Malattia da reflusso gastro esofageo | Malattia da rigurgito gestazionale | Malattia da reflusso gastro enterico | Medicazione ricorrente con gentamicina | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 333 | In ambito infermieristico, l'acronimo EEG indica: | Elettroencefalogramma | Ematoma esteso grave | Elettrocardiogramma esterno | Emorragia gastro/enterica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 334 | In ambito infermieristico, l'acronimo ADP indica: | Assistenza domiciliare programmata | Adenosintrifosfato | Assistenza domiciliare perpetua | Alterata deambulazione parziale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 335 | Durante la compilazione della cartella clinica, un infermiere risponde di falso ideologico quando: | attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute | si rifiuta di compilare la cartella clinica per motivi ideologici | fa compilare la cartella ad un altro operatore | esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 336 | In quale caso può essere indicata la cardioversione elettrica sincronizzata? | Flutter atriale | Tachicardia ventricolare senza polso | Dissociazione elettromeccanica | Fibrillazione elettrica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 337 | Da cos'è contraddistinta l'afasia espressiva? | Linguaggio limitato, articolazione rallentata e grammatica ridotta | Incapacità totale sia nel linguaggio verbale sia in quello scritto | Disturbo del linguaggio risultante da debolezza del controllo motorio, paralisi e scoordinazione | Linguaggio fluente, ben articolato e contenuti disorganizzati | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 338 | Completare la seguente frase: "_____ non avviene l'assorbimento delle sostanze alimentari". | Nel colon | Nel duodeno | Nell'ileo | Nel digiuno | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 339 | Con quale formula si calcola la sensibilità di un test diagnostico? | Veri positivi/totali malati | Veri positivi/totale sani | Veri negativi/totali sani | Falsi negativi/totali sani | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 340 | Cosa prevede il trattamento della pancreatite acuta? | Il continuo svuotamento del contenuto gastrico | Interventi specifici per arrestare la flogosi e la necrosi pancreatica | Il frazionamento dei pasti limitando il contenuto glucidico | Tutte le altre risposte sono corrette | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 341 | La sperimentazione clinica controllata in doppio cieco si ha quando: | né il paziente né lo sperimentatore sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato | i gruppi di controllo sono due | né il paziente né lo statistico che elabora i dati sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato | né il paziente né i suoi parenti sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 342 | Completare la seguente frase: "Il maggior effetto di un'insulina ad azione intermedia somministrata per via sottocutanea si ottiene dopo _____ ore". | 6-8 | 10-16 | 12-20 | 2-3 | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 343 | Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta una complicanza precoce della tracheotomia? | L'enfisema sottocutaneo | La fistola tracheo-esofagea | L'infezione respiratoria | La stenosi tracheale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 344 | In ambito infermieristico, nei casi di pazienti con chetoacidosi diabetica, riveste importanza critica la reintegrazione del: | Potassio | Magnesio | Calcio | Bicarbonato | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 345 | Completare la seguente frase: "_____ sono analgesici non oppioidi". | Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Naprossene | Acido acetilsalicilico, Ketopofene, Fentanyl | Acido acetilsalicilico, Meperidina, Ketoprofene | Ibuprofene, Naprossene, Oxicodeone | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 346 | La legge n. 120/2001 e s.m.i., che norma l'uso dei defibrillatori semiautomatici al personale non sanitario, consente l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera: | a tutti i cittadini non medici che abbiano ricevuto una formazione specifica nell'attività di rianimazione cardiopolmonare | a tutti i soccorritori | a tutti i soccorritori purché sia fatta a bordo delle ambulanze | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 347 | Cosa si intende per "port-a-cath"? | Un accesso venoso centrale che può rimanere in sede per un più lungo periodo, pertanto è principalmente utilizzato nei pazienti oncologici | Un catetere arterioso impiantato per somministrazione di grandi quantità di farmaci | Un dispositivo di regolazione del ritmo cardiaco totalmente impiantabile | Un tipo di ago cannula utilizzato per somministrazione di antitumorali e radiofarmaci | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|--------------------------|
| 348 | Nell'ambito delle professioni sanitarie, essendo in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo, l'infermiere è l'operatore sanitario che è responsabile di: | assistenza generale infermieristica | elaborazione dati e ricerca in ambito sanitario | guida e supporto al profilo riabilitativo dell'utente | ricerche relative ad analisi biomediche e biotecnologiche | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 349 | Che cosa comporta il principio etico di autonomia, in ambito sanitario? | Il diritto dell'assistito a ricevere informazioni adeguate e accurate per essere in grado di operare una scelta libera da imposizioni esterne | Il diritto a scegliere come e dove curarsi, potendo scegliere fra Servizio sanitario pubblico e Sanità privata | Il diritto ad ottenere tutti i presidi che consentono di muoversi autonomamente, in forma gratuita | Il diritto di esprimere il proprio consenso all'atto sanitario | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 350 | Che cosa s'intende per "modello organizzativo"? | L'insieme di regole che controllano il funzionamento dell'organizzazione in relazione alla sua mission | Un prototipo di comportamento professionale | L'applicazione di un sistema di norme giuridiche e deontologiche | L'applicazione concreta della mission aziendale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 351 | Completare la seguente frase: "Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non provocare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di _____ giorni". | cinque | sette | due | tre | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 352 | Quale tra le seguenti opzioni di risposta indica una competenza che non è propria dell'organizzazione infermieristica? | Stabilire la programmazione degli accessi alle strutture sanitarie | Gestire i processi, definire linee guida, protocolli, procedure assistenziali | Definire gli indicatori di fabbisogno delle risorse assistenziali | Definire standard e indicatori assistenziali professionali adeguati ai fabbisogni | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 353 | A cosa fa riferimento il termine "carica microbica": | al quantitativo di microrganismi necessario a provocare l'infezione | alla capacità di abbattere le barriere meccaniche che difendono dall'infezione | alla capacità complessiva di penetrazione di un batterio attraverso gli orifizi naturali | alla capacità di un microrganismo di stabilirsi sulle mani e sugli strumenti sanitari, consentendo il trasferimento all'ospite suscettibile | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 354 | Che cosa s'intende col termine "granulociti"? | Cellule della serie bianca con inclusioni citoplasmatiche | Organuli citoplasmatici dotati di peduncoli | Minuscoli granuli di tessuto specifico tubercolare | Cellule tumorali dovute a proliferazione di origine flogistica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 355 | [Per la risoluzione del quesito, indicare quale opzione di risposta contiene la giusta sequenza di "Vero" (V) / Falso (F)] Secondo le linee guida del CDC, per le somministrazioni sottocute la disinfezione preliminare della cute deve soddisfare i seguenti requisiti: * Cute pulita * Uso di antisettico * Uso di soluzioni a base alcolica * Strofinamento della cute per 30 secondi. | V; V; F; F | V; V; F; V | V; F; V; F | F; V; F; F | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 356 | In ambito clinico, che cos'è la "compromissione della mobilità"? | Una diagnosi infermieristica | Una diagnosi riabilitativa | Una complicanza clinica | Un problema collaborativo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 357 | Con riferimento al processo di assistenza infermieristica, la valutazione NON è: | la fase in cui vengono decisi gli interventi | l'ultima fase del processo | la fase che precede una nuova raccolta dei dati | il momento della verifica degli obiettivi prefissati | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 358 | Le misure di isolamento in ospedale, al momento, prevedono l'uso di quali precauzioni? | L'uso di precauzioni standard e aggiuntive | L'uso di precauzioni standard e per liquidi biologici | L'uso di precauzioni universali | L'uso di precauzioni per liquidi biologici | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 359 | Per quanto riguarda la prevenzione terziaria, il suo scopo è: | la riabilitazione | la bonifica ambientale | la diagnosi precoce | la prevenzione della malattia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 360 | Che cosa rappresenta la cute non integra, nella "catena delle infezioni"? | La porta d'ingresso | La modalità di trasmissione | Il vettore infettivo | L'agente infettivo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 361 | Quante compresse da 0,25 mg deve somministrare un infermiere per ottenere 0,125 mg di dosaggio? | Mezza compressa | Una compressa più mezza | Due compresse | Secondo indicazione medica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 362 | Che cos'è fondamentale in un neonato con basso peso? | Un continuo riscaldamento per mantenere l'isotermia | Un'infusione endovenosa continua per evitare la disidratazione | Un continuo raffreddamento per rallentare il metabolismo | Un'alimentazione latte per evitare l'ipoglicemia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 363 | La "Conta Microbica Totale" è un rilievo fondamentale, in sala operatoria, poiché indica: | il numero delle unità formanti colonia che si sviluppano sulla piastra di Petri dopo 48 ore a 36° C | il numero di germi che si sviluppano sulla piastra di Petri dopo 24 ore a 36° C | il numero di germi che si sviluppano sulla piastra di Petri dopo 48 ore a 36° C | il numero delle Unità Formanti Colonie che si sviluppano sulla piastra di Petri dopo 96 ore a 36° C | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 364 | Completare la seguente frase: "Nel caso in cui si utilizzi un deflussore che eroga 10 gocce per 1 millilitro, per regolare la velocità di infusione allo scopo di somministrare un litro di soluzione in circa otto ore, occorre regolare il deflussore in modo che si somministrino _____ al minuto". | 20 gocce | 30 gocce | 40 gocce | 10 gocce | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 365 | Dividere mentalmente il gluteo in quattro quadranti: se l'infermiere pratica un'iniezione intramuscolare nel quadrante superiore esterno, quale sede è stata scelta? | Dorsogluteare | Rettofemorale | Deltoide | Ventrogluteare | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|--------------------------|
| 366 | In relazione alle forze meccaniche che influiscono in maniera negativa sulla funzione tegumentaria, la pressione può avere come effetto: | la distruzione di un'area tissutale più o meno circoscritta | lo scorrimento degli strati tissutali l'uno sull'altro | le verruche | le macerazioni | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 367 | Somministrando 500 cc di glucosata al 5% si garantisce: | l'apporto di Kcal 100 | l'apporto di Kcal 500 | l'apporto di Kcal 300 | l'apporto di Kcal 200 | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 368 | Secondo quanto appreso dalla letteratura in materia, le sedi consigliate per le iniezioni intramuscolari sono: | cinque | dieci | due | tre | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 369 | Nel caso in cui un paziente iperteso in reparto ha epitassi, l'infermiera deve preoccuparsi di garantirgli una posizione: | con capo chino in avanti, posizionando sotto il mento una arcilla per valutare l'entità della perdita ematica | di Trendelenburg | con capoflesso all'indietro, tamponando con garze il naso | con capo flesso all'indietro, tamponando con garze il naso e posizionando sulla fronte una garza bagnata fredda | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 370 | Quando deve avvenire l'applicazione delle calze elastiche, ad una persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori? | Prima di alzarsi dal letto al mattino | Dopo aver camminato | Dopo aver effettuato l'igiene personale | Tutte le volte che sente le gambe appesantite | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 371 | Completare la frase con l'opzione corretta: "Un infermiere sta rianimando un paziente e si sta preparando a somministrargli un farmaco che deve agire rapidamente. Il metodo _____ assicura l'effetto più rapido". | endovenoso in bolo | endovenoso a volume controllato | intramuscolare | sottocutaneo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 372 | Si riporta il caso di un infermiere che assiste un paziente che ha bisogno di ricevere aiuto durante i pasti. Il paziente si scusa con l'infermiere, dicendogli di sentirsi di peso, poiché non riesce neppure a mangiare da solo. La strategia più appropriata che potrebbe usare l'infermiere è di: | mostrarsi non frettoloso, sedersi accanto al letto e incoraggiare il paziente a mangiare il più possibile | offrire al paziente prima tutti i cibi solidi e poi i liquidi | ridurre al minimo la conversazione, in modo che il paziente possa mangiare più rapidamente | alimentare il paziente, in modo che egli non ritenga di sottrarre troppo tempo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 373 | Si riporta il caso di un infermiere che sta preparando un farmaco per la somministrazione intramuscolare contenuto in un flaconcino. Quale dei seguenti è un passaggio errato? | Aspirare il farmaco e abbandonare la siringa preparata sul carrello per rispondere a un campanello | Controllare la prescrizione medica | Detergere il tappo del flaconcino con un tampone antisettico | Identificare il paziente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 374 | In riferimento alla documentazione del processo di svuotamento della vescica sono accettabili tutti i termini tranne: | evacuazione | urinare | minzione | svuotamento | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 375 | Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ rappresenta un fattore di rischio di malnutrizione". | La compromissione della deglutizione | La compromissione della mobilità | La stipsi | L'inconsistenza fecale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 376 | Il lavaggio delle mani, secondo quanto stabilito dalle raccomandazioni internazionali, si esegue: | prima e dopo il contatto con il paziente, prima di una manovra asettica, dopo l'esposizione a liquidi biologici e dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente | dopo l'esposizione a liquidi biologici, prima e dopo il contatto con pazienti infetti | quando le mani sono visibilmente sporche o potenzialmente infette | quando non si indossano i guanti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 377 | Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ sono considerati fattori predittivi del rischio caduta". | I problemi cognitivi, problemi nella deambulazione, contenzione, dolore | Il non corretto utilizzo ausili deambulazione, dolore, nicturia, presenza cannula venosa | L'abuso alcolico, contenzioso, calzature inadeguate, stipsi | L'incontinenza urinaria, disfagia, terapia farmacologica, deficit della vista | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 378 | Quale alternativa di risposta contiene un'affermazione corretta riguardo il governo clinico e la gestione del rischio? | La gestione del rischio clinico è un elemento del governo clinico | Il governo clinico è una conseguenza delle attività di gestione del rischio clinico | Il governo clinico viene attuato dalle Direzioni Sanitarie, il rischio clinico viene gestito da tutti i Servizi | Il governo clinico e la gestione del rischio sono sinonimi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 379 | Considerare il caso in cui un paziente riferisce la presenza di dolore di intensità 6 con riferimento alla scala numerica 0-10. Viene prescritto dal medico un farmaco analgesico e qualche minuto dopo l'infermiere si appresta a somministrarlo. Nella stanza di degenza il paziente parla con i propri familiari e apparentemente non manifesta alcun sintomo legato al dolore. Quale affermazione è corretta, in riferimento al caso esposto? | Somministra il farmaco ugualmente anche se la distrazione ha avuto un ruolo importante sulla percezione del dolore | Non somministra il farmaco perché non essendoci alcun segno esteriore sicuramente il dolore è assente | Conserva il farmaco per quando il paziente riferirà un livello di dolore più intenso | Somministra il farmaco dopo aver verificato nuovamente l'intensità del dolore con i familiari | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 380 | Cosa si esegue, per esprimere la prevalenza delle Lesioni da Decubito (LdD)? | Numero di pazienti con LdD/totale pazienti presenti x 100 | Numero di pazienti con LdD acquisita in ospedale/totale pazienti presenti | Numero totale di LdD/ totale giornate di degenza x 100 | Numero di pazienti con LdD/totale pazienti presenti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 381 | Si espone il caso di un paziente collaborante di 24 anni, con diabete di tipo I di nuovo riscontro. Tra gli altri obiettivi, vi è quello di educarlo alla corretta auto somministrazione dell'insulina, per via sottocutanea. Nella fase di valutazione dell'apprendimento, la tecnica più efficace è: | data dalle dimostrazioni ripetute della tecnica da parte del paziente | il questionario scritto per avere traccia dell'apprendimento | la check list da utilizzare durante una proiezione della procedura corretta | la simulazione di una situazione tipo da parte dell'infermiere | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|---|--------------------------|
| 382 | Il concetto di assistenza infermieristica definito dall'American Nursing Association (ANA) è: | la diagnosi e il trattamento delle risposte umane dei pazienti alla malattia | il trattamento delle diagnosi infermieristiche e dei problemi collaborativi | la risposta umana del paziente ai problemi dell'esistenza | la diagnosi e il trattamento delle malattie e delle reazioni psicologiche | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 383 | Cosa descrive la seguente affermazione: " _____ consiste nell'aiutare il paziente e la sua famiglia a comprendere la malattia ed il trattamento, a collaborare alle cure, a farsi carico del proprio stato di salute ed a conservare e migliorare la propria qualità di vita". | La definizione che l'OMS dà all'educazione terapeutica | La definizione di assistenza infermieristica secondo la teorica H. Peplau | La definizione che l'OMS dà all'assistenza territoriale | La definizione che il Consiglio europeo dà all'assistenza psichica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 384 | Completare la frase con l'opzione corretta: "L'infermiere sta accogliendo in pronto soccorso una paziente di 66 anni, con scompenso cardiaco congestizio. Oltre ad altri sintomi, presenta ipokaliemia $k^+=2,9$. Potrebbe aver contribuito a determinare l'ipokaliemia il farmaco _____ assunto a domicilio dalla paziente". | Furosemide 50 mg / 2 cp die | Digossina 0.125 mg / 1 cp die | Pantoprazolo 20 mg / cp die | Clopidogrel 75 mg / 1 cp die | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 385 | Che cosa richiede la randomizzazione, negli studi sperimentali? | L'assegnazione dei pazienti al gruppo degli esposti o al gruppo di controllo in modo occasionale, attraverso tavole | L'individuazione di un follow up che controlla gli effetti del trattamento (ad esempio uso del materasso ad acqua) a distanza di tempo | La precisa identificazione di criteri di inclusione e di esclusione del campione applicati a random sul campione selezionato | L'esecuzione dello studio in cieco: i pazienti non possono essere informati sull'intervento | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 386 | Quale tra le seguenti azioni indica un comportamento errato durante un trattamento emotrasfusionale? | In caso di reazione trasfusionale cercare e avvertire immediatamente il medico e sospendere la trasfusione togliendo la sacca e l'ago cannula | Verificare che cognome e nome del paziente riportati sulla unità di emocomponente corrispondano all'identità del paziente da trasfondere, come da cartella clinica, consenso informato e richiesta | Verificare che il gruppo sanguigno del ricevente, come riportato nella documentazione rilasciata dalla struttura trasfusionale, sia compatibile con il gruppo sanguigno indicato sull'etichetta dell'emocomponente da trasfondere | Per i primi 15 minuti infondere il sangue lentamente e monitorare costantemente i parametri vitali, di seguito continuare il monitoraggio ogni 20 minuti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 387 | Quale tra quelli proposti NON sono sintomi caratteristici dell'ipoglicemia? | Ipertermia e diarrea | Polso frequente, vista sfocata o sdoppiata, debolezza | Sudorazione, fame, tremore | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 388 | In riferimento al processo di trasferimento delle consegne, quale opzione di risposta contiene il gruppo di raccomandazioni da trasferire che risulta più esaustivo nel garantire la sicurezza del paziente? | Frequenza monitoraggio, cardiovascolare, presenza infezioni, livello di rischio lesioni, livello di rischio caduta, rischio malnutrizione | Alterazioni della comunicazione, presidi utilizzati, diagnosi medica, risultati esami di laboratorio, prenotazione esami diagnostici | Presenza infezioni, diagnosi medica, frequenza monitoraggio cardiovascolare, livello di rischio caduta, risultati esami di laboratorio | Diagnosi medica, frequenza monitoraggio cardiovascolare, presenza infezioni, livello di rischio lesioni, livello di rischio caduta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 389 | Si espone il caso in cui, in casa di riposo, viene riammesso un ospite che ha subito un intervento ortopedico a seguito di una caduta accidentale. La lettera di trasferimento prevede un regime terapeutico analgesico che è confermato dal medico della struttura. Nel garantire la corretta esecuzione del trattamento, quale opzione di risposta è errata? | E' importante somministrare la minor quantità di farmaco possibile al fine di conservarne per quando il dolore sarà maggiore | E' meglio somministrare il farmaco analgesico ad intervalli regolari, prestabiliti da una scheda piuttosto che al bisogno | I trattamenti non farmacologici (massaggi, caldo/freddo, rilassamento) possono ridurre efficacemente il dolore per brevi periodi di tempo | E' importante rilevare il dolore del paziente ad intervalli prestabiliti usando strumenti per l'oggettivazione dello stesso (scala numerica, scala visiva, ...) | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 390 | Nel caso in cui un infermiere sia in dubbio se il prelievo capillare per stick glicemico possa essere affidato all'operatore socio sanitario, quale fonte può trovare di utile riferimento per un chiarimento? | Conferenza Stato-Regioni, seduta del 22 febbraio 2001 | DPR n. 225/1974 Titolo V | DPR n. 1310/1940 e legge n. 42/1999, art. 6 | DM n. 739/1994 | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 391 | Se sfogliando il manuale della qualità del reparto si legge la frase "Riconoscimento pubblico del possesso dei requisiti previsti dagli standard nazionali/regionali per i potenziali erogatori di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale/regionale" si tratta di: | accreditamento istituzionale | certificazione ISO 9000 | accreditamento volontario | accreditamento JACHO | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 392 | "professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'art. 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270": Questa affermazione corrisponde: | a un estratto della legge n. 43/2006 | a un estratto della legge n. 42/1999 | a due commi del d.m. n. 739/1994 | a un estratto del Codice deontologico | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|--------------------------|
| 393 | "Sono infermiere della stroke unit e lavoro in questo modo: accolgo i bisogni dei pazienti affidati. Alle 7.00 inizio le terapie, mentre l'OSS distribuisce la colazione ai 10 pazienti. Poi l'OSS assieme ad un collega effettuano l'igiene dei pazienti mentre io procedo con il giro visita del medico": in base a questa affermazione, quale modello organizzativo adotta l'infermiere nella sua pratica? | Per funzioni | Per case management | Per team leader | Per primary nurse | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 394 | Completare la frase con l'opzione corretta: "Tra le seguenti condizioni il _____ espone maggiormente un paziente allo sviluppo di Lesioni da Decubito". | BMI 15, disidratazione, incontinenza, immobilità | BMI 25, immobilità, incontinenza | BMI 26, anemia, immobilità, incontinenza | BMI 22, immobilità, stipsi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 395 | Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ non appartiene alla categoria delle soluzioni di elettroliti concentrati". | Il cloruro di sodio (NaCl) 0,9% | Il cloruro di potassio (KCl) 2 mEq/ml | Il fosfato di potassio (K ₃ PO ₄) 1 mEq/ml | Il fosfato di potassio (K ₃ PO ₄) 2 mEq/ml | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 396 | La guarigione per seconda intenzione delle ferite: | È il processo di guarigione in cui comincerà dal fondo della ferita con un tessuto di granulazione che procederà risalendo verso l'alto fino a raggiungere lentamente la superficie | È un processo tipico delle ferite chirurgiche, molto lento e suscettibile di infezioni | È una caratteristica che può interessare le ferite lacero contuse e raramente si complica in processi infettivi | Interessa prevalentemente le ferite da ustione ed esita in una cicatrice minima | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 397 | In una persona non cosciente se le vie aeree sembrano ostruite dopo il primo tentativo di ventilazione, il soccorritore deve: | Riposizionare il capo e provare a ventilare | Iniziare le compressioni toraciche | Posizionare il paziente in posizione laterale | Proseguire nella sequenza con la ventilazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 398 | Quando si pianifica una sessione di educazione ad un paziente vi sono diversi fattori da prendere in considerazione. La paziente ha 65 anni e verrà dimessa con ilostomia, il decorso post-intervento è nella norma. Indicare la situazione maggiormente appropriata: | L'assistita è sveglia da 2 ore, sono le 17.00, è in poltrona da 10 minuti. Informo che la durata della sessione è di 20 minuti, la dimissione è programmata tra 2 giorni, è presente il marito | L'assistita è sveglia da 2 ore, sono le 17.00, è in poltrona da 10 minuti. Informo che la durata della sessione è di 20 minuti, è stata informata che dovrà fare una TAC di controllo tra 40 minuti. La dimissione è programmata tra 2 giorni, sono presenti il marito e la figlia | L'assistita è sveglia da 2 ore, sono le 17.00, è in poltrona da 10 minuti. Informo che la durata della sessione è di 20 minuti, la dimissione è programmata tra 2 giorni. Il familiare si è dovuto assentare | L'assistita è sveglia da 15 minuti, solo le 17.00, verrà messa in poltrona. Informo che la durata della sessione è di 50 minuti, la dimissione è programmata tra 2 ore, è presente un amico che non vive con la signora | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 399 | Il Piano Sanitario Nazionale ha durata: | Triennale | Biennale | Quadriennale | Quinquennale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 400 | Di norma il primo segno di disidratazione nel paziente anziano è : | La secchezza della bocca | La secchezza delle mucose comprese quelle dell'occhio | L'affaticamento | Il mal di testa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 401 | La più importante conseguenza a seguito della somministrazione di un unico dosaggio eccessivo di benzodiazepine può essere: | Depressione del respiro | Dipendenza psicologica | Ipertonia muscolare | Tutte le precedenti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 402 | Indicare la descrizione più completa e corretta nel definire le caratteristiche della Lesione da Decubito di 3° stadio. | Sede: sacrale. Dimensioni: 20 nmm x 35mm. Fondo: granulazione. Essudato: scarso. Bordo: arrossato. Cute circostante macerata. Fistole: assenti. Segni di infezione: assenti. Lesione non maleodorante. Ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può estendersi fino alla fascia muscolare senza attraversarla; la lesione si presenta clinicamente come una profonda cavità che può presentare dei tratti sotto minati | Sede: sacrale. Dimensioni: 2 mm x 35mm. Fondo: granulazione. Essudato: scarso. Bordo: arrossato. Cute circostante macerata. Fistole: assenti. Segni di infezione: assenti. Lesione non maleodorante. Ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può estendersi fino alla fascia muscolare senza attraversarla; la lesione si presenta clinicamente come una profonda cavità che può presentare dei tratti sotto minati | Sede: trocantere sinistro. Dimensioni: 20 mm x 35mm. Fondo: granulazione. Essudato: scarso. Bordo: arrossato. Cute circostante integra. Fistole: assenti. Segni di infezione: assenti. Lesione non maleodorante. Ferita a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma (abrasione, vescicola o cratere) | Sede: sacrale. Dimensioni: 20 nmm x 35mm. Fondo: fiuttente. Essudato: abbondante. Bordo: lineare. Cute circostante macerata. Fistole: assenti. Segni di infezione: assenti. Lesione non maleodorante. Ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può estendersi fino alla fascia muscolare senza attraversarla; la lesione si presenta clinicamente come una profonda cavità che può presentare dei tratti sotto minati | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 403 | Nella fase di accertamento infermieristico al paziente che all'atto del ricovero è valutato come potenzialmente disfagico, si applica lo screening della deglutizione. Per valutare la deglutizione si somministrano piccole quantità di acqua gel. In seguito, si riscontra nel paziente l'alterazione della qualità della voce e la comparsa di tosse. Indicare l'intervento più adeguato. | Non somministrare nulla per bocca e richiedere il consulto del medico per considerare il supporto nutrizionale artificiale | Attendere che il sintomo passi a ripetersi la valutazione della deglutizione | Eseguire un ulteriore test di deglutizione con piccole quantità di acqua di rubinetto | Mettere il paziente in posizione di sicurezza e avvisare tempestivamente il servizio di Rianimazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 404 | Se si utilizza l'operazione booleano OR nel seguente modo "lesione OR ferita" si ottiene: | Una lista di pagine che contengono la parola lesione o la parola ferita o entrambe | Una lista di pagine che contengono la parola lesione e non la parola ferita | Una lista di pagine che contengono la parola ferita e non la parola lesione | Una lista di pagine che non contengono entrambe le parole | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 405 | In presenza di una persona con ipoglicemia grave con perdita di conoscenza, quale dei seguenti farmaci bisogna preparare perché con ogni probabilità verrà prescritto: | Glucagone per via intramuscolare | Furosemide per via endovenosa | Atropina per via sottocutanea | Adrenalina per via endoverosa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 406 | Nell'ambito della valutazione della qualità, il confronto tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati effettivamente raggiunti esprime: | L'efficacia | L'economicità | L'efficienza | L'appropriatezza | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 407 | La formulazione completa della diagnosi infermieristica comprende: | Il titolo diagnostico, il fattore correlato e le caratteristiche definenti | Il titolo diagnostico, il fattore correlato ed i sintomi soggettivi | Il titolo diagnostico, la diagnosi medica e i dati delle indagini strumentali | Il problema di salute percepito dal paziente, la causa ed i sintomi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 408 | "Il paziente ha una dipendenza totale nelle Activities of Daily Living (ADL); i parametri sono buoni. È in fase di dimissione e presso il suo domicilio è previsto il mantenimento dell'ossigeno terapia con occhiali e bombola". In base ai dati disponibili: | L'igiene a letto può essere attribuita all'OSS | L'igiene a letto deve essere effettuata da un infermiere ed un OSS | L'igiene a letto deve essere effettuata dall'infermiere | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 409 | Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ attribuisce valore giuridico al Codice Deontologico" | La legge n. 42/1999 | La legge n. 1/2002 | Il D.P.R. n. 255/1974 | Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 410 | Indicare i segni e sintomi più corretti da valutare nella fase di accertamento in un paziente affetto da cirrosi epatica scompensata. | Valutazione aspetto cognitivo (orientamento temporo-spaziale, difficoltà di concentrazione); presenza di edemi declivi; ascite; presenza di emorragia (ematemesi/melena); stato della cute (ittero, poliangectasie); livello di compromissione sistema nervoso (tremori) | Valutazione aspetto cognitivo (orientamento temporo-spaziale, difficoltà di concentrazione); presenza di edemi declivi; ascite; valutazione stato nutrizionale e idratazione; stato della cute (ittero, poliangectasie); livello di compromissione sistema nervoso (tremori) | Valutazione aspetto cognitivo (orientamento temporo-spaziale, difficoltà di concentrazione); pressione venosa centrale, ascite; presenza di emorragia (ematemesi/melena); stato della cute (ittero, poliangectasie); livello di compromissione sistema nervoso (tremori) | Valutazione dei parametri vitali (pressione, frequenza); presenza di edemi declivi; ascite; presenza di emorragia (ematemesi/melena); stato della cute (ittero, poliangectasie); livello di compromissione sistema nervoso (tremori) | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 411 | La segnalazione degli eventi avversi (Incident Reporting) prevede l'indicazione dei fattori che possono aver contribuito all'evento. Indicare il gruppo di fattori più corretto. | Mancata adesione del paziente al progetto terapeutico, inadeguate conoscenze del personale, inadeguato funzionamento attrezzature | Mancata adesione del paziente al progetto terapeutico, variazione improvvisa dei parametri vitali del paziente, attrezzature eccessivamente sofisticate | Complessità della terapia, personale non qualificato, inadeguato funzionamento attrezzature | Barriere linguistiche del paziente, gruppo multidisciplinare, attrezzature eccessivamente sofisticate | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 412 | Viene ricoverato dal pronto soccorso un paziente maschio di 18 anni, presente sudorazione, tremore, palpitazioni, debolezza generale, glicemia 65 mg/dl, riferisce nelle ultime due settimane polidipsia e poliuria, aumento dell'appetito e perdita peso > 20% negli ultimi 2 mesi. Il sospetto diagnostico potrebbe essere: | Diabete di tipo I | Diabete di tipo II | Diabete insipido tipo I e II | Probabilmente è affaticato da un'intensa attività fisica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 413 | Completare la frase con l'opzione corretta: "La _____ non è un parametro incluso nella Glasgow Coma Scale" | Termoregolazione | Risposta verbale | Apertura occhi | Risposta motoria | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 414 | In una struttura residenziale, si vuole progettare uno strumento di monitoraggio della disidratazione negli anziani da attivare nel periodo estivo. Per individuare in letteratura i segni/sintomi maggiormente predittivi di disidratazione, quale tra i seguenti quesiti riflette in maniera più corretta la metodologia PICO per ricercare la letteratura su MedLine: | Nella popolazione anziana istituzionalizzata, quali sono i segni/sintomi predittivi di disidratazione? | In casa di riposo, quali strumenti sono più efficaci per il monitoraggio della disidratazione? | È più a rischio di disidratazione la popolazione anziana istituzionalizzata o quella gestita a domicilio da un infermiere di comunità? | È più efficace la somministrazione di infusioni per via intradermica o per via endovenosa nella prevenzione della disidratazione degli anziani? | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|--------------------------|
| 415 | Le principali complicanze croniche del diabete mellito sono: | Neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, retinopatia diabetica, malattie cario vascolari, piede diabetico, complicanze in gravidanza | Coma ipoglicemico, neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, glaucoma | Infarto, scompenso cardiaco, ictus, piede diabetico, coma chetoacidotico | Coma ipoglicemico, glaucoma, infarto, scompenso cardiaco | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 416 | Le cure palliative sono rivolte: | Sia alla persona malata che alla sua famiglia per la cura attiva e totale, quando la malattia di base è contraddistinta da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta che non risponde più a trattamenti specifici | Esclusivamente a pazienti con patologie nefrologiche | Esclusivamente a pazienti con patologie oncologiche | Esclusivamente a pazienti oncologici che hanno terminato la chemioterapia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 417 | Con l'allattamento materno esclusivo si intende: | Solo latte materno senza alcuna aggiunta | Solo latte materno e acqua | Solo latte materno e soluzione glucosata | Solo latte materno ed elettrolitica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 418 | Per screening si intende: | Un percorso (con test e/o esami strumentali) condotto a tappeto su una fascia più o meno ampia della popolazione, allo scopo di individuare una patologia o ancora meglio i suoi prodromi, prima che si manifesti con i sintomi | Un percorso (con test ed esami strumentali) condotto su una fascia di popolazione particolarmente a rischio per una determinata patologia | Un test per valutare il quoziente intellettivo | Un percorso (con test e/o esami strumentali) condotto su tutta la popolazione che presenta lo stesso sintomo, riconducibile ad una particolare patologia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 419 | Il respiro di Cheyne-Stokes è contraddistinto da: | Respiri profondi alternati a brevi periodi di apnea | Frequenza cardiaca a 80 atti al minuto | Frequenza respiratoria inferiore a 20 atti al minuto | Frequenza respiratoria superiore a 12 atti al minuto e respiro profondo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 420 | Completare la frase con l'opzione corretta: " Il _____ può configurare ipotesi di responsabilità professionale colposa" | Comportamento negligente, imprudente, imperito | Mancato rispetto dei regolamenti e delle procedure aziendali | Mancato rispetto del codice deontologico | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 421 | Nella valutazione dello screening nutrizionale può essere applicata la scala: | MNA (Mini nutritional assessment) | Di Barthel | Di Painad | Di Tinetti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 422 | In caso di ostruzione parziale delle vie aeree la manovra di Heimlich: | Non deve essere praticata | Deve essere praticata solo se la vittima è priva di coscienza | Deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente | Deve essere praticata sempre | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 423 | Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere" | Il lavaggio delle mani | La dotazione di antibiotici | Il ricambio quotidiano della biancheria del letto | La dotazione di disinfettanti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 424 | Le norme d'uso del registro di carico-scarico delle sostanze stupefacenti identificano nel Coordinatore Infermieristico: | Il responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze stupefacenti | Colui che accerta, attraverso periodiche ispezioni, la corretta tenuta del registro di carico e scarico del reparto | L'incaricato della buona conservazione del registro | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 425 | Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ causano l'insufficienza renale cronica (IRC)" | Tutte le altre risposte sono corrette | Le malattie nefrovascolari | Le glomerulonefriti | Il diabete | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 426 | Al fine della preparazione dei set chirurgici, i ferri chirurgici devono essere sottoposti alle fasi del processo seguenti: | Decontaminazione-disinfezione-sterilizzazione | Sterilizzazione-disinfezione-sanificazione | Disinfezione-decontaminazione-sterilizzazione | Sterilizzazione-decontaminazione-disinfezione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 427 | Per sterilizzazione si intende: | Un processo atto alla distruzione di tutti i microorganismi patogeni, non patogeni e spore comprese | Un processo atto all'abbassamento della carica microbica da oggetti e superfici | Un processo atto alla distruzione dei soli microorganismi patogeni | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 428 | Il rilievo della pressione dell'arteria polmonare è possibile soltanto: | Attraverso il catetere di Swan Ganz o similari | Negli interventi di cardiocirurgia e chirurgia toracica | Con una particolare apparecchiatura denominata IABP | Attraverso la sonda Sengstaken-Blakemore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 429 | Il Caregiver è: | Colui che fornisce assistenza e si prende cura di una persona non in grado di prendersi cura di sé | L'infermiere che si prende cura del paziente durante il periodo di degenza | Il medico di Medicina generale che si prende cura del suo assistito | Il fisioterapista che ha in carico l'assistito | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 430 | La raccomandazione n.8 del Ministero della salute per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari ricorda che tali episodi sono favoriti da: | Lunghe attese nelle zone di emergenza e accettazione che favoriscono sensazioni di frustrazione nell'utenza | Assenza di linee guida | Continuo ricambio del personale sanitario | Assenza di procedure professionali | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 431 | Le fiali di KCL devono essere conservate: | In un apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco pericoloso" | Chiuse a chiave nella cassaforte degli "stupefacenti" | Assieme ai farmaci per uso parentale | Assieme ai farmaci per uso orale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 432 | Completare la frase con l'opzione corretta: "L'infermiere si aspetta di trovare il batterio _____ alle analisi di laboratorio per un paziente in cui si sospetta la patologia dell'ulcera peptica" | Helicobacter pylori | Micrococcus | Corynebacterium | Staphylococcus Aureus | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|--------------------------|
| 433 | Un paziente riferisce bruciore durante la minzione e aumentata frequenza minzionale. L'infermiere nota che un campione di urina sterile è torbida. Questi segni e sintomi sono dovuti a: | Cistite | Calcolo renale | Emorragia | Incontinenza | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 434 | Tenere un sacchetto di drenaggio per catetere di tipo Foley in una posizione più bassa rispetto alla vescica previene: | Il reflusso urinario | La ritenzione urinaria | L'incontinenza riflessa | L'incontinenza urinaria | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 435 | La quantità di sangue da prelevare per ogni campione di emocoltura è di: | 20 cc | 1 cc | 3-4 cc | 5-10 cc | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 436 | Durante la notte un paziente presenta uno stato confusionale acuto e tenta di rimuoversi più volte la cannula tracheostomica. Il medico di guardia è impegnato per un'urgenza. L'infermiere: | Applica e documenta in cartella infermieristica la contenzione fisica, in quanto sussiste un reale pericolo per il paziente. Quindi lo monitora e attende l'arrivo del medico di guardia per discutere il caso | Contatta il parente più prossimo da cui acquisisce il consenso telefonico per la contenzione fisica | Attende il medico di guardia, sperando che il paziente non si rimuova la cannula. Non può intraprendere alcuna decisione in autonomia | Applica la contenzione farmacologica a basse dosi secondo il protocollo previsto dalla unità operativa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 437 | Per effettuare un'iniezione intramuscolare in un bambino di 10 mesi, l'infermiere sceglie la: | Sede del vasto laterale | Sede ventrogluteale | Sede dorsogluteale | Sede deltoidea | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 438 | Nell'aspirazione di un farmaco da flacone, l'infermiere inietta aria all'interno: | In quanto crea pressione positiva rendendo più facile l'aspira | In nessun caso per l'elevato rischio di contaminazione | Solo per i farmaci viscosi | In nessun caso in quanto si crea pressione negativa e risulterebbe più difficoltoso aspirare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 439 | Il medico, durante la visita, prescrive il posizionamento di gambaletti elastocompressivi antitrombo di I° a un paziente. Per ottenere la giusta misura delle calze l'infermiere rileva la: | Misura della lunghezza di entrambe le gambe, dal tallone alla zona poplitea, e misura della circonferenza del polpaccio nel punto più largo | Misura della lunghezza della gamba destra dal tallone alla zona poplitea e misura della circonferenza del polpaccio nel punto più ampio | Misura della lunghezza di entrambe le gambe dal tallone alla zona poplitea | Misura della circonferenza del polpaccio nel punto più largo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 440 | Per la ricerca del sangue occulto fecale sono necessari: | 1 campione | 4 campioni, uno per ogni diversa evacuazione | 3 campioni prelevati dalla stessa defecazione | 2 campioni, uno per ogni diversa defecazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 441 | È in preparazione il trasferimento di un paziente presso il reparto di Malattie infettive per tubercolosi polmonare in fase attiva. Cosa bisogna predisporre: | Camera di isolamento respiratorio a pressione negativa continua | Camera di isolamento respiratorio a pressione positiva intermittente | Camera di isolamento respiratorio a pressione positiva continua | Camera di isolamento respiratorio a pressione negativa intermittente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 442 | All'ingresso della stanza di degenza di un paziente con tubercolosi polmonare in fase attiva si dovranno predisporre: | Guanti, sovracamici, mascherine chirurgiche, scermeri facciali, maschere filtranti | Maschere filtranti | Maschere chirurgiche e guanti | Maschere filtranti e mascherine chirurgiche | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 443 | In reparto due pazienti ricoverati nella stessa stanza risultano positivi al C. Difficilis. L'infermiere: | Predisporre le misure di isolamento funzionale, mantenendo i pazienti nella stessa stanza | Predisporre le misure di isolamento funzionale e sposta i pazienti in due stanze diverse | Mantiene i pazienti nella stessa stanza senza predisporre i DPI | Sposta i pazienti in due diverse stanze con bagno in comune | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 444 | L'infermiere deve somministrare soluzione fisiologica 2.000 ml in 24 ore. Bisogna impostare il dispositivo di gocciolamento controllato alla velocità di quanti ml/h? | 83 | 104 | 62 | 50 | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 445 | In caso di richiesta medica per "Indici di flogosi", vengono prescritti i seguenti esami ematici, eccetto: | Proteinuria | VES | PCR | Emocromo con formula | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 446 | In un paziente con ileostomia, le feci fuoriescono: | Liquide | Solide | Acoliche | Miste a muco | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 447 | Il digiuno nelle 6-8 ore precedenti deve essere predisposto nella procedura diagnostica: | TC torace con mezzo di contrasto | RX torace | EGA | MOC | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 448 | Per la detersione di una colostomia si utilizza: | Soluzione fisiologica 0,9% | Acqua e sapone neutro | Iodio Povidone | Clorexidina 0,2% | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 449 | Completare la frase con l'opzione corretta: "_____ è opportuno effettuarlo al mattino" | Lo Scotch test | L'indice di flogosi | L'EGA | Il prelievo per l'emocoltura | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 450 | Per ridurre l'edema in un arto superiore si deve posizionare la: | Mano più alta del gomito, il gomito più alto della spalla | Mano più alta del gomito | Mano più alta del polso | Mano più alta del gomito in posizione semiseduta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 451 | Un paziente cade dal letto mentre tenta di spostarsi in autonomia sulla sedia, non riportando danni evidenti. L'infermiere: | Avverte il medico, e invia la segnalazione alla Direzione sanitaria/Gestione del rischio clinico, documentando l'accaduto in cartella | Non avverte il medico e accompagna il paziente nuovamente a letto, alzando le spondine | Non avverte il medico, ma posiziona una pettorina contenitiva per il periodo in cui il paziente rimane seduto sulla sedia | Avverte il medico, ma non invia la segnalazione alla Direzione sanitaria/Gestione del rischio clinico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 452 | Un paziente ricoverato presenta abbondante essudato giallastro maleodorante nella lesione cutanea. L'infermiere applica: | Una medicazione all'argento più prelievo tampone da inviare in microbiologia | Una garza betadinata | Una medicazione idrocolloide | Una garza betadinata più prelievo tampone da inviare in microbiologia | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|--------------------------|
| 453 | Nel reparto di Terapia intensiva sono aumentati i casi di infezione delle vie respiratorie nei pazienti ricoverati. L'infermiere deve: | Porre maggiore attenzione all'igiene del cavo orale | Porre maggiore attenzione all'igiene personale | Broncoaspirare tutti i pazienti almeno due volte per turno | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 454 | Completare la frase con l'opzione corretta: " In caso di dimissione difficile, è utile somministrare la _____ per agevolare l'équipe multidisciplinare nella pianificazione di una continuità assistenziale di cura sul territorio" | Scala BRASS | Scala di Conley | Scala ReTos | Scala di Barthel | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 455 | Completare la frase con l'opzione corretta: "La figura del _____ non fa parte del Servizio di igiene e sanità pubblica" | Infermiere generico | Tecnico | Medico igienista | Assistente sanitario | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 456 | L'elettroshock può essere somministrato con: | Consenso scritto del paziente e presenza di indicazioni terapeutiche | Consenso della famiglia e assenza di controindicazioni | Richiesta espressa del tutore e presenza di indicazioni terapeutiche | Fallimento di altre terapie e pericolosità sociale del paziente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 457 | La tossina prodotta dal clostridium botulinum provoca manifestazioni a carico del: | Sistema nervoso | Sistema linfatico | Fegato | Rene | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 458 | L'agopuntura e la fitoterapia possono essere esercitate: | Solo da medici abilitati | Solo da operatori abilitati con corsi professionali | Anche da infermieri e ostetriche specializzati | Anche da terapisti di varie categorie | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 459 | Il campo proprio di esercizio e responsabilità di un professionista è descritto nel: | Profilo professionale | Codice deontologico | Contratto di lavoro | Codice civile dell'impiegato | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 460 | In base alla legge n. 180/1978 le persone affette da malattia mentale: | Devono essere ricoverate in un ospedale generale, in servizi specifici | Devono essere seguite da personale appositamente preparato | Devono essere ricoverate in un ospedale specializzato | Possono essere ricoverate per non meno di venti giorni | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 461 | L'attività dei disinfettanti chimici è in genere ridotta: | Dalla presenza di materiale organico | Dalla presenza di spore | Dalla bassa temperatura ambientale | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 462 | Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ può essere utilizzato per gli strumenti endoscopici" | La glutaraldeide | La paraformaldeide | Il sale di ammonio quaternario | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 463 | Indicare l'affermazione errata rispetto alla sedazione terminale e palliativa (SICP,2006): | Comprende anche un approccio con terapia ansiolitica | Consiste nella riduzione della vigilanza con mezzi farmacologici per il controllo del sintomo refrattario | Non comprende la sedazione occasionale | La perdita di coscienza non è l'aspetto primario, ma solo l'effetto collaterale del farmaco | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 464 | Una persona, stando in piedi su una base instabile, migliora le sue condizioni di equilibrio quando: | Flette e allarga le gambe | Tiene le gambe strette | Flette le gambe | Allarga le gambe | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 465 | Completare la frase con l'opzione corretta: " _____ costituisce un rischio specifico da considerare in caso si fibrillazione atriale, anche se sottoposta a cardioversione" | La tromboembolia arteriosa | L'arresto cardiaco improvviso | L'extrasistolia notturna | L'ustione da scarica elettrica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 466 | Per uniformare le procedure relative ad una tecnica (es. cateterismo vescicale) all'interno dell'équipe è opportuno utilizzare: | Protocolli assistenziali | Consegna | Cartella Infermieristica | Passaparola | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 467 | Quali sono tutte le fasi del processo assistenziale? | Informativa, organizzativa, esecutiva, valutativa | Informativa, organizzativa, esclusiva | Informativa, di complicità, organizzativa | Informativa, dissociativa, inclusiva, contestativa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 468 | Qual è la prima fase del processo assistenziale? | La fase informativa | La fase organizzativa | La fase valutativa | La fase dissociativa di intervento | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 469 | Nell'ambito del nursing, secondo Florence Nightingale: | Intervenire sull'ambiente e sull'igiene contribuisce al benessere dell'uomo | L'ambiente non ha nessuna correlazione con il benessere dell'uomo | gli antibiotici sono gli unici elementi che possono contribuire al benessere dell'uomo | il lavoro di équipe è controproducente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 470 | L'empiema è una raccolta di: | Pus in una cavità preformata | Pus in una cavità neoformata | Sangue in una cavità preformata | Sangue in una cavità neoformata | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 471 | La FIVET è: | Una tecnica di riproduzione assistita | Una malattia esantematica | Una tecnica di biologia molecolare | Una malformazione cardiaca congenita | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 472 | Le scale EWS (Early Warning Score) misurano: | L'instabilità/ degrado dei parametri vitali del paziente | Il rischio di infezione catetere venoso correlato | La complessità assistenziale | Il grado di dispnea nel paziente BPCO | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 473 | Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza? | Trombosi | Setticemia | Pneumotorace | Flebite | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 474 | Nel suo testo "From Novice to Expert" è stata trattata l'analisi della socializzazione e l'acquisizione delle abilità della professione infermieristica. Questa affermazione si riferisce a: | Patricia Benner | Callista Roy | Nancy Roper | Martha Roger | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|--------------------------|
| 475 | Quale tra i seguenti antibiotici appartiene alla famiglia di macroliti? | Eritromicina | Amikacina | Gentamicina | Tobramicina | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 476 | Quale tra i seguenti farmaci è generalmente indicato per indurre il parto a termine? | Ossitocina | Combinazione di ergonovina e indometacina e molta acqua | Ergonovina | Indometacina | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 477 | La minzione avviene quando: | I muscoli pelvici si rilassano e i muscoli addominali si contraggono | Il sistema simpatico attivato stimola lo sfintere interno | Il filtrato glomerulare entra nei tubuli | L'aumento della pressione stende il muscolo detrusore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 478 | L'iperplasia di un organo o di un tessuto consiste nell'aumento: | Del numero di cellule | Del contenuto idrico cellulare | Del volume cellulare | Del contenuto ematico cellulare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 479 | Cosa sono i farmaci LASA? | Farmaci che possono essere confusi con altri | Farmaci equivalenti | Farmaci per uso compassionevole | Farmaci galenici | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 480 | La "regola delle 7 G" nella somministrazione di un farmaco NON prevede: | Giusta trascrizione | Giusto dosaggio | Giusta prescrizione | Giusta registrazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 481 | Cosa si intende per infezioni crociate ospedaliere? | Infezioni che si originano e si diffondono all'interno di un singolo ospedale | Infezioni per le quali è necessario il ricovero ospedaliero | Infezioni che non si sviluppano in ospedale | Infezioni che si verificano in più ospedali di una stessa città contemporaneamente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 482 | La sincope causata da sforzi estremi o paura è classificata come: | Sincope vasovagale | Sincope da ipotensione ortostatica | Sincope cardiaca | Sincope del seno carotideo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 483 | Per la stratificazione della severità del quadro clinico di quale patologia è utilizzata la classificazione NYHA? | Insufficienza cardiaca | BPCO | Infarto miocardico | Cirrosi epatica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 484 | L'atteggiamento di caring è: | Proprio dei professionisti che operano in campo socio sanitario e in altri campi | Esclusivo della professione infermieristica | Esclusivo degli psicologi | Esclusivo dei professionisti che operano in campo socio sanitario | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 485 | Quale delle seguenti condizioni di per sé NON rappresenta un'indicazione sufficiente ad orientare la decisione per l'adozione di un cateterismo vescicale a permanenza? | Mobilità compromessa | Ricorrente ritenzione urinaria | Incontinenza in presenza di lesioni da pressione | Interventi chirurgici con anestesia generale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 486 | Per eminegligenza si intende una condizione dovuta a: | Una compromissione delle risposta sensoriale e motoria, della rappresentazione mentale e dell'attenzione spaziale corporea e dell'ambiente caratterizzata da una inattenzione verso una parte del corpo e una iperattenzione verso l'altra | Nessuna delle altre risposte è corretta | Una compromissione delle motoria e dell'attenzione spaziale corporea e dell'ambiente caratterizzata da una maggiore attenzione verso una parte del corpo rispetto all'altra | Una compromissione delle risposta sensoriale e motoria di un emisoma | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 487 | La causa di danno più frequente nei pazienti ospedalizzati sono: | le terapie farmacologiche | gli interventi chirurgici | le procedure ostetriche e ginecologiche | le procedure mini invasive | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 488 | L'intubazione orotracheale rispetto a quella nasotracheale: | presenta un minor rischio di infezione dei seni paranasali | presenta maggiore tollerabilità | nessuna delle altre risposte è corretta | garantisce maggiore stabilità | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 489 | L'accertamento di morte cerebrale prevede un periodo di osservazione pari a: | 6 ore | 12 ore | 20 minuti con ECG | 6 ore negli adulti, 12 ore nei bambini tra 1 e 5 anni e 24 ore nei bambini < 1 anno | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 490 | Per favorire la cicatrizzazione del moncone ombelicale è necessario tenere: | il moncone rivolto verso l'alto, fuori dal pannolino, avvolto in una garza sterile e fissato con rete elastica | il moncone al di sotto del pannolino rivolto verso il basso e non esposto all'aria | il moncone imbevuto di soluzione fisiologica per evitare la disidratazione che ritarda la cicatrizzazione | avvolto in garza sterile, imbevuta di soluzione iodata per facilitare l'essiccazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 491 | Devi predisporre il bilancio idrico in un paziente con scompenso cardiaco a domicilio, quali sono gli interventi più completi e pertinenti: | Controllo del peso giornaliero, controllo dei parametri vitali, registrazione dei liquidi in entrata ed uscita | Controllo nutrizionale metabolico e registrazione dei liquidi in entrata ed uscita | Nessuna delle altre risposte è corretta | Somministrazione dieta iposodica e controllo del peso corporeo due volte a settimana | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 492 | Devi procedere nella medicazione di una ferita chirurgica settica. Quale delle seguenti è la procedura corretta: | Procedere dalla parte più pulita alla parte più sporca della ferita mantenendosi sopra la ferita stessa. Cambiare tampone per disinfettare altre zone della cute | Procedere dalla parte più sporca alla parte più pulita della ferita mantenendosi sopra la ferita stessa. Disinfettare altre zone della cute | Disinfettare prioritariamente le altre zone della cute circostante procedendo poi dalla parte più pulita a quella più sporca | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 493 | Come si effettua la tosse efficace per la persona operata? | Porre le mani sul punto di incisione, assumere un posizione leggermente flessa in avanti, inspirare profondamente con la bocca leggermente aperta e dare 3-4 colpi di tosse | Porre le mani sul sito di incisione, assumere la posizione eretta, inspirare profondamente, dare 3-4 colpi di tosse, ed espellere le secrezioni | Nessuna delle altre risposte è corretta | Porre un cuscino sul sito di incisione, assumere la posizione di Fowler, inspirare lentamente, dare 6-8 colpi di tosse, ed espellere le secrezioni | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 494 | Quale tra le seguenti è una metodica di somministrazione dell'aerosolterapia? | Tutte le altre risposte sono corrette | Spray con distanziatore | Apparecchio pneumatico | Apparecchio ad ultrasuoni | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|--------------------------|
| 495 | Un paziente ricoverato nel tuo reparto viene sottoposto a paracentesi, delle seguenti azioni quale è quella corretta? | Misuri e registri il volume e le caratteristiche del liquido raccolto | Posizioni il paziente durante la procedura in Trendellemburg anteriore | Durante la procedura misuri costantemente la temperatura corporea | Tutte le altre risposte sono corrette | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 496 | Individua l'azione NON corretta nell'esecuzione di un esame urine con strisce reagenti: | Fornire alla persona un contenitore sterile per la raccolta delle urine | Accertare e segnalare le presenza di fattori che possono influenzare il campione | Immergere la striscia reagente nel campione delle urine per il tempo indicato dalle istruzioni | Confrontare i cambiamenti di colore con la tabella colorimetrica presente sul contenitore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 497 | Cos'è la scala di Norton: | uno strumento di valutazione utile ad individuare pazienti a rischio di lesione cutanea da pressione | una scala analogico visuale per la autovalutazione del dolore | uno strumento di rilevazione del danno sensoriale | uno strumento di valutazione per individuare il grado di dipendenza del paziente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 498 | In caso di vene varicose agli arti inferiori, quale delle seguenti raccomandazioni non è indicata? | Mantenere più a lungo possibile la posizione sdraiata | Evitare di mantenere per lungo tempo la posizione eretta | Usare calze elastiche | Tenere gli arti sollevati | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 499 | Se un paziente deve subire un intervento chirurgico d'urgenza, quale tra i seguenti interventi deve essere effettuato per primo dall'infermiere? | Incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici | Somministrare la pre anestesia | Avvisare i familiari | Posizionare un catetere vescicale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 500 | Nell'istillazione di gocce oculari, l'infermiere deve: | Tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore | Tirare delicatamente verso l'alto la palpebra superiore | Chiedere al paziente di guardare verso il pavimento | Appoggiare delicatamente il contagocce alle ciglia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 501 | Per pollachiuria si intende: | L'elevata frequenza delle minzioni | La perdita involontaria di urine | L'eccessiva quantità di urina prodotta | La minzione difficoltosa e dolorosa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 502 | In caso di pneumotorace, il catetere inserito in cavità pleurica deve: | Essere collegato a valvola ad acqua | Essere collegato a sacchetto sterile a caduta | Restare clampato in prima giornata | Essere lasciato aperto ma sotto medicazione occlusiva | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 503 | In un paziente con pneumotorace che viene portato in pronto soccorso, l'infermiere deve accertare: | Cianosi, dispnea, possibile spostamento tracheale, tachicardia | Sudorazione, midriasi, bradicardie, ipotensione | tutte le altre risposte sono corrette | Bradipnea, ipotensione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 504 | Per accertare una persona che presenta insufficienza cardiaca destra un infermiere deve: | controllare se sono presenti giugulari distese quando il letto è inclinato di 45 gradi | auscultare uno sfregamento pericardico | controllare l'irradiazione della sensazione opprimente sotto lo sterno | auscultare suoni cardiaci S1 e S2 cupi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 505 | La scala di EXTON-SMITH si usa per: | valutare il rischio di insorgenza di lesioni da decubito | valutare il rischio di infezione di una ferita chirurgica | valutare lo stato nutrizionale | valutare lo stato mentale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 506 | La scala di braden identifica i pazienti a rischio ed ha un valore soglia di: | 16 | 17 | 23 | 15 | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 507 | Se un infermiere riporta in cartella infermieristica un valore calcolato con l'utilizzo della scala ASEPSIS, significa che ha effettuato una valutazione: | Sul processo di guarigione di una ferita chirurgica | Sul processo di sterilizzazione | Sul rischio di contrarre infezioni, stimato nella fase precedente l'intervento chirurgico | Sul rischio di contrarre infezioni, rilevato dopo l'intervento chirurgico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 508 | Cosa valuta la scala di Maslow? | Le necessità e i bisogni dell'uomo | Lo stato di coscienza | Il rischio infettivo | Il rischio professionale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 509 | Quali sono le componenti fondamentali della pratica infermieristica? | Tutte le altre risposte sono corrette | L'olismo, la difesa e il sostegno della persona | L'assistenza e l'educazione dell'utente | La promozione, il mantenimento ed il ripristino della salute | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 510 | Con il termine anuria si intende la: | mancata produzione di urina | produzione di urina > a 500 ml/24 ore | mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica | produzione di urina < a 500 ml/24 ore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 511 | Interrogando una banca dati mediante la striscia di ricerca "emicrania AND cefalea", si ottengono: | Solo gli articoli che contengono entrambi i termini "emicrania" e "cefalea" | Solo gli articoli che contengono "emicrania", "AND" e "cefalea" | Qualsiasi articolo che contenga il termine "emicrania" o in alternativa "cefalea" | Gli articoli dove i termini "emicrania" e "cefalea" sono utilizzati dagli autori come sinonimi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 512 | Le infezioni ospedaliere maggiormente riscontrate nei nosocomi italiani secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute sono le: | infezioni del tratto urinario | nessuna delle altre risposte è corretta | infezioni della ferita chirurgica | infezioni delle vie respiratorie | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 513 | La principale azione della digitale nel trattamento della insufficienza cardiaca è: | l'aumento della forza contrattile del cuore | diminuzione della cronotropia | la riduzione della frequenza cardiaca | il controllo della diuresi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 514 | Completare la seguente frase con l'opzione corretta: "Per tachicardia si intende una frequenza _____ battiti al minuto". | superiore a 100 | tra 60 e 70 | tra 80 e 90 | tra 70 e 80 | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 515 | Un ago 22 gauge rispetto a un ago 18 gauge è: | Più piccolo | Delle stesse dimensioni ma con filettatura diversa | Di materiale diverso | Più grande | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 516 | Le teorie e modelli infermieristici, per quanto diversi tra loro, hanno in comune alcuni concetti fondamentali; quali? | Uomo, ambiente, salute - malattia, assistenza infermieristica | Diagnosi infermieristica, processo di assistenza e piano di assistenza | Raccolta e analisi dei dati, individuazione del problema del paziente, pianificazione dell'assistenza infermieristica, attuazione e valutazione | Bisogno, autonomia e problema | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|--------------------------|
| 517 | L'incapacità del paziente di evacuare feci normali, la presenza di liquame fecale, lo stimolo continuo a defecare sono condizioni anomale che fanno ipotizzare la presenza di: | un fecaloma | una fistola anorettale | di una fistola urogenitale | emorroidi del terzo stadio | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 518 | La disuria è una minzione: | dolorosa | dolorosa ed ematica | che avviene senza stimolo di urinare | frequente, di poche gocce di urina | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 519 | Nella fase dell'accertamento, l'ispezione è riferita: | Al solo esame visivo | All'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione e alla percussione | All'esame fisico e psichico | All'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione, alla percussione e all'intervista | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 520 | L'Unita Internazionale è la: | Centesima parte di 1 ml | Centesima parte di 10 ml | Decima parte di 1 ml | Cinquantesima parte di 1 ml | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 521 | Il parenchima renale è suddiviso in: | corticale e midollare | capsula e surreni | calici e nefroni | nefroni e tubuli | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 522 | Una ghiandola si definisce endocrina quando: | Il prodotto di secrezione viene riversato direttamente nel sangue | È situata all'interno della cavità addominale | Il prodotto di secrezione viene riversato nel sistema linfatico | È situata nell'apparato digerente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 523 | Tra i fattori di rischio cardiovascolare elencati NON viene normalmente incluso: | L'esercizio fisico | Il peso | La familiarità | Il diabete mellito | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 524 | La professione infermieristica è orientata: | all'uomo nella sua globalità | all'uomo nel suo ambiente | ai bisogni fisici dell'uomo | ai bisogni psicologici dell'uomo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 525 | La diaforesi è: | una profusa sudorazione | una sudorazione normale | la stimolazione elettrica di una miocellula | il trattamento preventivo del plasma per la somministrazione umana | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 526 | L'infusione continua di Dopamina a basse dosi può determinare: | Vasodilatazione nel letto vascolare renale | Vasocostrizione nel letto vascolare mesenterico | Vasocostrizione nel letto vascolare intracerebrale | Moderato aumento della frequenza cardiaca e della forza contrattile del cuore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 527 | Per assorbimento di un farmaco si intende il passaggio di un farmaco: | dal punto di somministrazione al circolo ematico sistemico | dal sistema arterioso a sistema venoso | nessuna delle altre risposte è corretta | dallo stomaco all'intestino | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 528 | L'ipoglosso è un nervo: | motorio | misto | sensitivo | sensoriale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 529 | L'organo del Corti si trova: | Nell'orecchio | Nell'occhio | Nel fegato | Nel pancreas | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 530 | Tra quelle elencate, indicare quale non è una raccomandazione di buona pratica per la corretta gestione del drenaggio chirurgico: | sono tutte raccomandazioni di buona pratica assistenziale | controllare periodicamente la posizione delle varie clamp e valvole | in presenza di cambiamento qualitativo del drenato rispetto agli standard per tipologia d'intervento informare il chirurgo che valuterà la manovra più opportuna da effettuarsi | mantenere il circuito chiuso (asettico) per tutto il periodo di permanenza del dispositivo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 531 | Nelle emorragie dovute a rottura delle varici esofagee è utile: | introdurre una sonda di Sengstaken - Blakemore | usare anticoagulanti | introdurre una sonda di Dormia | procedere con una fundo-plicatio secondo Nissen | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 532 | Il polso paradossale è caratteristico di: | tamponamento cardiaco | pneumotorace | stenosi mitralica post reumatica | stenosi valvolare aortica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 533 | Esaminando la capacità di un paziente nello svolgere correttamente e autonomamente le IADL all'interno di una valutazione multidimensionale, quale delle seguenti attività NON dovrà essere analizzata: | usare i servizi igienici in modo appropriato | usare mezzi di trasporto | utilizzare il telefono | fare acquisti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 534 | Quali sono i cateteri vescicali temporanei: | Nelaton, Tieneman, Mercier | Nessuna delle altre risposte è corretta | Levin, Einhors, Faucher | Foley, Pezzer, Couvelier | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 535 | La Protamina solfato è usato come antidoto: | Dell'eparina | Dei benzodiazepinici | Dei farmaci stupefacenti oppioidi | Dei farmaci non steroidei | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 536 | La tolleranza farmacologica è: | la necessità di aumentare progressivamente le dosi per ottenere lo stesso effetto che all'inizio del trattamento si osserva con dosi minori di farmaco | la necessità di diminuire progressivamente le dosi per avere effetti minori | la possibilità di non dovere diminuire le dosi per ottenere un determinato effetto | la necessità di mantenere le stesse dosi per avere sempre lo stesso effetto | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 537 | Il monossido di carbonio è letale perché: | compete con O2 nel legame con Hb | inibisce la citocromo ossidasi | modifica la struttura della Hb | produce metaemoglobina | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 538 | Il tempo impiegato dall'operatore sanitario per comunicare con la persona assistita: | È tempo di cura | È tempo da impiegare a discrezione dell'operatore | È tempo sprecato | È tempo deciso dalla persona assistita | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 539 | Quale opzione di risposta riporta la definizione di emottisi? | L'emottisi è emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie | L'emottisi è emissione di sangue con le feci | L'emottisi è emissione di sangue dall'apparato urinario | L'emottisi è emissione di sangue proveniente dalle vie digestive | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|--------------------------|
| 540 | Con il termine disfagia si intende: | difficoltà alla deglutizione | assunzione di quantità abnormi di cibo | l'avversione ai cibi | senso di fame insaziabile | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 541 | La diarrea ad acqua di riso è un segno tipico: | Del colera | Della shigellosi | Della colite pseudomembranosa | Del tifo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 542 | L'istamina è immagazzinata nei granuli di: | Mastociti | Fibroblasti | Linfociti | Macrofagi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 543 | L'omeostasi è il mantenimento: | Dell'equilibrio biologico dell'organismo | Del circolo capillare | Della posizione corporea | Della stazione eretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 544 | P.D.C.A. è l'acronimo che indica: | il ciclo di Deming | la pianificazione assistenziale | il ciclo formativo | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 545 | Nella gradazione dei tumori il grado IV definisce i tumori costituiti da cellule: | Indifferenziate | Con differenziazione di medio grado | Il cui grado di differenziazione non è definibile | Molto differenziate | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 546 | L'aumento della frequenza respiratoria si definisce come: | tachipnea | dispnea | iperpnea | polipnea | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 547 | L'entità di un'emorragia digestiva si valuta mediante la diminuzione del valore ematico di: | Emoglobina | Ematocrito | Emazie | Piastrine | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 548 | I seguenti sono tutti segni e sintomi dell'infezione di una ferita chirurgica, eccetto: | cute circostante la ferita fredda e pallida | secrezioni aumentate e purulente | aumento della tumefazione in sede di ferita | eventuale presenza di febbre | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 549 | Il concetto di ambiente secondo il modello concettuale di F. Nightingale è: | inteso in senso globale | essenzialmente fisico | legato al ruolo dell'infermiere | essenzialmente psicosociale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 550 | Con il termine "spazio morto" si fa riferimento a: | Zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi | Zone cicatriziali dalla sensibilità limitata | Zone muscolari non attraversate da fasci nervosi | Parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 551 | Il più comune effetto di una dose tossica di paracetamolo è: | la necrosi epatocellulare | il sanguinamento gastrointestinale | l'agranulocitosi | l'iperpiressia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 552 | La sieroprofilassi: | Conferisce una immunità immediata ma temporanea | Conferisce una immunità naturale e attiva | Attiva una risposta immunitaria duratura nel tempo | In Italia è obbligatoria per patologie come il tetano | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 553 | La parte del cuore che riceve il sangue dalla periferia è: | l'atrio destro | il ventricolo sinistro | l'atrio sinistro | il ventricolo destro | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 554 | Quale tra questi ormoni è deputato al controllo dei meccanismi immunitari? | Timosina | Aldosterone | Glucagone | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 555 | La chiusura di una ferita utilizzando mezzi di sutura è definita: | chiusura per prima intenzione | chiusura per granulazione | chiusura per emostasi | chiusura per seconda intenzione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 556 | Dove è tipicamente localizzato in sede, il dolore anginoso: | retrosternale | mesogastrico | emitorace destro | fosse iliaca sinistra | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 557 | Il termine "anosmia" definisce: | Una riduzione o perdita dell'olfatto | Un'alterazione dell'osmolarità del sangue | Una riduzione o perdita del gusto | Una perdita temporanea del visus | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 558 | Il modello concettuale delle attività di vita è stato elaborato da: | N.Roper | D. Orem | V. Henderson | F. Nightingale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 559 | La febbre remittente è un tipo di febbre in cui: | la temperatura subisce variazioni superiori o inferiori a 1°C senza però raggiungere la defervescenza | si alternano giorni di apiressia a giorni di febbre | la temperatura iniziale tende ad alzarsi al mattino fino al picco massimo nelle ore pomeridiane, per poi scendere e normalizzarsi nelle ore serali, fino al mattino seguente, quando comincerà ad alzarsi di nuovo | la temperatura si mantiene elevata con oscillazioni inferiori a 1°C | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 560 | Gli indicatori della scala di Braden sono: | percezione sensoriale, umidità, attività motoria, nutrizione, frizione e scivolamento | secchezza cutanea, percezione sensoriale, stato funzionale, nutrizione, frizione e scivolamento | umidità, autonomia, nutrizione, stato funzionale, frizione e scivolamento | incontinenza, secchezza cutanea, umidità cutanea, frizione e scivolamento | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 561 | Il valore di "cut off" in una scala di valutazione dell'assistenza è detto anche: | valore soglia | valore liminale | valore di specificità | valore massimale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 562 | L'effetto dromotropo negativo di un farmaco è la capacità di: | Ridurre la velocità di conduzione dei nodi senoatriale e atrioventricolare | Diminuire la frequenza cardiaca | Aumentare la forza contrattile del cuore | Aumentare la frequenza cardiaca | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 563 | Quale tra le seguenti è la definizione corretta di bronchiectasie? | Dilatazioni abnormi ed irreversibili di un tratto dell'albero bronchiale | Dilatazioni reversibili di un tratto dell'albero bronchiale | Restringimenti irreversibili del lume dei bronchi | Di infezioni croniche o ricorrenti dell'apparato respiratorio | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 564 | Gli scambi respiratori avvengono: | negli alveoli | nei bronchioli respiratori | nei bronchi | nella trachea | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|--------------------------|
| 565 | Lo sfintere pilorico è un anello muscolare che separa: | lo stomaco dall' intestino tenue | l'intestino tenue dal crasso | lo stomaco dall' intestino crasso | l'esofago dallo stomaco | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 566 | I pazienti affetti da patologia cronica necessitano di: | informazioni, follow up regolari, sostegno non solo a livello personale ma anche dei caregiver | prestazioni specialistiche monoprofessionali | gestire solo le riacutizzazioni della patologia cronica | assistenza occasionale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 567 | In una persona disfagica, durante il pasto, è indicato controllare la comparsa di: | tosse | tachicardia | voce gorgogliante | pallore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 568 | E'/sono la causa più frequente di emorragia gastro-intestinale: | L'ulcera duodenale | La gastrite erosiva | Le varici esofagee | La gastrite atrofica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 569 | Le dimensioni del bracciale dello sfigmomanometro devono essere commisurate: | Alla costituzione fisica del paziente | Alla statura del paziente | Al sesso del paziente | Alla costituzione fisica del paziente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 570 | La scala di valutazione dell'indice di Brass è utilizzata per: | valutare l'indice di rischio di dimissione difficile | valutare la autonomia dello stato funzionale | tutte le altre risposte sono corrette | valutare il rischio di lesioni da pressione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 571 | Il ferro per via orale va assunto: | A stomaco pieno | Con molta acqua | Secondo le preferenze del paziente | Lontano dai pasti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 572 | L'aorta nasce: | dal ventricolo sinistro del cuore | dall'atrio sinistro del cuore | dal tronco dell'arteria polmonare | dal ventricolo destro del cuore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 573 | Le valvole a nido di rondine si trovano: | nelle vene | nell'aorta ascendente | tra atri e ventricoli | nelle arterie degli arti inferiori | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 574 | In un test di screening la specificità è del 95%. La percentuale di falsi positivi che esso potrà mostrare: | Sarà del 5% | Dipenderà dall'accuratezza dell'esecuzione | Sarà del 95% | Sarà variabile in relazione alla patologia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 575 | L'aumento considerevole del marcatore CEA può essere indice della presenza di neoplasia: | Tutte le altre risposte sono corrette | All'intestino | Al polmone | Alla mammella | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 576 | Il massaggio cardiaco esterno va continuato finché vi è: | ricomparsa del polso carotideo | ricomparsa del ritmo stabilmente sinusale | ricomparsa del respiro spontaneo | esecuzione della defibrillazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 577 | Costituisce un rischio specifico da considerare in caso di fibrillazione atriale, anche se sottoposta a cardioversione. | Si tratta della tromboembolia arteriosa | Si tratta dell'ustione da scarica elettrica | Si tratta dell'arresto cardiaco improvviso | Si tratta dell'extrasistolia notturna | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 578 | La peristalsi non è presente: | nella vena cava | nello stomaco | nell'esofago | nelle tube uterine | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 579 | In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza, è indicato scegliere cateteri: | Vescicali in silicone o in siliconato in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi | Vescicali a tre vie per eseguire lavaggi vescicali in casi di infezioni | Vescicali a tre vie per eseguire esami uro dinamici e colturali in sicurezza | Vescicali in lattice in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 580 | Secondo la classificazione EPUAP/NPUAP in una lesione da decubito al 3° stadio si assiste a degenerazione e necrosi del tessuto: | Cutaneo e sottocutaneo fino alla fascia muscolare | Del tessuto cutaneo | Del tessuto cutaneo, sottocutaneo e di tutta la fascia muscolare | Muscolare e osseo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 581 | Il Barthel Index valuta: | Attività di vita quotidiana | Disturbi comportamentali | Stato cognitivo | Rischio di cadute | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 582 | La scala di Braden per valutare il rischio di lesione da pressione, prende in considerazione: | Il grado di esposizione della pelle all'umidità | La presenza di disturbi psichiatrici maggiori | L'idratazione | Le abitudini urinarie | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 583 | Quale tra queste scale di valutazione del dolore può essere utilizzata per la valutazione del dolore in un bambino di 6 anni? | Face pain scale | Scala analogico visiva | Verbal rating scale | Numeric rating scale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 584 | Il valore di Body Max Index pari a 28, corrisponde a: | sovrappeso | obeso | sottopeso | normopeso | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 585 | Nella posizione di Sims la persona è posta sul fianco: | sinistro semiprona | destro prona | destro semiprona | sinistro prona | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 586 | Il sollevatore è uno strumento: | meccanico che permette il sollevamento del paziente compromesso dal punto di vista motorio | meccanico che permette la rotazione del paziente dal letto alla sedia a rotelle | che facilita la rotazione del paziente che è in grado di stare in piedi ma ha difficoltà a fare piccoli passi | meccanico che permette all'infermiere di eseguire una manovra di spostamento del paziente in breve tempo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 587 | Nel respiro di Cheyne-Stokes: | la frequenza e la profondità respiratoria aumentano gradualmente al di sopra della norma, per poi decrescere fino ad arrivare ad una breve apnea | la frequenza e la profondità respiratoria risultano costantemente aumentati al di sopra della norma | gli atti respiratori sono poco profondi e vengono intervallati da periodi di apnea | la frequenza respiratoria è regolare per profondità ma ridotta per numero di atti al minuto | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 588 | Se un paziente è sonnolento ma risvegliabile ed ha una reazione ritardata agli stimoli, si dice che è: | soporoso | comatoso | vigile | stuporoso | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|--------------------------|
| 589 | Per quale tipologia di pazienti è frequentemente utilizzata la rilevazione della temperatura corporea per via rettale? | Bambino | Anziano | Soggetto in coma | Non esistono controindicazioni a questo tipo di rilevazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 590 | Se si chiede ad un paziente "Chi è l'attuale Presidente della Repubblica", quale tipo di accertamento si sta attuando? | Stato mentale | Dati culturali | Dati sensoriali | Dati generali | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 591 | In caso di ematochezia occorre valutare le caratteristiche organolettiche di: | feci | espettorato | vomito | urina | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 592 | Per quale motivo l'infermiere incoraggia il paziente a riferire la comparsa e la frequenza del vomito? | Per evitare complicanze quali disidratazione e squilibri elettrolitici | Per evitare faringiti | Per evitare congiuntiviti | Per evitare il rischio di caduta e di lesione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 593 | In caso di diaforesi eccessiva l'intervento PRIMARIO tra quelli elencati è: | aumentare l'introito di liquidi | effettuare l'igiene | diminuire l'introduzione di cibi ricchi di fibre | indossare indumenti di cotone | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 594 | Qualora la tosse si accompagni ad espettorato è importante registrare la: | quantità e i cambiamenti delle caratteristiche delle secrezioni | comparsa di rossore al viso e alle estremità degli arti | presenza di incontinenza durante i colpi di tosse | difficoltà di assumere liquidi durante le ore notturne | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 595 | Nel posizionamento del condom urinario l'infermiere deve avere l'accuratezza di: | posizionare senza stringere eccessivamente la fascetta adesiva | stringere la fascetta adesiva per evitare la perdita di urina | utilizzare il dispositivo esclusivamente per le persone con infezioni del tratto urinario | applicare il dispositivo esclusivamente in lattice | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 596 | Indicare con chi si effettua la scelta dei pannoloni adatti per il tipo di incontinenza della persona assistita: | Con la persona stessa, cercando di ridurre l'impatto dell'incontinenza sulla qualità di vita | Con il medico curante responsabile della prescrizione | Con l'OSS per ridurre la quantità dei presidi utilizzabili | Con il familiare cercando la collaborazione del paziente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 597 | Durante l'esecuzione del prelievo venoso la pressione esercitata dal laccio emostatico deve essere: | moderata, pari o poco superiore a quella diastolica del paziente | moderata, pari o poco inferiore a quella sistolica del paziente | tale da non causare dolore eccessivo al paziente, superiore alla pressione sistolica | tale da non provocare fastidio eccessivo al paziente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 598 | Dovete eseguire un prelievo capillare per la determinazione della glicemia su sangue capillare, prima di pungere il polpastrello eseguite un lavaggio delle mani con: | acqua e sapone detergente e indossate i guanti puliti | soluzione idroalcolica e non indossate i guanti | soluzione alcolica e indossate i guanti sterili | acqua e sapone antisettico e indossate i guanti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 599 | L'isolamento protettivo consiste nella separazione da altri assistiti del paziente: | con neutropenia severa | per il periodo di contagiosità della malattia | per malattie infettive respiratorie | con modalità di isolamento a coorte | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 600 | La modalità più efficace per interrompere la catena dell'infezione è: | il lavaggio delle mani | l'utilizzo dei guanti | l'uso di dispositivi di protezione individuale | l'uso dei disinfettanti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 601 | La flora batterica transitoria di solito: | è associata con le infezioni correlate alla pratica assistenziale | è associata ad infezioni delle vie urinarie e dell'apparato respiratorio | non è associata ad infezioni ma ha una funzione di antagonismo microbico | non è associata ad infezione ma sono i batteri acquisiti dall'operatore durante le manovre assistenziali | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 602 | Durante la misurazione della pressione arteriosa, per quale motivo devo sorreggere il braccio del paziente? | Per inibire la contrazione isometrica muscolare | Per favorire la gittata cardiaca ed il volume di eiezione in aorta | Per migliorare il ritorno venoso al cuore | Per aumentare il comfort del paziente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 603 | Durante lo svuotamento del pappagallo del Sig L.S. l'infermiere osserva una variazione del colore delle urine. Tra i seguenti qual è il primo intervento che attua? | Effettua esame delle urine con striscia reagente | Applica un condom | Rileva la saturazione di ossigeno | Posiziona la traversa salvaletto | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 604 | In caso di dolore, si possono riscontrare segni di aumento della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria, dilatazione delle pupille e diaforesi. Questo accade se si tratta di dolore: | acuto | che perdura da diversi giorni | cronico | trattato farmacologicamente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 605 | L'accertamento della signora Laura riporta frequente diuresi e incontinenza quando tossisce. Come indichereste questa condizione? | Incontinenza urinaria da stress | Incontinenza urinaria funzionale | Incontinenza urinaria da urgenza | Incontinenza urinaria riflessa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 606 | La scala di Conley è uno strumento utilizzato per valutare il rischio di caduta del paziente (età >= 65 anni), pertanto è una scala che: | aiuta a scegliere gli interventi preventivi | deve essere compilata dall'operatore socio-sanitario | consiglia gli interventi curativi | consiglia l'approccio diagnostico terapeutico al medico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 607 | Il signor G. di 70 anni è ricoverato in oncologia, è vigile, orientato e autosufficiente nelle attività di vita quotidiana. Presenta un problema di nutrizione inferiore al fabbisogno. Cosa consigliereste al signor G? | Consumare pasti piccoli e frequenti | Utilizzare spezie per migliorare il gusto e l'aroma dei cibi | Favorire l'assunzione di pasti caldi ad alto contenuto calorico | Effettuare spuntini con cracker negli intervalli tra un pasto e l'altro | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 608 | Con il termine fecaloma si intendono feci: | dure, stipate nel retto che non si riescono a espellere | dure, stipate nel retto che vengono espulse con difficoltà | caprine che vengono espulse a seguito di somministrazione di un lassativo | di consistenza dura con presenza di strie di sangue | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 609 | Per raccogliere un campione di urina sterile nell'adulto è bene consigliare di: | eseguire l'igiene intima prima del prelievo e raccogliere l'urina del mitto intermedio | eseguire l'igiene intima dopo ogni minzione e prelevare un campione dal contenitore di raccolta | mescolare le urine nel contenitore delle urine delle 24 ore e prelevare un campione successivamente | urinare nella padella e prelevare un campione in una provetta sterile | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|--|--------------------------|
| 610 | Il signor G., presenta due apparecchi gessati a entrambi gli arti superiori. Dovete procedere con la rilevazione della frequenza cardiaca, quali sedi indagate: | Poplitea | Ulnare | Carotidea | Femorale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 611 | La signora G., portatrice di catetere vescicale, vi chiama per comunicarvi che sente la necessità di urinare. Come procedete? | Controllate la presenza di globo vescicale | Controllate la diuresi delle ultime 24 ore | Controllate che ci sia presenza di urine nella sacca di raccolta | La rassicurate che avendo il catetere vescicale ciò non è possibile, è solo una sensazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 612 | Una lesione da pressione classificata al secondo stadio (NPUAP) è caratterizzata da: | parziale perdita di spessore cutaneo | perdita completa dello strato cutaneo | eritema persistente non sbiancabile | perdita piena di spessore tissutale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 613 | State assistendo il signor R. che è stato sottoposto a intervento chirurgico per la sintesi di frattura del femore conseguente a caduta accidentale. Dovendo eseguire la medicazione della ferita chirurgica con tecnica asettica per la detersione del sito utilizzate: | soluzione fisiologica | soluzione antisettica a base di iodio | soluzione a base di clorexidina | soluzione fisiologica e acqua ossigenata | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 614 | Stai effettuando l'igiene intima-perineale a letto al signor G. Al termine dell'operazione ti assicuri che il prepuzio sia correttamente posizionato sul glande perché non vuoi causare: | edema del glande | imbarazzo della persona | difficoltà nella minzione | orchite | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 615 | Nella valutazione del dolore la scala VAS è rappresentata da una retta con: | due estremità che corrispondono a "nessun dolore" e "massimo dolore possibile" | aree di diverso colore, dove l'intensità del colore corrisponde all'intensità del dolore | una serie di numeri progressivi, da 1 a 10, dove 1 corrisponde a nessun dolore e 10 al massimo dolore | la presenza di aggettivi che quantificano il dolore da "nessuno" a "molto forte" | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 616 | Dovete eseguire un prelievo venoso alla signora Francesca, la quale presenta linfostasi al braccio destro. Francesca è mancina. Quale sede scegliereste per effettuare il prelievo? | Il braccio sinistro | Il braccio destro senza l'utilizzo del laccio emostatico | La mano destra senza l'utilizzo del laccio emostatico | Optate per un prelievo capillare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 617 | La scala di Norton prende in considerazione i fattori di seguito elencati: | Mobilità, deambulazione, incontinenza, livello di autonomia nelle ADL, condizioni mentali | Incontinenza, condizioni psichiche, mobilità, allettamento, integrità cutanea | Condizioni mentali, condizioni fisiche, incontinenza, alimentazione, mobilità | Incontinenza, mobilità, condizioni mentali, allettamento, nutrizione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 618 | Le normali sedi di rilevazione della frequenza cardiaca di un adulto sono: | Temporale, Carotideo, Brachiale, Radiale, Ulnare, Femorale, Tibiale posteriore, Dorsale del piede | Temporale, Carotideo, Brachiale, Radiale. Femorale, posteriore del piede | Temporale, Carotideo, Brachiale, Radiale, Ulnare, Femorale, posteriore del piede | Temporale, Carotideo, Brachiale, Radiale, Femorale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 619 | Per disfagia esofagea si intende: | rallentamento del passaggio del cibo dall'esofago allo stomaco | difficoltà ad iniziare la deglutizione | incapacità di trasferire il cibo dalla cavità orale all'esofago | difficoltà nella digestione e reflusso esofageo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 620 | Con il termine "melena" si intende l'emissione dal retto di feci: | Nere, aspetto picco e maleodoranti | Chiare e maleodoranti | Con striature di sangue rosso vivo | Con intenso sangue rosso vivo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 621 | Le principali complicanze che possono verificarsi durante la nutrizione entrale con sondino naso gastrico sono: | Vomito, diarrea, stipsi e reflusso gastro-esofageo | Vomito, malnutrizione glucidico calorica, diarrea e cacchessia | Stipsi, ileo paralitico, malnutrizione proteica calorica e vomito | Diarrea, malnutrizione proteica calorica, stipsi e disfagia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 622 | Nell'accertamento infermieristico del dolore, l'infermiere può utilizzare le seguenti scale: | VAS, VNS, CHEOPS | GCS, GPCS, AIS | TINETTI, BRASS, BRISTOL | BARTHEL, GOS, KATS | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 623 | La Glasgow Coma Scale (GCS) è una scala basata su tre parametri: | Apertura degli occhi, risposta verbale, risposta motoria | Apertura della bocca, risposta motoria, risposta palpebrale | Apertura degli occhi, risposta motoria, risposta non verbale | Apertura degli occhi, risposta verbale, risposta corneale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 624 | Nell'assistenza al pasto del Sig. Aldo, affetto da disfagia, quale comportamento messo in atto dall'Infermiere NON è da ritenersi corretto? | Conversare con l'assistito e cercare di distrarlo | Incoraggiare i colpi di tosse e la deglutizione della saliva dopo la tosse | Introdurre una quantità di cibo equivalente a un cucchiaino da caffè per volta | Ispezionare il cavo orale regolarmente e se si rileva la presenza di residui alimentari rimuoverli | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 625 | I farmaci stupefacenti in reparto devono essere conservati: | In una cassetta con serratura, in armadi chiusi a chiave | Nell'armadio dei farmaci | Nello studio della caposala | Nello studio medico, in un armadio con etichetta identificativa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 626 | Nell'assistere una persona cui si somministra l'alimentazione tramite PEG, per prevenire la complicanza "aspirazione", l'infermiere misura il ristagno gastrico: | Prima dell'inizio dell'alimentazione, posizionando la persona a 30 - 45 GRADI | Prima dell'inizio dell'alimentazione, posizionando la persona in decubito prono | Al termine dell'alimentazione, posizionando la persona supina | Durante l'alimentazione, posizionando la persona supina ogni 20 minuti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 627 | Nella diarrea severa la dieta deve essere: | Povera di scorie, di cibi grassi e derivati del latte e di bevande nervine | Ipoproteica, ricca di fibre e derivati del latte, ma priva di grassi | Iposodica e ricca di frutta acida e astringente (ad es. succo di limone) | Povera di sodio e magnesio, ricca di legumi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 628 | Nella fase preoperatoria, l'infermiere deve accertarsi, prima della somministrazione di premedicazioni psicoattive, che il modulo di consenso sia firmato. In quali delle circostanze indicate, il consenso informato è necessario? | Tutte le altre risposte sono corrette | Procedure invasive, come un'incisione chirurgica, una biopsia o una paracentesi | Procedure non chirurgiche, come un'arteriografia, che determini un rischio medio per la persona | Procedure che utilizzano radiazioni | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 629 | Quali consigli si forniscono al paziente portatore di fistola artero/venosa per dialisi, al fine di promuoverne il corretto funzionamento? | Sul braccio in cui è stata confezionata la fistola, non si misura la Pressione Arteriosa e non si applicano lacci emostatici | L'accesso può essere utilizzato routinariamente per i prelievi ematici (venosi e arteriosi) e per la rilevazione della pressione arteriosa | Il braccio su cui è allestita la fistola è fasciato stretto per proteggerlo da urti e tagli e può essere utilizzato routinariamente per i prelievi arteriosi | La fistola non richiede particolare protezione. Si può consigliare al paziente di eseguire bagni molto caldi per vasodilatare la fistola | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 630 | Secondo le "raccomandazioni del ministero della salute per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO", di chi deve essere la firma per le prove crociate? | Di chi effettua il prelievo | Del medico richiedente | Del Coordinatore Infermieristico dipartimentale | Del direttore responsabile del servizio | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 631 | Nell'assistere la persona con scompenso cardiaco, nel piano educativo alla dimissione, rispetto alla terapia farmacologica, l'infermiere tratterà i seguenti argomenti: | Gli effetti dei farmaci, la dose e l'orario di somministrazione, l'autogestione, i segni di tossicità, gli effetti collaterali e avversi, cosa fare in caso si dimentichi l'assunzione del farmaco | Come assumere tutti farmaci prescritti in una sola somministrazione giornaliera, l'autogestione della malattia | Come modificare il dosaggio dei farmaci cardioattivi secondo le proprie percezioni | Gli effetti collaterali dei farmaci autosomministrati per via endovenosa, l'autogestione della malattia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 632 | Per valutare il rischio di cadute di un paziente, l'infermiere utilizza la scala: | Tinetti | Indice di Barthel | Measure FIM | CIRS | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 633 | La sostituzione delle linee infusionali (deflussori e raccordi) su Catetere Venoso Periferico e su Catetere Venoso Centrale deve essere effettuata: | ogni 96 ore in caso di infusioni continue non contenenti lipidi, sangue o derivati | ogni 6 ore in caso di infusioni continue contenenti lipidi | a discrezione dell'infermiere che si sta occupando della gestione del catetere vascolare dopo aver sentito il parere medico | ogni ora in caso di infusione di sangue ed emoderivati | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 634 | Le principali complicanze che possono verificarsi durante la nutrizione enterale con sondino naso gastrico sono: | Vomito, diarrea, stipsi, nausea, aspirazione | Vomito, cachessia, reflusso gastro-esofageo | Vomito, diarrea, ileo paralitico, malnutrizione glucidico calorica | Vomito, diarrea, stipsi, malnutrizione proteica calorica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 635 | Le complicanze immediate dell'aspirazione delle secrezioni nasoro-tracheali sono: | Ipossiemia, ipotensione, aritmie | Polmonite, bradicardia, ipotensione | Atelettasia, ipertensione, dolore precordiale | Tracheite, ipertensione, costipazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 636 | Nell'assistenza ad una persona sottoposta a rachicentesi occorre: | consigliare l'assunzione di liquidi per ridurre il rischio di emicrania post-procedurale | consigliare rapidamente la ripresa dell'alimentazione | consigliare di rimanere a letto almeno per 48 ore | consigliare di non assumere liquidi per ridurre il rischio di tenesmo post-procedurale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 637 | Quali sono gli interventi che il paziente con Insufficienza Renale Cronica dovrebbe eseguire al fine di evitare il sovraccarico di liquidi? | Controlli giornalieri del peso, della Pressione Arteriosa (PA), del turgore delle giugulari, restrizione idrica, igiene del cavo orale | Controlli giornaliero del peso, della Pressione venosa., della circonferenza addominale | Controlli settimanali del peso, dell'alvo e della circonferenza addominale | Controlli giornalieri del peso, della P.A., del turgore delle giugulari, iperidratazione, igiene del cavo orale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 638 | La maschera facciale per la somministrazione di ossigeno è controindicata: | nelle persone con grave distress respiratorio e con ritenzione di anidride carbonica | per concentrazioni di ossigeno dal 35% al 45% | nell'ossigeno terapia a breve termine | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 639 | Prima di eseguire un prelievo ematico dal catetere venoso centrale, l'infermiere deve eseguire: | Lavaggio antisettico delle mani in qualsiasi caso | Lavaggio sociale delle mani se Catetere Venoso Centrale tunnellizzato | Frizione delle mani con base alcolica se il paziente è a domicilio | Lavaggio chirurgico delle mani se il paziente è in aplasia midollare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 640 | Per poter valutare se la persona, in prima giornata postoperatoria, può essere mobilizzata precocemente occorre considerare: | il tipo di intervento, le condizioni dell'assistito, il tipo di anestesia | solo la presenza di drenaggi e di terapia antalgica | le preferenze dell'assistito, il colore dei liquidi raccolti nei drenaggi | le condizioni della ferita, la volontà del paziente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 641 | Qualora fosse necessario posizionare il SNG (sondino nasogastrico) e/o il CV (catetere vescicale) per la durata dell'intervento, si procede alla loro applicazione: | in seguito alla somministrazione dell'anestesia | all'inizio del ricovero | dipende dalla tecnica chirurgica utilizzata durante l'intervento e dalla disponibilità di personale in reparto o in sala operatoria | prima della somministrazione dell'anestesia per ottenere il coinvolgimento della persona assistita | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 642 | Per consentire l'identificazione precoce di una reazione trasfusionale: | la trasfusione deve iniziare lentamente (circa 2 ml/min) e il paziente deve essere controllato attentamente i primi 15 min | occorre regolare la velocità d'infusione e monitorare la comparsa di effetti collaterali dopo 60 min | la trasfusione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile (circa 20 min) | la trasfusione deve iniziare ad una velocità di circa 30 ml/min e il paziente deve essere controllato attentamente i primi 15 min | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 643 | E' necessario valutare il deficit cognitivo del signor Antonio. Lo strumento che può essere utilizzato è: | MMSE | NIHSS | CPSS | MNA | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 644 | Nel paziente portatore di ileostomia, l'emissione di feci molto liquide può portare alla formazione di calcoli urinari, disidratazione e deficit di elettroliti. Quali segni e sintomi si potrebbero riscontrare in questo caso? | Dolore intenso all'addome inferiore, ematuria, tachicardia, cute secca | Dolore intenso all'addome superiore, pollachiuria, tachicardia, cute secca, ritenzione urinaria | Dolore diffuso all'addome, cute sudata, poliuria, vertigini | Sudorazione profusa, bradicardia, confusione mentale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 645 | A una persona anziana in trattamento con farmaci diuretici e senza restrizioni dietetiche, sono consigliabili alimenti: | Ricchi di potassio | Poveri di potassio | Poveri di carboidrati | Poveri di proteine | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|--------------------------|
| 646 | Quali tra quelli segnalati, sono segni e sintomi di tamponamento cardiaco che l'infermiere deve saper riconoscere? | Aumento PVC, distensione vene giugulari, caduta PA, tachipnea e polso paradossale, oliguria | Diminuzione PVC, aumento PA, tachipnea, tachicardia, diaforesi, oliguria | Tosse, aumento PA, bradipnea e polso paradossale, poliuria | Diminuzione della pressione venosa centrale (PVC), caduta della pressione arteriosa (PA), bradipnea, diaforesi e polso paradossale, anuria | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 647 | Durante il trattamento radioterapico quali sono i disturbi che insorgono generalmente nei pazienti indipendentemente dal distretto trattato? | Affaticamento e perdita dell'appetito | Nausea e vomito biliare | Mucositi | Disgeusia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 648 | Nell'aspirazione delle secrezioni naso-oro tracheale la pre-ossigenazione va effettuata: | Nei pazienti con documentata desaturazione | Nei pazienti in cui lo stimolo del respiro dipende dall'ipossia (BPCO) | Nei pazienti che assumono broncodilatatori e cardiocinetici | Sempre | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 649 | In una persona sottoposta a domicilio ad ossigeno terapia a lungo termine, quali interventi infermieristici specifici occorre pianificare? | Educare la persona alla cura dell'igiene orale e ad un adeguato apporto di acqua | Educare la persona alla cura dell'igiene personale e ad un adeguato apporto di vitamine | Educare la persona ad assumere molto sale alimentare per evitare la disidratazione | Educare la persona a sostituire i presidi almeno due volte al giorno | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 650 | Un paziente con un'emorragia postoperatoria in atto manifesta dei segni e dei sintomi di ipovolemia. Quali tra i seguenti segni e sintomi l'infermiere deve ricercare? | Tachipnea, tachicardia, ipotensione e oliguria | Polso tachicardico, cute secca, viso arrossato e tachipnea | Ipotensione posturale, occhi infossati, debolezza e viso arrossato | Confusione mentale, secchezza delle fauci, insonnia e irritabilità | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 651 | Gli interventi più importanti di riduzione di stasi venosa agli arti inferiori e/o per l'incremento del ritorno venoso sono: (indicare la risposta ERRATA) | Posizionamento con le gambe giù dal letto | Compressione graduata pneumatica intermittente o con apparecchi ad impulsi per i piedi | Posizionamento di calze elastiche lunghe a compressione graduata | Esecuzione di esercizi agli arti inferiori e deambulazione precoce | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 652 | Nel prelievo per emocoltura, con sistema chiuso Vacutainer, occorre riempire: | Prima il flacone per aerobi e poi quello per anaerobi | Per primo il flacone per cui è stata effettuata la richiesta dell'esame | E' indifferente quale flacone riempire per primo, l'importante è segnalarlo | Prima il flacone per anaerobi e poi quello per aerobi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 653 | In previsione dell'intervento chirurgico gli elementi del consenso informato sono rappresentati da: | Informazione, comprensione, volontarietà | Consenso del medico curante, accettazione dell'anestesia, consenso agli esami del pre - ricovero e consenso alla preparazione del sito chirurgico | Presenza visione dei presidi, comprensione del tipo di anestesia, competenza e consenso alla tricotomia | Scelta del ricovero e consenso del parente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 654 | Devi recarti da un paziente posto in isolamento per Tubercolosi per rilevare la pressione arteriosa. Prima della procedura: | Esegui il lavaggio sociale delle mani o la frizione delle mani a base alcolica | Non è necessario lavarsi le mani in quanto è una procedura non invasiva | Esegui il lavaggio chirurgico delle mani | Per evitare il rischio di contagio, la rilevazione della Pressione Arteriosa sarà esclusivamente elettronica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 655 | Nella gestione del drenaggio pleurico, l'infermiere deve: | assicurarsi che i tubi siano pervi, controllare il materiale drenato, mantenere il sistema al di sotto del torace della persona | assicurarsi che il sistema sia aperto durante le manovre di riabilitazione respiratoria e sospendere l'aspirazione centralizzata | assicurarsi che tutto il sistema sia collegato all'aspirazione centralizzata, mantenere il sistema al di sopra del torace della persona | assicurarsi che tutti i tubi siano pervi, chiudere il drenaggio toracico e mantenerlo al di sopra del torace della persona | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 656 | Quale tra le seguenti è da ritenere un'indicazione al confezionamento di una PEG? | Necessità di nutrizione enterale superiore alle quattro (4) settimane | Necessità di nutrizione enterale forzata superiore a cinque (5) giorni | Necessità di correggere squilibri idro-elettrolitici | Necessità di una dieta ipercalorica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 657 | Per prevenire sintomatologia gastro-intestinale in un paziente con nutrizione enterale si deve: | Somministrare la formula a temperatura ambiente | Somministrare la formula a una temperatura compresa tra i -4° e -8°C | Aumentare la frequenza dei lavaggi del sondino | Aumentare il volume di infusione formula | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 658 | Il breakthrough pain o dolore episodico, in letteratura viene descritto con tre sottotipi (identificare la risposta sbagliata): | Dolore acuto | Dolore incidentale correlato a fattori precipitanti | Dolore spontaneo | Dolore di fine dose | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 659 | Nello strumento per la misurazione del dolore Pain Assessment in Advanced Dementia Scale (PAINAD), di quale comportamento non viene richiesta la valutazione: | Cambiamenti nelle attività usuali | Espressioni facciali | Livello di consolazione del paziente | Respirazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 660 | Non tutti i farmaci per os (= bocca) possono essere frantumati o divisi. Quali tra le seguenti compresse possono essere frantumate o divise: | Compresse con linea di pre-rottura | Compresse enteriche o formulazioni retard | Compresse a rilascio temporizzato | Compresse gastroresistenti e/o solubili solo in ambiente alcalino intestinale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 661 | Tra le seguenti sedi per l'iniezione intramuscolare quale permette di iniettare un quantitativo massimo di solo 1-2 ml: | Delfoidea | Dorsoglutea | Vastolaterale | Ventroglutea | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 662 | Quale tra le seguenti NON è una strategia per la prevenzione delle infezioni del tratto urinario associate a catetere (CA-UTI): | Clampare il catetere prima della rimozione ed eseguire la ginnastica vescicale | Evitare l'esecuzione di irrigazioni vescicali | Evitare movimenti o trazioni uretrali tramite fissaggio del catetere alla coscia del paziente | Mantenere il sistema di drenaggio a circuito chiuso e non scollegare mai il catetere dal sistema di drenaggio | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 663 | Ad un paziente con urostomia, quale tra le seguenti indicazioni dietetiche è consigliabile: | Bere almeno 2 litri di acqua al giorno | Evitare di assumere frutta e verdura | Assumere cibi ricchi di spezie e sale | Assumere cibi che contengono poca fibra, ma molti legumi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 664 | Rispetto a quale tipo di stomia le feci appaiono più formate e le defecazioni sono più regolari: | Sigmoidostomia | Ciecostomia | Ileostomia | Trasversostomia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 665 | Al fine di prevenire le infezioni del sito chirurgico il drenaggio deve: | Rimanere chiuso e unidirezionale | Essere dotato di un sistema aspirante | Creare una pressione positiva che assicura la raccolta del drenato senza che si contaminino | Rimanere aperto e rimosso più tardi possibile | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|--------------------------|
| 666 | La sede principale di trasformazione dei farmaci è il: | fegato | cuore | polmone | rene | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 667 | L'uso di ossigenoterapia iperbarica è indispensabile: | nelle embolie gassose | nell' infarto del miocardio | nella polmonite | nell'asma | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 668 | Il massaggio cardiaco esterno si effettua: | sulla metà inferiore dello sterno | sulla metà superiore dello sterno | a livello dell'emitorace sinistro | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 669 | Quale organo viene maggiormente colpito dopo l'impiego di emocomponenti? | Polmone | Reni | Cervello | Fegato | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 670 | Nella misurazione della temperatura timpanica, qual'è la variabile che non può modificare l'attendibilità del risultato? | Ambiente esterno molto freddo | Presenza di cerume | Nessuna delle variabili presenti nelle altre opzioni di risposta modifica il risultato della misurazione della temperatura timpanica | Ambiente esterno molto caldo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 671 | Il glucagone iniettabile deve essere somministrato nei pazienti con: | Ipoglicemia grave, in stato di incoscienza | Ipoglicemia superiore a 200 mg/dl, in stato di incoscienza | Diabete tipo 1, con glicemia inferiore a 80 mg/dl | Ipoglicemia superiore a 300 mg/dl, indipendentemente dallo stato di coscienza | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 672 | In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlate ad una aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario: | Insegnare esercizi di respirazione profonda e tosse efficace | Somministrare per via endovenosa farmaci antibiotici ad ampio spettro | Ridurre al minimo il tasso di umidità ambientale | Far assumere un litro di acqua al giorno | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 673 | La produttività può essere definita come: | Il risultato sia della razionalizzazione e dell'automazione del lavoro, che della scelta di un'organizzazione operativo-funzionale, di buona distribuzione di responsabilità e di opportune articolazioni di controllo | Il risultato di una maggior produzione in presenza di modifiche dei contratti collettivi di lavoro con prolungamento degli orari lavorativi | Il rapporto fra il costo annuo di funzionamento di una struttura e la qualità del servizio che produce | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 674 | Il pioglitazone: | È un insulino-sensibilizzante per pazienti diabetici tipo2 | Nessuna delle altre risposte è corretta | Non può essere associato a metformina e sulfaniluree | Non è somministrabile per via orale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 675 | La medicazione idrocolloidale: | Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione può facilitarne la crescita | Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata | Nessuna delle altre risposte è corretta | Aderisce alla superficie della ferita | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 676 | È nota come morbo della mucca pazza: | Bse | Streptococcus suis | Trichinellosi | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 677 | La Tachicardia sopraventricolare: | Non è immediatamente pericolosa per la vita, ma può influire sulla qualità di vita e dovrebbe essere valutata | Sono battiti cardiaci aggiuntivi occasionali, che possono originare dagli atri e a volte anche dai ventricoli | Nessuna delle altre risposte è corretta | È una situazione di emergenza perché porta nel breve a un arresto cardiovascolare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 678 | Le Extrasistoli: | Sono battiti cardiaci aggiuntivi occasionali, che possono originare dagli atri e a volte anche dai ventricoli | Si manifestano con un ritmo cardiaco rallentato | Si manifestano con un ritmo cardiaco rapido che spesso si manifesta sotto forma di crisi, con palpitazioni o battiti molto accelerati | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 679 | Quale di queste affermazioni sul glicogeno è falsa? | Non può essere somministrato per via parenterale | È somministrata nelle crisi ipoglicemiche | Nessuna delle altre risposte è corretta | È sintetizzato tramite la tecnica del DNA ricombinante | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 680 | In caso di rimozione accidentale della PEG (gastrostomia percutanea endoscopica) l'infermiere deve: | Mantenere pervio lo stoma applicando una sonda tipo Foley del calibro più simile a quello della sonda PEG e avvisare il medico di riferimento | Applicare una medicazione a piatto e inviare immediatamente l'assistito in pronto soccorso | Reinserire la stessa sonda entro 5/6 ore avendo cura di gonfiare bene il palloncino di ancoraggio | Applicare una medicazione a piatto e inviare l'assistito al servizio di endoscopia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 681 | La principale fra le iniziali manifestazioni della sindrome nefrosica è: | La proteinuria massiva | L'incremento dell'azoto ureico | L'ematuria microscopica o macroscopica | L'ipertensione arteriosa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 682 | In presenza di nitriti nelle urine, è opportuno eseguire: | Urinocoltura | Esame citologico delle urine | Raccolta delle urine delle 24 ore | Campione di urine standard | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 683 | Quale tra i seguenti segni e sintomi non è tipico delle infezioni delle vie urinarie superiori? | Cefalea | Stranguria | Pollachiuria | Febbre | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 684 | Per assistiti sottoposti a clistere evacuativo che non tollerano elevati volumi di liquidi, è opportuno utilizzare: | Soluzione ipertonica | Acqua di rubinetto | Soluzione fisiologica | Soluzione carminativa | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|--------------------------|
| 685 | Riguardo l'assistenza nella cura di sé di una persona che presenta ulcere degli arti inferiori, indicare la corretta sequenza di vero (V) e falso (F) per le seguenti affermazioni: - Valutare e registrare le caratteristiche dell'ulcera prima degli interventi assistenziali - L'irrigazione dell'ulcera, quando necessaria, può essere effettuata con acqua di rubinetto - L'asepsi non è necessaria - Le ulcere possono essere arteriose, diabetiche, reumatoidi o maligne. | V,V,V,V | V, F, V,V | V, F,F,V | F,F,F,F | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 686 | Quali indicatori prende in esame la scala di Braden per la valutazione del rischio di ulcere da pressione? | Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento | Percezione sensoriale, esposizione all'umidità, grado di attività fisica, assunzione usuale di cibo | Corporatura, aspetto della cute, sesso ed età, continenza, mobilità, tipo di nutrizione, particolari elementi di rischio | Condizioni fisiche, stato mentale, deambulazione, mobilitazione, incontinenza | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 687 | In caso di caduta accidentale di un anziano, l'infermiere: | Valuta lo stato di coscienza ed effettua una valutazione testa piedi | Alza l'anziano e chiede come si sente per accertarsi delle sue condizioni | Mette l'anziano in posizione laterale di sicurezza | Allerta sempre la rete dell'emergenza urgenza | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 688 | Quanti ml di farmaco si possono somministrare al massimo con una iniezione intradermica? | 2,5 ml | 0,5 ml | 3 ml | 1 ml | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 689 | L'alimentazione in un paziente disabile: | È correlata ai fabbisogni nutrizionali dell'ospite | Necessità sempre del coinvolgimento dell'ospite nella preparazione | Necessità di tempi stabiliti e precisi | Necessità di attenzioni come nella primissima infanzia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 690 | Quale tra le seguenti è un'alterazione della minzione? | Disuria | Oliguria | Poliuria | Anuria | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 691 | Nelle manovre di primo soccorso, qual è la sequenza della valutazione del soggetto incosciente? | Coscienza - vie aeree - respirazione - circolazione | Circolazione - coscienza- respiro - traumi del rachide | Vie aeree - respirazione - circolazione- coscienza | Coscienza- circolazione - vie aeree - respirazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 692 | L'ematemesi è: | Emissione di sangue attraverso la bocca proveniente dalle vie digerenti | Emissione di sangue attraverso la bocca proveniente dalla trachea | Emissione dalla bocca di vomito fecaloide | Emissione di espettorato denso attraverso la bocca proveniente dalle vie respiratorie | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 693 | La contenzione fisica: | E' un trattamento terapeutico a cui ricorrere in ultima istanza | E' un trattamento riabilitativo che limita le scelte decisionali dell'assistito | Tutte le alternative sono corrette | E' un trattamento preventivo, che mira a limitare i danni potenzialmente arrecabili ad altri da parte dell'assistito | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 694 | Il bilancio idrico si fa: | Per calcolare la quantità dei liquidi introdotti ed espulsi nelle 24 ore | Per calcolare la quantità di liquidi introdotti per via orale e parenterale | Esclusivamente per valutare la diuresi | Per valutare lo stato di idratazione del paziente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 695 | I seguenti sono tutti fattori di rischio connessi alla disidratazione, tranne uno: quale? | Ipercolesterolemia | Iperpiressia | Ridotta mobilità e ridotta abilità funzionale | Deterioramento cognitivo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 696 | Le parestesie sono: | Sensazioni abnormi in assenza di stimolazione periferica generalmente sotto forma di formicolio o di punture | Un sintomo caratterizzato da assenza della contrazione riflessa | Contrazioni rapide di un gruppo di fibre muscolari, causati dall'attività spontanea di una o diverse unità motorie conseguenti a danni di vario tipo del motoneurone spinale | Un sintomo che esprime la difficoltà al rilassamento muscolare dopo la contrazione volontaria | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 697 | Avendo a disposizione compresse da 0,25 mg, quante ne devono essere somministrate per ottenere un dosaggio da 0,125 mg? | Mezza | Una e mezza | 3/4 | Una | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 698 | Con il termine ittero si intende l'aumento della concentrazione di: | Bilirubina nel sangue al quale consegue un caratteristico sintomo osservabile che è la colorazione giallastra delle sclere e/o dell'intera superficie cutanea | Urea nel sangue al quale consegue un caratteristico sintomo osservabile che è il prurito | Ammonio nel sangue al quale consegue un caratteristico stato di agitazione psicomotoria | Colesterolo nel sangue al quale caratteristico sintomo osservabile che è la colorazione giallastra delle sclere e/o dell'intera superficie cutanea | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 699 | Nell'ipertensione ortostatica si osserva la riduzione della pressione sistolica, rispetto alla pressione in posizione supina o seduta, di almeno: | 30 mmHg | 10 mmHg | 20 mmHg | 40 mmHg | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 700 | Indicare quale tra le seguenti non è una corretta azione da compiere, in caso di procedura di massaggio cardiaco esterno con un solo soccorritore. | Posizionare il paziente supino su di una superficie morbida | Nessuna delle altre risposte è corretta | Se l'individuo non risponde, seguire i protocolli per la gestione delle emergenze previsti dalla struttura. Se è presente una persona, mandarla a chiedere aiuto | Assicurare un'adeguata ventilazione | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--|--------------------------|
| 701 | Quale tra le seguenti non rappresenta una possibile complicanza iniziale di una frattura? | Necrosi vascolare dell'osso | Sindrome compartimentale | Embolia grassosa | CID | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 702 | Le seguenti sono tutte attenzioni che l'infermiere deve rivolgere all'assistito con disfagia, tranne una: quale? | Posizionamento del collare cervicale durante l'aiuto all'assunzione dei pasti | Effettuare l'igiene del cavo orale | Dopo il pasto, mantenere l'assistito in ortostatismo per 30-60 minuti | Somministrare la terapia farmacologica in corrispondenza dei pasti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 703 | Quali tra i seguenti è un sintomo dell'infiammazione: | Tutti quanti | Calore | Dolore | Rossore | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 704 | La scala di Braden: | È uno strumento di valutazione del rischio lesioni da pressione | È uno strumento di valutazione della prognosi in pazienti gravemente debilitati | È uno strumento di valutazione del rischio cadute nell'anziano | È uno strumento di valutazione del rischio di cadute | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 705 | Con riferimento alle lesioni cutanee secondarie, la crosta: | È la conseguenza di una lesione cutanea e del suo processo di riparazione, per il quale non andrebbe tolta troppo velocemente | È una zona della pelle che si assottiglia e in cui si ha perdita di elasticità e di colore | Nessuna delle altre risposte è corretta | È il risultato di un ammassamento di cellule morte che si sfaldano e che spesso lasciano sotto di sé uno strato eritematoso irritato tipico della psoriasi o della forfora | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 706 | Qual è la manifestazione più immediata di un effetto tossico sulla gonade femminile? | Alterazioni del ciclo mestruale | Nessuna delle altre risposte è corretta | Mancata ovulazione | Perdite vaginali | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 707 | L'articolazione dell'anca è: | Un'entrosi | Una condiloartrosi | Un'articolazione a sella | Una diartrosi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 708 | L'aumento di intensità del colore delle urine (urine ipercromiche) è provocato da: | Presenza di pigmenti biliari | Presenza di sangue | Disfunzionalità cardiocircolatorie | Elevata presenza di batteri | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 709 | Quali fra i seguenti segni/sintomi non è osservabile in una persona depressa: | Logorrea | Aumento dell'affaticabilità | Alterazione del ritmo sonno/veglia | Ideazione rallentata e difficoltà nella concentrazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 710 | L'approccio tecnico di terapia del dolore, può essere applicato nelle case residenza: | Solo se è aperto un percorso di fine vita | Solo per i pazienti terminali | Solo se vi è il consenso dei familiari | Per alleviare il dolore fisico e psichico dei pazienti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 711 | Riguardo l'assistenza nell'igiene perineale di un uomo, quale tra le seguenti affermazioni non è corretta? | Procedere a partire dalla base del pene con movimento circolare dalla periferia al centro fino al meato urinario | Scoprire delicatamente il prepuzio prima di effettuare la pulizia del glande | Al termine dell'igiene, il prepuzio deve essere riportato sul glande | Pulire lo scroto e il perineo per ultimi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 712 | La contenzione è uno strumento che: | Si può applicare previo prescrizione medica, salvo urgenze e dandone comunicazione tempestivamente al medico | Si può applicare solo previo prescrizione medica | Si può sempre applicare ai pazienti che ne abbiano necessità | È una estrema ratio che gli operatori socio sanitari possono sempre usare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 713 | Il test di Allen serve a: | Valutare la presenza del circolo arterioso collaterale | Valutare la presenza del circolo venoso collaterale | Nessuna delle altre risposte è corretta | Valutare la presenza del circolo artero venoso collaterale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 714 | Completare la seguente frase con l'opzione corretta: " Si definisce _____ l'arrossamento della pelle determinato dall'aumentato apporto di sangue ai vasi sanguigni del derma superficiale. " | Iperemia | Abrasioni | Eczema | Erisipela | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 715 | "Lesione a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma e i tessuti sottocutanei": questa è la definizione di una lesione da pressione di stadio: | III | IV | II | I | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 716 | Una persona asintomatica affetta da covid 19 può trasmettere l'infezione? | Sì, le persone infette possono trasmettere il virus sia quando sono sintomatiche sia quando sono asintomatiche con lo stesso livello di trasmissibilità | Sì, ma solo dopo 72/96 ore dal contagio | Sì, ma solo se affetta anche da immunodepressione | Sì, ma solo se ha sviluppato immunoglobuline di tipo G | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 717 | In caso di vene varicose agli arti inferiori, non è indicato: | permanere troppo a lungo in posizione sdraiata | posizionarsi con gli arti inferiori sollevati | evitare di mantenere per lungo tempo la posizione eretta | usare le calze elastiche | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 718 | Nella gestione di un paziente che presenta disturbi d'ansia le strategie assistenziali di tipo relazionale più adeguate sono: | Stare vicino al paziente, favorire il contatto anche fisico, confortarlo e mostrarsi disponibili all'ascolto | Fare compagnia individuale | Assecondare ogni richiesta espressa dall'anziano | Proporre attività occupazionali | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 719 | La somministrazione di un anestetico locale in forma di carbonato anziché cloridrato: | Migliora la durata d'azione anestetica | Causa tossicità sistemica | Peggiora la durata d'azione anestetica | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 720 | Per il trattamento della stipsi l'uso dei lassativi favorenti la massa deve: | Essere supportato da un adeguato apporto di liquidi | Essere effettuato solo dopo la riduzione o sospensione della terapia sedativa | Tutte le alternative sono corrette | Essere supportato da una dieta ricca di proteine | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|--------------------------|
| 721 | Devi somministrare 15 milliequivalenti di Calcio gluconato hai a disposizione fiale da 10 ml contenenti 10 milliequivalenti. Quante fiale di farmaco devi aspirare? | Una e mezzo | Due | Una | Mezza | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 722 | In quale dei seguenti eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione laterale di sicurezza: | Perdita di coscienza atraumatica | Infarto miocardico acuto | Paziente gravemente ipoteso | Frattura della colonna | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 723 | In caso di sindrome compartimentale, il tempo di reflusso capillare è superiore a: | 3 secondi | 7 secondi | 1 secondo | 5 secondi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 724 | Lo stato funzionale, valutato secondo le ADL, descrive la capacità di alimentarsi in modo autonomo. Quale tra le seguenti azioni è inclusa? | Porta il cibo dal piatto alla bocca | Taglia la carne | Organizza, prepara e serve i pasti in modo adeguato e senza aiuto | Scalda e serve pasti preparati | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 725 | Il sonno non REM è suddiviso in: | 4 stadi | 2 stadi | 3 stadi | 5 stadi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 726 | Il Barthel index è: | Uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di base della vita quotidiana di una persona e quindi la sua autosufficienza | Uno strumento per valutare la performance dell'operatore nell'assistere la persona nelle attività quotidiane | Uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell'anziano | Un indice per determinare il rischio di disabilità in seguito ad ictus cerebrale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 727 | Indicare quale, tra le seguenti, è una possibile complicanza del Morbo di Parkinson: | Stipsi | Steatorrea | Diarrea | Melena | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 728 | In ambito infermieristico, la contenzione è uno strumento che: | Si può applicare previo prescrizione medica, salvo urgenze | Si può applicare solo previo prescrizione medica | Si può sempre applicare ai pazienti che ne abbiano necessità | È una estrema ratio che gli operatori socio sanitari possono sempre usare | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 729 | Qual è la sede di elezione per l'iniezione intramuscolare? | Vasto laterale | Deltoidea | Dorsoglutea | Ventroglutea | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 730 | Le lesioni cutanee secondarie sono quelle che non compaiono inizialmente, ma derivano da modificazioni delle lesioni primarie. Ne costituisce esemplificazione: | Erosione | Papula | Placca | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 731 | In quale fase febbrile il paziente presenta diaforesi? | Defervescenza | Insorgenza | In tutte le fasi | In nessuna delle fasi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 732 | Quale dei seguenti comportamenti non deve attuare un paziente sottoposto ad intervento di protesi totale d'anca: | Addurre la gamba | Mantenere le ginocchia separate | Posizionare un cuscino tra le gambe durante il sonno | Non flettere l'anca con angolazione maggiore di 90 gradi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 733 | I pazienti a rischio di alterazione della funzione cognitiva dovrebbero essere: | Incoraggiati a muoversi | Incoraggiati al riposo e alla riflessione | Sovrastimolati | Esclusi dal contatto con altre persone | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 734 | La disinfezione come fase della medicazione delle lesioni da pressione: | Deve essere limitata ai casi di infezione o contaminazione critica | Ha un effetto completo se eseguita prima e dopo la detersione | Deve essere sempre adottata | Ha un effetto completo se le soluzioni utilizzate non vengono rimosse dopo l'applicazione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 735 | E' più corretto detergere la stomia con: | Acqua potabile | Soluzioni isotoniche | Nessuna delle altre risposte è corretta | Soluzione fisiologica sterile | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 736 | La nutrizione parenterale una volta preparata: | Deve essere somministrata subito | Deve essere somministrata entro 12 ore | Deve essere somministrata entro 24 ore appena tolta dal frigorifero | Deve essere somministrata entro 24 ore e deve essere conservata in frigorifero | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 737 | In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l'emogluco-test è indicato: | Eliminare la prima goccia di sangue ed utilizzare la seconda per l'analisi | Utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi | Pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito | Pungere dopo aver accuratamente disinfettato con iodopovidone la zona da pungero | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 738 | Che cosa indica esattamente il termine bradicinesia? | Lentezza di movimento | Assenza di movimento | Nessuna delle altre risposte è corretta | Incapacità di programmazione motoria | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 739 | Lo shock ipovolemico si accompagna: | A diminuzione della pressione arteriosa | Nessuna delle altre risposte è corretta | A dolore precordiale | Ad aumento della pressione arteriosa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 740 | In un malato che presenta dispnea occorre: | Posizionare in decubito semiortopnoico, tranquillizzarlo ed applicare ossigenoterapia 2L/min | Metterlo a riposo supino ed applicare ossigenoterapia con maschera di venturi | Tranquillizzare il malato e provvedere subito per l'Emogasanalisi (prelievo arterioso) | Valutare il tipo di dispnea e invitarlo a restare sdraiato per non affaticarsi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 741 | Come ti aspetti di trovare la frequenza cardiaca, in caso di repentino abbassamento pressorio? | Aumentata rispetto alla norma | Diminuita rispetto alla norma | Nei range di normalità | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 742 | Se somministri un farmaco tramite peg è necessario: | Lavare il sondino prima e dopo la somministrazione con acqua | Mettere il farmaco all'interno della sacca d'alimentazione | Valutare prima il ristagno | Sospendere l'infusione almeno 15 minuti prima della somministrazione della terapia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 743 | Tra le raccomandazioni generali nella gestione del catetere vescicale è importante: | Non sraccordare mai il circuito | Effettuare frequenti lavaggi del sistema attraverso l'uso di una siringa cono catetere (schizzettone) | Posizionare il catetere sempre più in alto della vescica | Effettuare frequenti indagini diagnostiche su campioni di urina prelevati dalla borsina di raccolta | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|--------------------------|
| 744 | Devo somministrare Levodopa 62,5 mg ad un paziente. Ho a disposizione compresse divisibili da 250 mg. Quanto ne dovrò somministrare al paziente? | 1/4 compressa | 2 + 1/2 compressa | 1/2 compressa | 1 compressa | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 745 | Il peridon: | Causa iperprolattinemia | Non causa iperprolattinemia | Non causa ginecomastia | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 746 | Quale tra i seguenti interventi per la dispersione del calore utilizza la conduzione: | Applicare ghiaccio in corrispondenza dei grandi vasi arteriosi | Aerare la stanza | Eseguire spugnature al paziente | Scoprire il paziente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 747 | La prevenzione di lesione da pressione si svolge con: | Movimentazione frequente dell'ospite | Uscite all'aria aperta | Frequenti bagni caldi | Dieta iperproteica | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 748 | Per disartria si intende: | Un disturbo del linguaggio di tipo motorio: consiste nella difficoltà ad effettuare movimenti necessari per l' articolazione della parola | L'incapacità di compiere gesti coordinati e diretti ad un determinato fine sebbene siano mantenute inalterate la volontà del soggetto e le sue capacità motorie | Un disturbo della deambulazione: il soggetto compie movimenti lenti ed imprecisi | L' incapacità di costruire frasi di senso compiuto | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 749 | Se noti feci miste a grassi si tratta di: | Feci steatorriche | Feci colliquate | Melena | Feci ematiche | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 750 | Un paziente ti chiama perché avverte un forte stimolo ad evacuare ma non riesce ad espellere nulla. Che fai? | Verifico se presenta addome teso e globoso, effettuo esplorazione rettale per verificare la presenza di feci molli in ampolla e se presenti effettuo un clistere evacuante | Verifico se presenta addome teso e globoso, controllo da quanto tempo non evacua, gli suggerisco di sforzarsi a spingere e se non riesce comunque ad evacuare effettuo clistere evacuante a grande volume | Lo accompagno in bagno e lo lascio sul water incitandolo a provare a spingere | Gli somministro lassativo per bocca | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 751 | Quale tra i seguenti dati è indicativo di sindrome da immobilizzazione: | Edemi | Poliuria | Ipertermia | Iperensione | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 752 | Se un paziente portatore di catetere vescicale presenta 300 ml di diuresi / 24 ore di quale alterazione si tratta? | Oliguria | Disuria | Anuria | Pollachiuria | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 753 | Quando nell'espettorato trovi piccole quantità di sangue sei di fronte a: | Emoftoe | Espettorato mucopurulento | Emottisi | Espettorato sieroso | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 754 | A cosa serve rilevare la saturazione? | Riconoscere precocemente l'ipossia rispetto alla condizione di cianosi | Tutte le alternative sono corrette | Valutare il tipo di dispnea che presenta il paziente | Riconoscere un'insufficienza cardiaca grave | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 755 | Un paziente in trattamento con anticoagulante orale presenta un tp con INR di 6,2, cosa fai? | Avviso immediatamente il medico in quanto il paziente è ad alto rischio di emorragia | Nulla in quanto il valore è nei range di normalità | Avviso immediatamente il medico in quanto il paziente è ad alto rischio di tvp | Favorisco la somministrazione di alimenti ricchi di ferro | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 756 | Quali sono le sedi di rilevazione del polso che sceglieresti in caso di grave ipotensione? | Carotideo | Radiale e carotideo | Nessuna delle altre risposte è corretta | Radiale, temporale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 757 | Un paziente presenta un arto inferiore freddo e pallido, tenti di rilevare il polso pedidio, ma è assente: cosa potrebbe essere successo? | Ostruzione acuta del flusso arterioso | Probabile frattura del terzo metatarso | Ostruzione acuta del flusso venoso | Nevrite acuta del nervo sciatico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 758 | La rifampicina: | È un antibiotico battericida | Non è assorbita nell'intestino | Nessuna delle altre risposte è corretta | Non è usato per la tubercolosi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 759 | Quali tra questi non è un effetto del progesterone? | Riduzione della risposta insulinica al glucosio | Modifiche a livello della mucosa endometriale | Inibizione dell'attività contrattile dell'utero | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 760 | Indicare la corretta sequenza di azioni da compiere per la somministrazione della nutrizione enterale (NE): 1. raccordare il set al SNG 2. impostare la velocità di infusione nel sistema scelto 3. controllare la scadenza del prodotto e agitare il flacone 4. effettuare il lavaggio del SNG al termine dell'infusione con 30-50 cc di acqua 5. applicare il set alla pompa 6. raccordare il set infusione al flacone, evitando di trasferire i prodotti in altri flaconi | 3,6,5,1,2,4 | 2,6,3,5,4,2 | 1,4,3,2,6,5 | 3,5,4,1,2,6 | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 761 | Matteo, 13 mesi, è ricoverato per diarrea acuta, vomito e febbre, calo ponderale 10%. Si diagnostica una gastroenterite da Rotavirus. Il candidato indichi quali dei seguenti dati rileva con priorità. | Peso, turgore della cute, dolore addominale, diuresi | Nessuna delle altre risposte è corretta | Ultimo pasto assunto | Altri famigliari con episodi recenti di febbre | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|--------------------------|
| 762 | I sali di litio: | Sono usati nel disturbo bipolare | Sono usati nella disfunzione erettile | Sono usati come antivirali | Sono usati per la pulizia degli strumenti impiegati per la preparazione dei pasti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 763 | Quale di questi è più utile nella diagnosi di iper o ipotiroidismo? | Dosaggio diretto del TSH | Dosaggio del TRH | Dosaggio dell'ACTH | Dosaggio differenziato | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 764 | La scopolamina è: | Un farmaco ad attività neurotrofa con azione anti-vertigine | Un farmaco che aumenta l'attività sintetica dei neuroni dei nuclei vestibolari | Nessuna delle altre risposte è corretta | Un farmaco ad azione vasotropa con azione anti-vertigine | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 765 | Il mifepristone è: | Un antagonista del progesterone | Un eccitante della crescita | Un agonista del progesterone | Un beta bloccante | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 766 | Un soggetto viene accompagnato al Pronto Soccorso a seguito di un incidente. L'esame neurologico è: apertura degli occhi agli stimoli verbali, risposta verbale confusa, risposta motoria localizza gli stimoli dolorosi. Secondo la scala di Glasgow (GCS) lo score è: | Punti 12; risposta oculare (punti 3), risposta verbale (punti 4), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 5) | Punti 11; risposta oculare (punti 4), risposta verbale (punti 4), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 3) | Nessuna delle altre risposte è corretta | Punti 15; risposta oculare (punti 5), risposta verbale (punti 5), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 5) | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 767 | In area critica TAH significa: | Heart | Hedge | High | Hedge | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 768 | Quale azione non deve essere compiuta durante la procedura di "applicazione di una trazione trans-scheletrica"? | Non posizionare il paziente in allineamento | Fornire assistenza ai punti di inserzione dei fili trans-scheletrici. Fornire assistenza ai punti di inserzione dei fili trans-scheletrici | Garantire la privacy del paziente | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 769 | Il termine diuresi indica: | Urina prodotta in un determinato periodo di tempo | Minzione difficoltosa | Nessuna delle altre risposte è corretta | Presidio utilizzato per rimuovere (fare uscire) liquidi | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 770 | Quale sistema si attiva iniziando un'attività motoria dispendiosa correlata alla necessità di ridurre il coinvolgimento dell'apparato digerente? | Sistema Simpatico | Sistema Differenziale Nervoso | Sistema Parasimpatico | Sistema Nervoso Somatico | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 771 | Il test della coagulasi è utilizzato per la differenziazione di: | Stafilococchi | Streptococchi | Nessuna delle altre risposte è corretta | Lieviti | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 772 | L'angina: | Si manifesta quando l'ossigeno fornito al miocardio è insufficiente | Nessuna delle altre risposte è corretta | Quando si manifesta provoca un dolore che non riguarda il petto | Si manifesta quando l'ossigeno fornito al miocardio è sufficiente | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 773 | Un soggetto viene accompagnato al Pronto Soccorso a seguito di un incidente. L'esame neurologico è: risposta oculare spontanea, risposta verbale orientata/appropriata, risposta motoria obbedisce al comando. Secondo la scala di Glasgow (GCS) lo score è: | Punti 15; risposta oculare (punti 4), risposta verbale (punti 5), risposta motoria (punti 6) | Punti 13; risposta oculare (punti 3), risposta verbale (punti 5), risposta motoria (punti 5) | Nessuna delle altre risposte è corretta | Punti 12; risposta oculare (punti 3), risposta verbale (punti 4), risposta motoria (punti 5) | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 774 | Quale infestazione cutanea causata dall'acaro Sarcoptes scabiei, si basa sull'esame obiettivo e sulla scarificazione e prevede come trattamento l'uso di scabicidi topici o, talvolta, di ivermectina orale? | Scabbia | Rosolia | Meningite | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 775 | Come deve avvenire il massaggio cardiaco esterno? | Comprimendo lo sterno contro il rachide, la linea di pressione deve essere verticale | Nessuna delle altre risposte è corretta | Comprimendo la colonna vertebrale, posteriormente all'altezza del cuore, la linea di pressione deve essere diagonale | Comprimendo la faringe con due dita, la linea di pressione deve essere verticale | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 776 | L'isoflurano: | Può essere associato all'adrenalina | Causa epatotossicità maggiore rispetto ad altri | Non irrita la mucosa | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 777 | Quale tra questi termini definisce un aumento della variabilità delle dimensioni dei Globuli Rossi? | Anisocitosi | Schistocitosi | Poichilocitosi | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 778 | Gli effetti teratogeni da sostanze chimiche sono: | Dipendenti dalla dose | Dipendenti dall'ambiente | Indipendenti dalla dose | Indipendenti dalla specie | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 779 | Indicare l'enzima il cui aumento è più indicativo di danno epatico acuto: | ALT (alanina aminotransferasi) | CPK (creatin fosfochinasi) | Enzima H+ | ALP (fosfatasi alcalina) | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 780 | Con riferimento alla procedura di "assistenza al paziente che manifesta convulsioni", indicare quale azione, fra le seguenti, deve essere effettuata per prima. | Se il paziente non è a letto assisterlo, sul pavimento, proteggendo la testa nel proprio grembo o su un cuscino | | Aprire i vestiti intorno al collo e al torace | Osservare l'andamento dell'attacco convulsivo, annotare la sequenza e il tipo di movimento degli arti. Osservare il colore della cute. Quando l'attacco finisce, controllare la frequenza del polso e del respiro | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA GENERALE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|--------------------------|
| 781 | Il tempo indicato per la trasfusione di una sacca di piastrine (80 cc.) è: | Circa 5 - 10 minuti | Circa 200 ml / h | Maggiore di un'ora | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 782 | Qual è la caratteristica delle enterotossine da stafilococchi aureus: | Termo-resistenza | Crio-resistenza | Crio-labilità | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 783 | Il ph del succo gastrico è compreso tra: | 1 e 2 | 7 e 8 | 10 e 20 | 5 e 6 | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 784 | Quali caratteristiche funzionali deve presentare un anestetico locale per essere utilizzato? | Avere bassa tossicità | Causare sonnolenza | Essere irritante per il sito in cui viene applicato | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 785 | L'insulina: | È rilasciata dalle cellule beta del pancreas | Nessuna delle altre risposte è corretta | È rilasciata dalle cellule alfa del pancreas | È rilasciata dalle cellule delta del pancreas | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 786 | Lo stato di anestesia ideale prevede: | Perdita di tutte le sensazioni compresa analgesia e rilassamento muscolare | Attivazione dei neuroni del sistema nervoso | Nessuna delle altre risposte è corretta | Perdita di tutte le sensazioni tranne analgesia | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 787 | Quale dei seguenti bendaggi può essere delegato all'operatore socio sanitario? | Semplice | Semplice e complesso | Complesso | Incrociato a doppio nodo | INFERMIERISTICA GENERALE |
| 788 | Le lesioni cutanee primarie sono quelle che compaiono inizialmente in risposta ad alcuni cambiamenti nell'ambiente esterno o interno della cute. Ne costituisce esemplificazione: | Pustola | Linfonodo | Erosione | Cicatrice | INFERMIERISTICA GENERALE |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| Id | Quesito | Risp_esatta | Risp_errata_1 | Risp_errata_2 | Risp_errata_3 | Materia |
|-----|--|---|---|---|---|---------------------------|
| 789 | Le ghiandole piloriche dello stomaco sono: | ramificate a secrezione mucosa | acinose composte a secrezione mista | acinose composte a secrezione sierosa | tubulo-acinose a secrezione mista | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 790 | Cardiopatia ischemica: una delle seguenti affermazioni è vera. Quale? | Restringimento delle coronarie, che provoca un insufficiente apporto di sangue al cuore | Morte di un'area del tessuto cardiaco in seguito ad interruzione prolungata dell'apporto sanguigno | Malattia che colpisce i reni | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 791 | Una delle seguenti è la definizione di arteriosclerosi. Quale? | Forme di indurimento, ispessimento e perdita di elasticità della parete arteriosa | Deficit neurologici determinati dall'insufficiente apporto di sangue a un'area più o meno estesa del cervello | Componente delle membrane cellulari, di cui regola fluidità e permeabilità | Condizione in cui il flusso del sangue spinto dalla contrazione del muscolo cardiaco perde la normale e caratteristica silenziosità | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 792 | Che cos'è la cataratta? | L'opacizzazione del cristallino | Lente che riveste la parte anteriore dell'occhio | Lente biconcava situata dietro l'iride | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 793 | Cos'è la proctorragia? | Un'emorragia rettale | Una melena | Un'enterorragia | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 794 | Nell'antro pilorico è prodotta: | la gastrina | la ptialina | la secretina | la mucina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 795 | Che cos'è la piorrea? | Una periodontite cronica | La pellicola che si deposita sullo smalto dei denti | La struttura di sostegno del dente | Un agente inibente la crescita batterica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 796 | La ERCP viene eseguita per studiare: | i dotti pancreatici e biliari | le vene | il colon | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 797 | Cos'è la malattia di Fournier? | La cancrena acuta dei genitali | Un carcinoma del pancreas | Un tumore benigno | Una malattia allergica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 798 | Nell'ulcera gastrica si può osservare: | melena | ematuria | diarrea | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 799 | Il primo segmento epatico drena direttamente: | nella vena cava | nella vena porta | nella vena giugulare | nella vena femorale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 800 | Per ascite si intende: | una raccolta liquida in cavo peritoneale | una raccolta saccata, infetta, in cavo peritoneale | la presenza di versamento liquido in cavità pleurica | un processo infiammatorio a carico del cavo ascellare | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 801 | In caso di vomito violento, qual è il rischio maggiore per il paziente? | Rottura spontanea dell'esofago | Ernia diaframmatica | Ipertensione portale | Varici esofagee | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 802 | Quali ormoni vengono prodotti dalle ghiandole surrenali? | Cortisolo, aldosterone | Testosterone, aldosterone | ACTH, TRH | Prolattina, LTH | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 803 | Gli acidi grassi vengono assorbiti da quali cellule? | Intestinali | Epatiche | Pancreatiche | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 804 | La fibrillazione è : | un'alterazione della normale contrattilità dei muscoli | un arresto cardiaco | un'alterazione del ritmo respiratorio ad intervalli rapidi e non coordinati | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 805 | Dove sono distribuite le ghiandole sebacee? | Su tutta la superficie cutanea | Nella pianta del piede | Sulla cute | Nel palmo della mano | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 806 | Che cos'è un aneurisma? | Una dilatazione patologica permanente di un tratto più o meno circoscritto di un'arteria dovuto a indebolimento della parete del vaso | Una dilatazione di un'arteria con versamento emorragico | Un restringimento di un'arteria | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 807 | I traumi cranici possono essere distinti in: | chiusi e aperti | aperti e primari | primari e secondari | secondari e aperti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 808 | Le peritoniti possono essere: | da propagazione e da perforazione | da perforazione e da occlusione | primarie e secondarie | naturali e anomale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 809 | In quale arteria si manifesta più frequentemente l'aneurisma dissecante? | Aorta | Succlavia | Femorale | Iliaca | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 810 | Il termine anorchia indica: | mancanza congenita dei testicoli | mancanza congenita della tiroide | mancanza congenita delle ovaie | mancanza congenita della milza | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 811 | Il termine emospermia indica: | piccola quantità di sangue nello sperma | piccola quantità di sangue nelle urine | piccola quantità di sangue nelle feci | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 812 | L'indagine spirometrica (spirometria) serve a: | registrare la velocità di espirazione del paziente e il volume totale di aria inspirata | valutare la dimensione polmonare | determinare la presenza di enfisema polmonare | diagnosticare una pneumopatia ostruttiva | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 813 | L'acalasia coinvolge i muscoli della parete: | dell'esofago | del retto addominale e obliquo esterno | del grande pettorale | del deltoide | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|---------------------------|
| 814 | Il termine acolia indica mancanza di: | secrezione biliare | urina | feci | sudore | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 815 | L'ACTH è necessaria per il mantenimento e la crescita di quali cellule? | Quelle della corteccia surrenale | Quelle del pancreas | Quelle dello stomaco | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 816 | Dov'è posta l'iride? | Tra cornea e cristallino | Tra congiuntiva e cornea | Tra cristallino e pupilla | Tra retina e congiuntiva | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 817 | Cosa sono le ranule? | Cisti da ritenzione di saliva | Formazioni peduncolate provocate da un accrescimento eccessivo di tessuto sottomucoso | Neoplasie della bocca | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 818 | Quale minerale ha effetto oncogeno? | Asbesto | Berillio | Ferro | Alluminio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 819 | Che tipo di muscolo è il tensore della fascia lata? | Muscolo fusiforme situato nella regione antero-laterale della coscia | Muscolo superficiale situato nella regione anteriore della coscia | Muscolo sottile e gracile posto in profondità sulla regione posteriore dell'articolazione del ginocchio | Muscolo profondo della regione posteriore della coscia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 820 | Completare la seguente frase con l'opzione corretta: "Il muscolo trasverso dell'addome " | aumenta la pressione addominale | flette e inclina lateralmente il tronco | aumenta la pressione intraddominale | contraendosi tende la fascia iliaca | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 821 | Il principale compito dei leucociti (globuli bianchi) è : | la difesa dell'organismo | fermare la perdita di sangue nelle ferite | trasportare l'ossigeno | trasportare sostanze nutritive ai tessuti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 822 | Il calcagno: | è provvisto di una tuberosità sulla faccia postero-inferiore | è in rapporto articolare diretto con tibia e perone | è posto al di sopra dell'astragalo | è la più voluminosa delle ossa brevi del corpo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 823 | Cos'è l'emofilia? | Una malattia della coagulazione del sangue | Una malattia che colpisce i muscoli | Tutte le altre risposte sono corrette | Una malattia che colpisce il pancreas | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 824 | Quale ormone viene sintetizzato nel duodeno? | Secretina | Glucagone | Nessuna delle altre risposte è corretta | Progesterone | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 825 | Il digiuno è il tratto di intestino deputato al maggior assorbimento di: | grassi | vitamine | tutte le altre risposte sono corrette | acqua | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 826 | Si definisce pancreatite acuta: | un'inflammatione acuta del pancreas | una patologia a carattere autoimmune | una degenerazione ereditaria del pancreas | una neoplasia del pancreas | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 827 | Che cos'è l'embolia? | Un'ostruzione vascolare | Una terapia d'urto | Nessuna delle altre risposte è corretta | Una virosi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 828 | La sede più frequente di origine del carcinoma gastrico è : | l'antro | il fondo | nessuna delle altre risposte è corretta | il corpo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 829 | Qual è il sintomo più frequente in caso di fibroma uterino? | Metrorragia | Amenorrea | Incontinenza urinaria | Nessun disturbo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 830 | La fibrinogenemia indica: | la percentuale di fibrinogeno presente nel sangue | l'eccesso di creatinina nel sangue | la quantità di ferro presente nel sangue | la concentrazione di piastrine nel sangue | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 831 | L'epistassi indica il fenomeno del sanguinamento da: | naso | bocca | genitali | orecchio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 832 | Cos'è la glossectomia? | Asportazione di parte o di tutta la lingua | Cicatizzazione di una lesione della lingua | Piccolo rigonfiamento sulla lingua | Inflammatione della lingua | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 833 | La parte della laringe formata dalle corde vocali e dalla fessura posta tra esse si chiama: | glottide | gotta | nessuna delle altre risposte è corretta | glioma | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 834 | Cos'è un broncospasmo? | Una contrazione delle fibre muscolari che circondano la parete dei bronchi | Un impedimento dell'attività respiratoria | Un flusso espiratorio forzato calcolato tra il 25 e il 75% della capacità vitale | Una sostanza derivante dall'oppio che dà effetti analgesici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 835 | Le ghiandole di Meibomio si trovano: | nell'occhio (palpebre) | nel pancreas | nella bocca | nella tiroide | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 836 | Con il termine amastia cosa si indica? | La mancanza congenita della mammella | L'incapacità di parlare | Il timore ossessivo degli spazi aperti | Una massa benigna, simile a un tumore | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 837 | La piuria indica: | presenza di leucociti e pus nelle urine | presenza di bilirubina nelle urine | presenza di blu di metilene nelle urine | presenza di sangue nelle urine | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 838 | Quanti stadi si riconoscono nella polmonite franca lobare non trattata? | 4 | 3 | 2 | 5 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 839 | Quante sono le categorie principali dei muscoli della respirazione? | 2 | 3 | 4 | 5 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 840 | L'arteria coronaria destra origina: | in corrispondenza del seno aortico destro | dall'ostio venoso del ventricolo sinistro | in corrispondenza del seno aortico anteriore destro | in corrispondenza del seno aortico posteriore | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|---------------------------|
| 841 | Quale delle seguenti affermazioni sulle radici del plesso lombare è errata? | Si dividono ciascuna in due rami | Tutte le altre risposte sono corrette | Passano fra le inserzioni del muscolo psoas sulla colonna vertebrale | Sono accompagnate dalle arterie lombari | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 842 | Nei traumi chiusi addominali qual è l'organo più frequentemente interessato? | La milza | Il pancreas | Il fegato | Lo stomaco | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 843 | Una diarrea associata a febbre orienta verso una patologia: | infettiva | psicosomatica | renale | epatica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 844 | Il carcinoma a cellule squamose del polmone è più frequente in pazienti: | fumatori | ipotesi | ipertesi | diabetici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 845 | Cosa si intende per oschioccele? | Ernia scrotale | Nessuna delle altre risposte è corretta | Punta d'ernia | Bubonocele | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 846 | La chetonuria indica la presenza nelle urine di: | corpi chetonici | glucosio | acidi grassi | trigliceridi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 847 | Lo spessore della cute varia a seconda delle regioni del corpo; in quale punto è molto sottile? | Sulle palpebre | Sulla pancia | Sul palmo della mano | Sotto la pianta dei piedi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 848 | Un'ustione con un profondo interessamento del derma è definita: | di III grado | profonda | di I grado | di II grado | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 849 | Che cosa si intende per lussazione? | Perdita di contatto tra i capi articolari | Anomalia congenita dell'anca | Rottura della capsula articolare | Stiramento di un muscolo degli arti superiori | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 850 | Che cosa significa litiasi? | Presenza di concrezioni calcaree in un organo secrotore | Accumulo di sali di litio | Ostacolo al deflusso della bile | Formazione di calcoli renali | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 851 | Al passaggio della corrente elettrica quale dei seguenti tessuti è più resistente? | Ossa | Sangue | Pelle | Nervi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 852 | Cos'è l'arteriosclerosi? | Una progressiva degenerazione delle pareti delle arterie che ne causa l'indurimento, la perdita di elasticità e il restringimento | Nessuna delle altre risposte è corretta | Un deficit neurologico acuto | Una ridotta funzionalità cardiaca | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 853 | La doccia radiale si trova: | nell'omero | nella clavicola | nel radio | nell'ulna | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 854 | Cosa indica l'anopsia? | Una forma di cecità temporanea che si può manifestare quando si verificano forti variazioni di velocità | Una condizione patologica che provoca diarrea con feci voluminose | Una malattia di origine intestinale | Una malattia multifattoriale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 855 | Che cos'è l'atrofia? | Riduzione di peso e di volume di un organo o di altra parte dell'organismo | Cordone fibroso | Aumento di volume di un tessuto | Concentrazione dura di sali minerali (calcolo) | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 856 | Il rachitismo è causato dalla carenza di quale vitamina? | Vitamina D | Vitamina K | Vitamina B12 | Vitamina E | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 857 | L'insulina è prodotta da: | isole di Langerhans | fegato | reni | ipofisi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 858 | Quali parti del corpo possono essere colpite dagli angiomi? | Tutte le altre risposte sono corrette | Viso | Nuca e tronco | Alcuni organi interni come il fegato | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 859 | In quali condizioni c'è il rischio di sviluppare una cancrena gassosa? | Tutte le altre risposte sono corrette | Gravi lesioni a carico dei muscoli | Ferite complicate dalla presenza di corpi estranei | Amputazione di arti ischemici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 860 | I segni fondamentali della peritonite acuta generalizzata sono: | Tutte le altre risposte sono corrette | Febbre e leucocitosi | Contrattura addominale | Shock | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 861 | Come viene definita l'ischemia che colpisce soprattutto le dita delle mani? | Malattia di Raynaud | Morbo di Parkinson | Trombosi venosa profonda | Arteriopatia cronica ostruttiva | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 862 | I traumi cranici chiusi possono essere provocati da: | Tutte le altre risposte sono corrette | Un corpo contundente | Un contraccolpo | Violenti spostamenti d'aria | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 863 | Quali sono i componenti del sangue? | Tutte le altre risposte sono corrette | Plasma e trombociti | Eritrociti | Leucociti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 864 | Le richieste energetiche del nostro organismo vengono soddisfatte da: | tutte le altre risposte sono corrette | carboidrati | grassi | proteine | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 865 | Da quale delle seguenti sedi proviene più frequentemente l'embolo che causa l'embolia polmonare? | Vene profonde degli arti inferiori | Vena aorta | Atrio destro | Vene superficiali degli arti inferiori | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 866 | Dove compaiono solitamente le strie atrofiche? | Tutte le altre risposte sono corrette | Sull'addome | Sulle cosce | Sulle mammelle | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 867 | Quali sono i segni tipici dell'acromegalia? | Tutte le altre risposte sono corrette | Allungamento del volto | Ingrossamento della mandibola | Ingrossamento del naso | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 868 | In quale patologia è netto e rinforzato il fremito vocale? | Polmonite lobare | Pneumotorace | Asma | Enfisema | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 869 | Indicare il farmaco valido nella terapia della tubercolosi: | rifampicina | eritromicina | amoxicillina | penicillina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 870 | Indicare il farmaco che di solito può determinare eruzioni cutanee: | amoxicillina | diuretici | atenololo | nessuno | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 871 | Qual è il farmaco di pronto impiego di fronte a crisi ipertensiva in ambiente extraospedaliero? | Nifedipina via sublinguale | Captopril per os | Nitroglicerina via sublinguale | Verapamil evù | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 872 | Quale farmaco si utilizza in caso di glaucoma acuto? | Pilocarpina 3% gocce | Nessuno è indicativo | Fluorometolone collirio | Tromantadina pomata os | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 873 | Indicare il farmaco a effetto antipertensivo: | diuretici | statine | colestipolo | chinolonici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 874 | Indicare quale fra questi è un farmaco ad azione antipiretica: | paracetamolo | beta-bloccanti | chinolonici | sulfamidici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 875 | Quale farmaco si usa in caso di IMA della terapia fibrinolitica? | Streptochinasi | Adrenalina | Eparina | Reserpina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 876 | In caso di allergia alla penicillina, quale antibiotico si usa per un'infezione streptococcica delle prime vie respiratorie? | Macrolidi (eritromicina ecc.) | Cefalosporine | Tetracicline | Sulfamidico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 877 | Indicare i farmaci elettivi in caso di endometriosi: | Estroprogestinici | Cortisonici | Acth | Ciproterone acetato | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 878 | Il farmaco elettivamente impiegato nel piccolo male è : | valproato sodico | idantoinico | barbiturico | benzodiazepinico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 879 | I barbiturici possono determinare: | induzione enzimatica epatica | induzione enzimatica cerebrale | alterazioni oculari | crisi neurodislettiche | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 880 | Quali tra questi farmaci risulta efficace per la bradiocardia? | Atropina | Nitroglicerina | Sali di potassio | Antiarritmici di I classe | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 881 | Con quale farmaco asintomatico si curano solitamente i dolori osteoarticolari? | Diclofenac | Cortisonici | Paracetamolo | Acido aminosalicilico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 882 | Nella preparazione farmacologica con quale sostanza di solito è utilizzata la amoxicillina? | Acido clavulonico | Josamicina | Sobrero | Eritromicina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 883 | Quale dei sottoindicati farmaci dà fotosensibilità? | Tetracicline | Penicilline | Succinilcolina | Paracetamolo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 884 | Indicare quale fra questi è un farmaco antiaritmico: | amiodarone | carbamazepina | ippiodi | istamina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 885 | Indicare il farmaco ad azione antivirale: | acyclovir | metotrexane | chinolonici | nimesuline | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 886 | Indicare il farmaco gastrolesivo: | ketoprofene | verapamil | nessuno dei precedenti | ribovirina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 887 | Quali farmaci hanno un'azione miorilassante? | Benzodiazepine | Istaminici | Antiemetici | Vitamine | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 888 | L'uso terapeutico della tossina botulinica è indicato per una delle seguenti condizioni. Quale? | Blefarospasmo | Distonia | Spasticità | Bruxismo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 889 | Uno dei seguenti antibiotici è di prima scelta nella terapia della malattia di Lyme. Quale? | Tetracicline | Cefalosporine | Eritromicina | Penicillina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 890 | Tutti i seguenti sono effetti della morfina, tranne uno. Quale? | Diarrea | Nausea | Depressione respiratoria | Miosi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 891 | Uno tra i seguenti è il trattamento più indicato in un paziente che ha avuto recentemente un infarto miocardico e attualmente affetto da depressione. Quale? | Paroxetina | Tranileipromina/trifluoroperazina (IMAO) | Elettroshock | Amitriptilina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 892 | Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia? | Insulina | Farmaci irritanti | Diuretici | Farmaci ipertonici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 893 | Nell'infezione da Clostridium difficile qual è l'antibiotico di elezione? | Vancomicina | Eritromicina | Penicillina | Amoxicillina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 894 | Indicare il farmaco valido nella terapia del morbo di Crohn: | acido aminosalicilico | omoprazolo | sali d'oro | acido acetilsalicilico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 895 | Indicare quale fra questi è un farmaco antidepressivo: | amitriptilina | fenilbutazone | fibrati | atenololo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--|---------------------------|
| 896 | Quale farmaco viene somministrato nella tachicardia parossistica? | Verapamil | Adrenalina | Clonidina | Sufedipina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 897 | Indicare il farmaco antimicotico: | itraconazolo | adrenalina | vitamina | ticlopidina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 898 | Quale farmaco può essere utile in caso di anemia? | Eritropoietina | Acido tranexanico | Rame | Zinco | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 899 | In una tra le seguenti condizioni è indicato l'impiego degli anticolinesterasici. Quale? | Miastenia grave | Glaucoma ad angolo chiuso | Diarrea ribelle | Anestesia generale in associazione agli anestetici gassosi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 900 | La loperamide può essere usata nel trattamento di uno dei seguenti sintomi. Quale? | Diarrea | Stipsi ostinata dell'anziano | Meteorismo | Reflusso gastroesofageo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 901 | Uno dei seguenti farmaci produce, quando assunto insieme all'alcool, il cosiddetto effetto antabuse. Quale? | Disulfiram | Amoxicillina | Eritromicina | Digossina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 902 | Tutte le seguenti sono azioni farmacologiche delle benzodiazepine, tranne una. Quale? | Convulsivante | Ipnoinducente | Ansiolitica | Miorilassante | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 903 | Nel sangue che si somministra in una trasfusione è possibile aggiungere farmaci? | No | Solo nei diabetici | Sì | Dipende dai casi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 904 | L'uso protratto di anfetamine può comportare: | la slatentizzazione di una psicosi | crisi oculogire | il sorgere di una psicosi | la slatentizzazione di una nevrosi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 905 | Quale farmaco è indicato nel caso di ipercolesterolemia? | Statine | Atenololo | Propanololo | Fluoxetina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 906 | In quale tra le seguenti patologie è indicato l'uso delle tetracicline? | Bruccellosi | Tubercolosi, come 3° farmaco di associazione | Diarrea del viaggiatore | Malaria resistente alla cloroquina e alla meflochina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 907 | La colchicina è utilizzata elettivamente per il trattamento di una sola tra le seguenti condizioni. Quale? | Attacco acuto di gotta | Iperuricemia in corso di insufficienza renale lieve moderata | Malaria | Terapia non chirurgica del calazio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 908 | Quale dei seguenti farmaci antidepressivi è causa di priapismo? | Trazodone | Fluoxetina | Bupropione | Clomipramina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 909 | Quale dei seguenti farmaci inibisce la sintesi di acido urico? | Allopurinolo | Sulfipirazone | Benzodiarone | Probenecid | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 910 | Che cos'è il dipiridamolo? | Un antiaggregante piastrinico | Un a-bloccante | Un b-bloccante | Un a-stimolante | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 911 | Quando si è già instaurata una trombosi, la terapia farmacologica consiste nella somministrazione di: | tutte le altre risposte sono corrette | eparina | eparina chiusa | fibrinolitici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 912 | La codeina viene usata per: | tutte le altre risposte sono corrette | mal di testa | tosse | mal di denti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 913 | Il Losartan è : | un antagonista rec. Angiotensina 2 | un Ace-inibitore | un beta-bloccante | un calcio antagonista | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 914 | In che fase della febbre si osserva una profusa sudorazione? | Nella fase di defervescenza | Nella fase di remissione | Nella fase di acme | Nella fase di stato | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 915 | Sono radiazioni ionizzanti: | i raggi X | le radiazioni solari | i raggi ultravioletti | i raggi infrarossi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 916 | L'assideramento è : | la soppressione dell'attività termoregolatrice da prolungato freddo umido | l'iperproduzione di siderofilina | l'infiammazione da freddo prolungato | la distensione meccanica della membrana | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 917 | Cos'è l'ipertermia? | L'aumento della temperatura corporea | L'aumento della frequenza cardiaca | La riduzione della temperatura corporea | L'aumento dei peli | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 918 | Sono esempi di contagio per via aerea le seguenti infezioni, eccetto una. Quale? | Tifo esantematico | Tubercolosi polmonare | Vaiolo | Difterite | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 919 | Di norma, la contrattura dello sfintere aumenta: | nella ragade anale | nel morbo di Crohn | nel cancro del canale anale | nell'ulcera tuberculare | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 920 | La sala operatoria deve avere dimensioni non inferiori a: | 35-40 mq | 60-70 mq | 100 mq | 20-30 mq | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 921 | Nei pazienti con anemia perniziosa qual è il carcinoma più frequente? | Gastrico | Polmonare | Renale | Epatico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 922 | La bagassosi è dovuta a: | miceti | batteri | virus | protozoi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 923 | Nella febbre si ha generalmente: | acidosi metabolica | acidosi respiratoria | alcalosi metabolica | alcalosi respiratoria | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|---|---------------------------|
| 924 | L'osteosarcoma è il tumore maligno dello scheletro più frequente nei: | giovani | soggetti anziani | neonati | soggetti tra i 40 e i 50 anni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 925 | Nell'ematoma muscolare, quale mezzo terapeutico è indicato? | Ghiaccio | Impacchi caldi | Massaggio | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 926 | Le lesioni organiche vascolari vengono evidenziate con: | flussimetria doppler | ecografia | arteriografia | scintigrafia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 927 | Le coliti sono: | processi infiammatori della mucosa intestinale a decorso acuto, subacuto, cronico | processi escavanti la mucosa intestinale | tumori benigni dell'intestino | processi flogistici a carico del coledoco | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 928 | Con il termine di autotrapianto si intende: | la rimozione e il trapianto di un tessuto all'interno dello stesso organismo | il trapianto di un organo in un individuo appartenente alla stessa specie del soggetto da cui è stato espantato | il trapianto di organi tra specie diverse | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 929 | Che cos' è un filtro cavale? | Protesi endovascolare | Drenaggio | Protesi cardiaca | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 930 | L'istamina favorisce: | la coagulazione del sangue | le emorragie | la deplezione linfocitaria | la chemiotassi del PMN | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 931 | Quando si trasfonde sangue? | Quando Hb è inferiore a 8 g/dl | Quando Hb è inferiore a 20 g/dl | Quando Hb è inferiore a 3 g/dl | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 932 | Le cellule prevalenti nell'infiammazione prodotta da infezioni virali sono: | linfociti | eosinofili | mastcellule | plasmacellule | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 933 | Il PPD è : | un antigene | un anticorpo | una tossina | un vaccino | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 934 | L'anticorpo è : | una glicoproteina | un peptide | una proteina | una lipoproteina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 935 | Le plasmacellule derivano da: | linfociti B | linfociti T | macrofagi | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 936 | In quale di queste malattie non si riscontra un difetto di chemiotassi: | morbillo | cirrosi epatica | morbo di Hodgkin | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 937 | Come viene eseguita un'embolectomia? | Con un catetere particolare (Fogarty) | Con farmaci anticoagulanti | Con by-pass | Con fibrinolitici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 938 | Lo shock anafilattico può colpire: | qualunque individuo in opportune condizioni | gli individui allergici | gli atopici | gli immunodepressi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 939 | Quanti sono i tipi di linfedema? | Tre | Due | Quattro | Uno | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 940 | Qual è la causa del morbo di Parkinson? | Degenerazioni o lesioni delle cellule nervose all'interno dei gangli basali | Alterazioni genetiche | Ereditarietà | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 941 | L'infarto polmonare è : | una conseguenza di un'embolia polmonare | l'ostruzione di una arteria a seguito della fissurazione del cappuccio fibroso di una placca ateromatosa | una necrosi provocata da un disturbo vasomotorio o dall'occlusione della circolazione arterovenosa mesenterica | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 942 | I valori di frequenza cardiaca si considerano normali nel bambino se rientrano nei: | 90-100 battiti | 70-90 battiti | 120-130 battiti | 70-80 battiti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 943 | Quando viene eseguito un intervento di colopessi? | Nei casi di prolasso del retto | Nei casi di cancro del colon | Nei casi di cancro della gola | Nei casi di cancro dello stomaco | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 944 | La colpotomia è un intervento chirurgico che consiste: | nel praticare un'incisione nella vagina per svuotare un ascesso localizzato nel piccolo bacino | nel praticare un'incisione per il drenaggio di un ematoma | nel praticare un'incisione in cui parte del colon viene estroflessa | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 945 | La narcolessia è caratterizzata da: | eccessiva e cronica sonnolenza | febbre, cefalea | dolori generalizzati | gonfiore generale dei linfonodi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 946 | Cosa ha minore importanza nella diagnosi di arresto cardiaco? | L'elettrocardiogramma | L'assenza di polso | L'assenza di attività respiratoria spontanea | L'assenza di pressione sanguigna | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 947 | Dove si riscontrano le metastasi più frequenti del tumore della mammella? | Ossa e polmoni | Fegato e pancreas | Cervello | Stomaco | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 948 | Quali sono le alterazioni quantitative della diuresi? | Oliguria e poliuria | Poliuria e piuria | Pollachiuria | Stranguria | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 949 | L'apoptosi è definibile come: | morte cellulare programmata | morte cellulare improvvisa | morte cellulare generalizzata | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|---------------------------|
| 950 | Le glicogenosi sono patologie derivanti da: | eccessivo accumulo di glicogeno | formazione abnorme di glicogeno | intolleranza agli zuccheri complessi | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 951 | La sindrome di Down è causata da un'alterazione genetica. Nello specifico dalla: | trisomia del cromosoma 21 | inversione di un frammento del cromosoma 12 | triploidia del patrimonio cromosomico | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 952 | In caso di emorragia arteriosa, la manovra di compressione effettuata attraverso l'utilizzo di laccio emostatico va eseguita: | tra il cuore e la zona dell'emorragia | continuamente per 20 minuti | soltanto nel caso in cui il paziente appaia ipoteso | senza stringere eccessivamente il laccio, al fine di evitare episodi ischemici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 953 | L'ulcera gastrica appare frequentemente localizzata: | a livello del piloro e della piccola curva gastrica | a livello del cardias | a livello della grande curva gastrica | a livello del fondo dello stomaco | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 954 | Cosa presenta il paziente, nel diabete insipido: | deficit di ormone antidiuretico | eccesso di insulina | intensa diuresi | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 955 | Nell'insufficienza respiratoria la tensione arteriosa di ossigeno (pO2) minore di: | 60 mmHg | 30 mmHg | 80 mmHg, ma superiore a 70 mmHg | 110 mmHg | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 956 | Indicare quale delle seguenti definizioni di virulenza è più corretta: | la capacità di un dato microrganismo di superare le difese di un dato ospite in determinate condizioni | la resistenza del microrganismo ad agenti terapeutici | la capacità del microrganismo di produrre tossine a loro volta patogene per l'organismo | la capacità del microrganismo di determinare una malattia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 957 | Lo studio della causa di un evento morboso è definito: | eziologia | patogenesi | embriogenesi | epidemiologia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 958 | Cosa possono provocare le radiazioni U.V. : | carcinomi cutanei | leucemia | orticaria | linfomi non Hodgkin | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 959 | Le sostanze che potenziano l'azione delle radiazioni eccitanti sono dette: | fotodinamiche | monocromatiche | ossidanti | fotosensibili | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 960 | Il colpo di sole è : | un danno meningeo dovuto a eccessiva esposizione ai raggi solari | un malore delle popolazioni a clima tropicale | un malore delle popolazioni a clima equatoriale | una malattia che insorge durante l'estate | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 961 | Contro la stipsi è indicata una dieta ricca di: | fibre (crusca, mucillagini), farina integrale | farina bianca, proteine | cibi speziati | carboidrati | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 962 | Non è una malattia infettiva: | la micosi fungoide | l'istoplasmosi | la pertosse | la tubercolosi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 963 | La tossina tetanica provoca: | paralisi spastica | vomito | diarrea | paralisi flaccida | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 964 | La febbre intermittente si riscontra maggiormente in caso di: | angiocoliti | trombosi arteriose | aneurismi venosi | flebiti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 965 | Quale tra le seguenti NON è una malattia ereditaria? | Miastenia grave | Emofilia A | Anemia mediterranea | Albinismo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 966 | Una malattia infettiva con febbre elevata, leucopenia e bradicardia probabilmente è: | febbre tifoide | malaria | epatite virale | brucellosi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 967 | Qual è la sindrome in cui l'ormone gastrina si presenta a un tasso elevato? | Sindrome di Zollinger-Ellison | Morbo di Basedow | Nessuna delle altre risposte è corretta | Sindrome di Ciuffini-Pancoast | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 968 | Che cosa si intende per ferita? | Perdita della soluzione di continuo della cute o della mucosa | Incisione chirurgica | Lesione causata da un oggetto tagliente | Perdita di uno strato di epitelio in seguito a trauma | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 969 | L'anoressia è : | un disordine dell'alimentazione | un disordine alimentare che colpisce prevalentemente in età geriatrica | un disturbo metabolico che porta alla magrezza patologica | una malattia metabolica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 970 | Che cos'è la fibrina? | Una proteina plasmatica | Un nucleotide | Una tromboglobina | Un polimero insolubile | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 971 | Dopo una lesione, quale tipo cellulare si rigenera meno facilmente? | I neuroni del SNC | L'epidermide | La mucosa intestinale | I nervi periferici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 972 | Il colorito terreo è caratteristico dei: | malarici cronici | colitici | nessuna delle altre risposte è corretta | diabetici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 973 | Il timo è un tessuto: | epiteliale | connettivale | fibroso | linfoide | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 974 | Il test di Kveim è usato nella diagnosi di: | sarcoidosi | lebbra | nessuna delle altre risposte è corretta | toxoplasmosi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 975 | Il morbo di Graves è una patologia: | tiroidea | disendocrina | dismetabolica | autoimmunitaria | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 976 | La rinite vasomotoria è di origine: | neurovegetativa | infettiva | nessuna delle altre risposte è corretta | allergica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|--|---|---|---|---------------------------|
| 977 | I mitocondri contengono enzimi interessati nella: | fosforilazione ossidativa | sintesi di acidi grassi | nessuna delle altre risposte è corretta | glicolisi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 978 | L'infarto è : | un processo di necrosi causato da ischemia | un processo di necrosi causato da una trombosi arteriosa | un processo di necrosi causato da una trombosi venosa | un'emorragia tessutale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 979 | Cosa si intende per stomizzazione? | Un'apertura chirurgica per unire due organi | Sensazione di instabilità o stordimento | Nessuna delle altre risposte è corretta | Qualsiasi forma di infiammazione oppure ulcerazione di un organo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 980 | La cianosi è dovuta a: | diminuita ossigenazione del sangue | iperemia passiva | ischemia | diminuita saturazione del sangue arterioso | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 981 | La malattia di Cushing è sostenuta da: | iposodiemia e iperpotassiemia | curva glicemica da diabete | nessuna delle altre risposte è corretta | ipervolemia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 982 | L'impetigine è più frequente: | nei bambini | negli anziani | negli adolescenti | negli adulti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 983 | Quale delle seguenti caratteristiche non è tipica dei tumori benigni? | Invasione dei vasi sanguigni | Crescita lenta | Buona differenziazione | Basso indice mitotico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 984 | Che cos'è il comedone? | Un tappo semisolido di materiale grasso caratterizzato da un punto nero | Una piccola escrescenza umida simile a una verruca che compare sulla pelle | Nessuna delle altre risposte è corretta | Un'alterazione della funzionalità renale caratterizzata dalla presenza di pigmenti biliari nell'urina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 985 | La febbre gialla: | è causata da un virus della famiglia degli arbovirus | viene trasmessa dalla zanzara Anopheles | nessuna delle altre risposte è corretta | viene trasmessa dalla zanzara culex fatigans | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 986 | Cos'è la litotriassia? | Una tecnica non chirurgica, con ultrasuoni per polverizzare i calcoli presenti nel corpo | Una tecnica che permette di osservare il feto all'interno dell'utero per mezzo di un fetoscopio | Nessuna delle altre risposte è corretta | Una tecnica di radioterapia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 987 | La linea del latte: | unisce la radice degli arti inferiori a quella degli arti superiori | è una linea trasversale all'altezza della quinta costa | nessuna delle altre risposte è corretta | collega le radici dei due arti superiori | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 988 | La fibrosi epatica è definibile come un processo regressivo dovuto a sintesi di: | collagene | fibronectina | enzimi litici | lipidi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 989 | Quale tra le seguenti indica una proteina di fase acuta nell'infarto del miocardio? | Mioglobina | Fibrinogeno | Nessuna delle altre risposte è corretta | Aptoglobina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 990 | La malattia acuta di Nissl implica: | il rigonfiamento cellulare dei neuroni | l'accumulo di lipofuscina nei neuroni | nessuna delle altre risposte è corretta | una malattia genetica del SNC | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 991 | L'agente eziologico della malaria è : | un protozoo | un batterio | nessuna delle altre risposte è corretta | un virus | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 992 | Quale tra queste può essere considerata una malattia ereditaria? | Fibrosi cistica | Fibrosi polmonare idiopatica | Nessuna delle altre risposte è corretta | Schizofrenia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 993 | Quale tra questi organi subisce un processo naturale di regressione successivamente alla pubertà? | Il timo | La milza | Nessuna delle altre risposte è corretta | Il pancreas | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 994 | Qual è l'agente eziologico della malattia reumatica? | Streptococco bemolitico | Yersinia pestis | Nessuna delle altre risposte è corretta | Klebsiella pneumoniae | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 995 | Il tamponamento cardiaco è determinato da: | accumulo di liquido nel sacco pericardico | alcalosi metabolica | insufficienza respiratoria temporanea | insufficienza respiratoria acuta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 996 | Una sindrome emorragica può essere determinata da una vistosa compromissione della funzionalità epatica per uno dei seguenti motivi: | il fegato non produce fattori della coagulazione | il fegato produce le piastrine | il fegato sintetizza la vitamina B | il fegato non produce le piastrine | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 997 | Tutte le seguenti condizioni possono essere espressione di patologia dei recettori, eccetto una. Quale? | Nanismo dei Pigmei africani e gigantismo genetico dei Watussi | Nessuna delle altre risposte è corretta | Diabete mellito insulino-resistente | Miastenia gravis | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 998 | Con il termine di omeostasi si intende: | l'equilibrio chimico-fisico degli organismi | lo studio delle patologie umane | la terapia postoperatoria | lo studio della staticità biologica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 999 | 500-2000 ml è il volume di secrezione salivare nelle: | 24 ore | 48 ore | 12 ore | 8 ore | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1000 | Una delle seguenti malattie infettive è stata recentemente dichiarata scomparsa dal mondo dalla OMS: | vaiolo | dengue | peste bubbonica | febbre gialla | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1001 | Una sola delle seguenti proposizioni è esatta. Quale? | I fattori di virulenza dei microrganismi possono essere non tossici | Le tossine batteriche non sono fattori di virulenza | Solo i microrganismi virulenti producono tossine | Tutti i microrganismi virulenti producono tossine | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1002 | Le endotossine sono: | lipopolisaccaridi legati a una proteina | proteine | polisaccaridi | lipopolisaccaridi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1003 | Quante sono le fasi di base della coagulazione? | 2 | 3 | 5 | 8 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|---------------------------|
| 1004 | Da quanti strati connettivali è costituita la parete vasale? | 3 | 4 | 1 | 2 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1005 | L'odinofagia è caratterizzata da una deglutizione: | difficoltosa e dolorosa | rumorosa | impossibile | impossibile solo per i cibi solidi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1006 | Il meccanismo anticoagulante della proteina C e della proteina S richiede la partecipazione di: | trombina | nessuna delle altre risposte è corretta | fibrina | fibrinogeno | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1007 | Le endotossine sono di natura: | lipolisaccaridica | lipidica | glucidica | gluciproteica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1008 | La sarcoidosi è : | una malattia a eziologia ignota caratterizzata da lesioni di tipo granulomatoso | una reticolo-endoteliosi | una forma di amiloidosi primaria del tessuto muscolare striato | un tumore maligno connettivale infiltrante | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1009 | Isogenico significa: | proveniente dallo stesso individuo | antigene comune ai membri di una sola specie | classe e sottoclasse di una immunoglobulina | condizione genetica simile a più individui | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1010 | Dove viene solitamente effettuato un prelievo di sangue capillare? | Dal dito | Dall'orecchio | Dal tallone | Dal gomito | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1011 | Per carrier si intende: | una molecola a cui vengono legati gli apteni | un organo linfoide | un antigene virale | un antigene tumorale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1012 | Gli anticorpi svolgono sulle endotossine azione: | agglutinante | tutte le altre risposte sono corrette | neutralizzante | precipitante | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1013 | Gli anticorpi naturali intervengono in: | reazioni trasfusionali | malattie autoimmuni | malattie infettive | reazioni di rigetto | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1014 | Lo shock anafilattico può essere causato da: | farmaci | nessuna delle altre risposte è corretta | pollini | polveri | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1015 | Qual è l'età di maggiore incidenza del fibroma uterino? | 30-50 anni | 60-70 anni | sotto i 20 anni | 20-30 anni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1016 | In quale paziente non si esegue mai una rachicentesi? | In un soggetto con una sospetta ipertensione endocranica | In un soggetto con sospetta malattia epatica | In un soggetto diabetico | In un soggetto cardiopatico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1017 | Quanti sono i segmenti epatici? | 8 | 6 | 2 | 4 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1018 | La frequenza cardiaca viene stabilita contando il numero delle pulsazioni in un minuto; nell'adulto si considerano normali i valori: | battiti 70-80 | battiti 70-90 | battiti 90-100 | battiti 120-130 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1019 | Tra quali valori compreso il pH normale del sangue? | 7,38-7,42 | 7,42-7,45 | 6,8-7,2 | 7,2-7,3 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1020 | La diminuzione di volume di un organo in sede normalmente sviluppato si chiama: | atrofia | metaplasma | aplasia | ipoplasia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1021 | Il tumore benigno può dare metastasi? | No | Man mano che cresce | Sì | In alcuni casi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1022 | Che cos'è il cloasma? | Un'eccessiva concentrazione di melanina | Una malattia della pelle | Una malattia autoimmune | Una forma particolare di micosi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1023 | La più comune causa di morte per tumore nella donna : | carcinoma della mammella | carcinoma dell'ovaio | carcinoma della vescica urinaria | carcinoma del fegato | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1024 | Una biopsia epatica mostra noduli tumorali con struttura adenocarcinomatosa. La sede probabile del tumore primitivo : | il colon | il retto | il cervelletto | la prostata | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1025 | Il fumo da tabacco può provocare: | carcinoma del polmone | melanomi | antracosi | embolia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1026 | Il mughetto si manifesta soprattutto: | nei neonati | negli adulti | negli anziani | nei bambini | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1027 | Il RAST è utile per la diagnosi di: | pollinosi | nessuna delle altre risposte è corretta | micosi | tumori | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1028 | La fibromialgia è una malattia infiammatoria che colpisce: | le fibre di cui sono composti i muscoli | nessuna delle altre risposte è corretta | le ghiandole endocrine | i processi di trasformazione delle sostanze nutritive dell'organismo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1029 | Qual è l'organo più colpito da cancro nella donna? | La mammella | I polmoni | Le ovaie | La cervice uterina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|---|--|--|--|---------------------------|
| 1030 | Si definiscono microorganismi intracellulari facoltativi quei microorganismi: | in grado di sopravvivere e riprodursi sia in ambiente extracellulare che intracellulare | nessuna delle altre risposte è corretta | in grado di sopravvivere all'esterno dell'organismo umano | in grado di sopravvivere in ambiente intracellulare | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1031 | Tra i fattori di rischio dell'aterosclerosi, quale tra i seguenti va considerato rilevante? | Aumento del colesterolo LDL | Nessuna delle altre risposte è corretta | Trombosi arteriosa | Deficit di vitamina B12 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1032 | In caso di presenza di corpo estraneo nelle vie aeree superiori all'emogasanalisi si rileva generalmente: | ipossiemia e ipercapnia | nessuna delle altre risposte è corretta | iperossia | ipertermia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1033 | In un paziente con sclerosi interstiziale polmonare si ha: | incremento della tensione arteriosa di O2 e CO2 | tensione arteriosa di CO2 normale o ridotta | incremento della tensione arteriosa di O2 | incremento della tensione arteriosa di CO2 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1034 | La b talassemia implica deficit di produzione delle catene b dell'emoglobina. Tra gli effetti: | grave anemia | nessuna delle altre risposte è corretta | deficit di mioglobina | aumento dell'emoglobina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1035 | I seguenti batteri sono parassiti intracellulari facoltativi, eccetto uno. Quale? | Micoplasmi | Micobatteri | Salmonelle | Brucelle | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1036 | I raggi X danneggiano principalmente: | ovaie e testicoli | il tessuto muscolare | il tessuto osseo | il tessuto nervoso | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1037 | I pioni sono: | mesoni | corpuscolo del pus | piogeni in disfacimento | pazienti con delirio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1038 | Quali sono i segni vitali? | Tutte le altre risposte sono corrette | Temperatura corporea e respiro | Frequenza cardiaca e polso | Pressione del sangue | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1039 | Che cos'è l'escara? | Una placca di tessuto cancrenoso | Sangue deleucocitato | Un ormone antidiuretico | Una vitamina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1040 | Il dolore è il sintomo principale di quale cancro? | Cancro del corpo pancreatico | Cancro del canale anale | Cancro del fegato | Cancro dello stomaco | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1041 | Il colera può essere veicolato da: | acqua | aria | suolo | insetti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1042 | In sala operatoria il grado ottimale di umidità : | 40-60% | 70-90% | 24-26% | 1 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1043 | Le zone filtro del blocco operatorio servono a: | tutte le altre risposte sono corrette | preparare le persone nel reparto operatorio con modalità appropriate | costituire una zona di scambio di materiali diretti nel reparto operatorio o al di fuori di esso | offrire una zona di comunicazione tra il personale addetto e non al reparto operatorio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1044 | Quali possono essere le complicanze post-operatorie immediate compromettenti la funzione respiratoria? | Ostruzione delle vie aeree | Infezione delle vie urinarie | Infezione della ferita chirurgica | Occlusione intestinale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1045 | L'esantema rosso della scarlattina è dovuto: | alla tossina dello streptococco emolitico | a inalazioni di polveri | all'ingestione di coloranti | alla tossina difterica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1046 | La pollachiuria è il segno più ricorrente nel: | cancro della vescica | cancro dell'esofago | cancro della mammella | ernia inguinale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1047 | La preparazione fisica all'intervento chirurgico si effettua su base: | tutte le altre risposte sono corrette | alimentare | intestinale | vescicale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1048 | La riduzione della termogenesi non si ha: | per fratture multiple | per deficit di alimenti | per deficit di ossigeno | per lesioni epatiche | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1049 | Quale mezzo terapeutico è indicato per il gomito del tennista? | ghiaccio | massaggio | laserterapia | laccio emostatico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1050 | Qual è la sostanza più importante nell'induzione dell'aggregazione piastrinica? | ADP | ATP | AA | PF4 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1051 | Per quale via venosa si posiziona un filtro cavale? | Tutte le altre risposte sono corrette | Giugulare interna | Succlavia | Femorale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1052 | I segni cardinali dell'infiammazione includono i seguenti fenomeni eccetto uno. Quale? | Iperfunzione | Calore | Tumefazione | Dolore | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1053 | In una trasfusione, il plasma può essere usato: | tutte le altre risposte sono corrette | fresco | congelato | essiccato | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1054 | In che modo possono essere somministrati farmaci per via endovenosa? | Tutte le altre risposte sono corrette | Attraverso l'iniezione diretta di medicinali in vena | Attraverso un'infusione continua o intermittente | Attraverso un'iniezione intermittente diretta (bolo o pressione) | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1055 | Un prelievo di sangue arterioso può essere effettuato: | Tutte le altre risposte sono corrette | Dall'arteria omerale | Dall'arteria radiale | Dall'arteria femorale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1056 | Nei criteri generali di terapia delle infezioni chirurgiche rientra: | tutte le altre risposte sono corrette | l'idratazione del paziente | il trattamento locale | il trattamento antibiotico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|---------------------------|
| 1057 | Il THF è : | un ormone timico | un ormone ipofisario | un ormone tiroideo | un autoanticorpo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1058 | Da cosa è causata la rinite allergica: | pollini | polveri inorganiche | polipi nasali | fumo di tabacco | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1059 | Indicare quale delle seguenti affermazioni riguardo l'asma professionale è esatta: | tutte le altre risposte sono corrette | è legata all'esposizione a polveri areodisperse, vapori o fumi | è legata all'azione di un agente specifico in grado di indurre broncospasma in soggetti sensibilizzati | determina un incremento persistente della reattività bronchiale aspecifica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1060 | La toracentesi può essere: | tutte le altre risposte sono corrette | evacuativa | diagnostica | terapeutica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1061 | La gangrena gassosa è una forma di necrosi associata a: | infezione da Clostridi | infezione da miceti | enfisema | tubercolosi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1062 | Quale tra le caratteristiche di seguito citate non viene usata per descrivere il polso? | Mobilità | Frequenza | Qualità | Ritmo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1063 | La trombosi è causata da: | edema | aumentata coagulazione del sangue | stasi della circolazione | alterazione endoteliale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1064 | Le cause di morte più frequenti sono: | malattie cardiorespiratorie | malattie infettive | traumatismi | malattie dell'apparato respiratorio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1065 | TNM significa: | tumore, linfonodi, metastasi | tumore non metastatizzato | tumore, neoplasia, metastasi | tessuto neoplastico e metastasi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1066 | Le seguenti sono tutte vie di diffusione delle metastasi, tranne una. Quale? | Via transcutanea | Via linfatica | Via ematica | Via canalicolare | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1067 | Il polyoma virus, agente responsabile di varie forme tumorali, è stato individuato: | nel topo | nel cane | nel gatto | nella scimmia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1068 | Dove compaiono, di solito, le chiazze cutanee della morfea? | Tutte le altre risposte sono corrette | Sul tronco | Sul collo | Su mani e piedi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1069 | In caso di dolore addominale, oltre all'esame del sangue o agli esami radiografici, quali altre indagini si possono effettuare? | Tutte le altre risposte sono corrette | Gastroscoopia | Laparoscopia | Colonscopia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1070 | Quali sono le alterazioni qualitative della diuresi? | Tutte le altre risposte sono corrette | Ematuria | Emoglobinuria | Piuria | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1071 | Il paziente in NPT richiede un frequente monitoraggio di: | tutte le altre risposte sono corrette | glicemia | emocromo/elettroliti | piastrine ed enzimi sierici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1072 | Quale patologia, tra le seguenti, può generare granulomi? | Tubercolosi | Malaria | Echinococcosi | Diabete | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1073 | L'allergene è : | un gene responsabile di manifestazioni allergiche | una proteina prodotta da mastociti di soggetti allergici | una molecola dotata di tossicità intrinseca | una molecola in grado di innescare una reazione immunopatogena IgE mediata | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1074 | La cariolisi è definibile come: | processo di digestione della cromatina | processo di sintesi della membrana nucleare | processo di riproduzione cellulare | processo di trascrizione del DNA | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1075 | Quale tra queste condizioni non comporta un aumento della temperatura corporea? | L'ipotiroidismo | Un abnorme sforzo muscolare | Una prolungata esposizione al sole | Una condizione di sopraggiunta ipertermia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1076 | Un granuloma può essere l'effetto di: | un'inflammatione dovuta alla presenza di un corpo estraneo all'interno dell'organismo | una lesione cutanea lacero-contusa | un'infezione da rinovirus | un'infezione malarica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1077 | Calore, dolore, arrossamento, gonfiore e perdita di una funzione sono i reperti semendogici tipici di: | inflammatione | febbre | colpo di calore | ipertensione | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1078 | Un'alterazione citoscheletrica durante lo sviluppo intrauterino può causare: | situs inversus viscerum | sindrome di Down | sindrome di Asperger | sindrome di Ménière | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1079 | Qual è una delle complicanze più frequenti del reflusso gastroesofageo? | L'insorgere di esofagite | La presenza di ematuria | Un dolore persistente nella fossa iliaca destra | L'insorgere di fenomeni febbrili | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1080 | Tra le seguenti, una non può essere considerata una complicanza del diabete mellito. Quale? | Insufficienza respiratoria | Neuropatia centrale | Neuropatia periferica | Nefropatia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1081 | L'insulinoma può implicare l'insorgenza di: | crisi ipoglicemiche | emorroidi | crisi ipertensive | ulcera peptica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1082 | La ipercolesterolemia familiare implica spesso un aumento dei livelli plasmatici di colesterolo. Tra gli esiti si pu apprezzare: | aterosclerosi | arteriosclerosi | diabete mellito | diabete insipido | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|---|---|---|--|---------------------------|
| 1083 | Se non trattata precocemente, una condizione di ipotiroidismo nel neonato pu determinare l'insorgenza di: | ritardo mentale grave | diabete mellito | ritardo mentale lieve | infezioni sporadiche | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1084 | Tra le patologie metaboliche, la gotta è generata da: | eccesso di acido urico | eccesso di lipidi | deficit di colesterolo | eccesso di glucosio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1085 | Quando si manifesta l'angoscia per l'estraneo? | 7-8 mesi | 2-3 anni | 5-6 anni | 10-11 anni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1086 | In quale delle seguenti patologie endocrinologiche infantili è presente insufficienza mentale? | Ipotiroidismo | Ipertiroidismo | Diabete mellito | Ipersurrenalismo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1087 | In quale delle seguenti malattie può verificarsi il fenomeno astasia/abasia? | Nevrosi isterica | Nevrosi ossessiva | Schizofrenia | Insufficienza mentale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1088 | La triade di Charcot (nistagmo, tremore intenzionale, parola scandita) si riscontra in: | sclerosi multipla | sindrome di Louis-Bar | malattia di Bourneville | parkinsonismo giovanile | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1089 | Le reazioni di tipo ossessivo dell'anziano nascondono per lo più da: | stati depressivi | metastasi cerebrali | una personalità psicopatica esplosiva | un viraggio maniacale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1090 | A quale dei seguenti messaggi corrisponde la disconferma? | Tu non esisti | Ti rifiuto | Condivido quello che dici | Sbagli | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1091 | La malattia organica con cui è più importante porre la diagnosi differenziale rispetto all'anoressia mentale è : | il morbo di Simmonds | la tubercolosi | l'ipertiroidismo | la colite ulcerosa | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1092 | La vicarianza delle attitudini nelle persone anziane è : | supplire ai deficit dovuti all'età utilizzando e potenziando altre funzioni e fattori | mutare, in età avanzata, i propri interessi nelle attività ludiche | desiderare, a una certa età, il cambiamento negli orari di sonno-veglia | la tendenza, nella senescenza, ad essere meno efficienti a metà giornata | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1093 | La prognosi dell'anoressia mentale: | non può essere ritenuta decisamente sfavorevole, grazie anche agli attuali sussidi psicoterapeutici | è riservata o infausta per la tendenza all'exitus per inanizione | dipende dalla guarigione della lesione neurologica che ne è la causa | è favorevole se si instaura un intervento psicoterapeutico che i pazienti mostrano di cercare e di gradire | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1094 | L'empatia è : | il riprodursi in noi di uno stato affettivo simile a quello di un altro | sinonimo di simpatia | la mancanza di risonanze affettive | la risonanza affettiva tipica degli isterici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1095 | La definizione più corretta di tic : | un movimento involontario e ricorrente non ritmico | un movimento coreiforme | un movimento volontario | un movimento mioclonico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1096 | La fobia ossessiva si intende riferita a: | qualsiasi tipo di oggetti e situazioni | oggetti esclusivamente inanimati | oggetti esclusivamente animati | contenuti ideativi a carattere sessuale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1097 | La schizofrenia ebfrenica è caratterizzata da: | marcata fatuità | depressione dell'umore | ruminazione su tematiche esistenziali | delirio lucido ben sistematizzato | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1098 | Le allucinazioni nella schizofrenia sono prevalentemente: | uditiv e visive | tattili | cenestesiche | visive | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1099 | Quali sono le disfunzioni sessuali maschili più frequenti nella pratica clinica? | Impotenzia coeundi secondaria; eiaculazione precoce | Impotenza assoluta; incapacità eiaculatoria | Impotenza relativa; eiaculazione precoce | Impotenza relativa; mancanza di desiderio sessuale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1100 | Che cos'è lo stress? | Una risposta aspecifica dell'organismo a una qualsiasi richiesta esterna | Una risposta specifica dell'organismo a qualsiasi richiesta effettuata su di esso | Un complesso stimolo-risposta a significato patogeno | L'insieme delle condizioni esistenziali negative che possono condurre alla malattia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1101 | Le psicosi croniche degli epilettici sono: | di tipo paranoicale o schizofrenico | di tipo parafrenico | di tipo maniacale | psicosi puerperali | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1102 | Com'è lo stato di coscienza durante un attacco isterico? | Crepuscolare | Confusionale | Oniroide | Assente | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1103 | La Psicologia è una scienza che studia il comportamento inteso come: | espressione della personalità | espressione della maturità | espressione dei condizionamenti ambientali | espressione di patologie | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1104 | Quale tra i seguenti costituisce un metodo d'indagine della Psicologia? | Metodo sperimentale | Metodo razionale | Metodo ipotetico-deduttivo | Metodo intuitivo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1105 | Cosa si intende per pensiero divergente? | La capacità di fornire risposte diverse a un unico problema | La capacità di fornire un'unica soluzione, quella esatta, a un determinato problema | La capacità di porre problemi | Lo spirito critico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1106 | Per condizionamento operante si intende un comportamento: | attivo | passivo | punitivo | patologico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1107 | Qual è il nome del pediatra e terapeuta per l'infanzia che ha parlato di spazio transizionale? | Donald Winnicott | René Spitz | Jean Piaget | Frederic Skinner | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1108 | Che cosa sono le discinesie? | Paralisi cerebrali infantili | Nevrosi | Disturbi dell'apprendimento | Disturbi della personalità | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|---------------------------|
| 1109 | Quale fra i seguenti non è un disturbo della percezione? | L'afasia | L'agnosia | Le allucinazioni | Le illusioni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1110 | La paropressia è tipica: | degli epilettici | dei non vedenti | dei non udenti | dei paraplegici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1111 | L'afasia può essere: | ricettiva | cognitiva | psicologica | proprioceettiva | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1112 | L'afasia può essere causata da: | lesioni della corteccia cerebrale | schizofrenia | anomalie cromosomiche | paresi facciali | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1113 | Il farmaco elettivamente impiegato nel piccolo male è : | valproato sodico | idantoïnico | barbiturico | benzodiazepinico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1114 | I barbiturici possono determinare: | induzione enzimatica epatica | induzione enzimatica cerebrale | alterazioni oculari | crisi neurodislettiche | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1115 | L'epilessia è: | un disturbo delle funzioni del sistema nervoso centrale | una forma di nevrosi | una caratteropatìa | una formazione tumorale localizzata nell'encefalo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1116 | La dismorfofobia è : | la paura della deformazione corporea | la paura di cadere | la paura della solitudine | la paura dei fantasmi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1117 | L'angoscia di castrazione si verifica nella fase di sviluppo: | edipica | di latenza | orale | puberale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1118 | Il pavor nocturnus è : | una manifestazione d'ansia | una malattia metabolica | una manifestazione allucinatoria | la paura dei volatili | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1119 | L'insorgenza del piccolo male si verifica più frequentemente: | nella II e III infanzia | nell'età puberale | nell'adolescenza | nel I anno di vita | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1120 | Il piccolo male è caratterizzato da: | assenze | spasmi | crisi toniche generalizzate | crisi motorie parziali | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1121 | Nella fobia scolare sono presenti più frequentemente: | conati di vomito | tachicardia | febbre | blefarospasmo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1122 | Cosa si intende con il termine prassia? | Capacità di compiere un atto finalizzato | Capacità di compiere movimenti | Capacità di riconoscere l'attività fisica | Disturbo dell'attività motoria | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1123 | Cosa si intende con il termine gnosià? | Capacità di riconoscere il significato della realtà | Disturbo sensoriale | Disturbo psicosomatico | Capacità di riconoscere volti noti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1124 | Che tipo di personalità ha un soggetto psicopatico? | Antisociale | Depressa e malinconica | Aggressiva | Fobico-ossessiva | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1125 | L'ansia libera fluttuante è : | l'ansia senza oggetto | l'ansia che cambia oggetto | l'ansia accompagnata da idee deliranti | l'ansia con oscillazioni di intensità | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1126 | L'evoluzione delle demenze microinfartuali è : | lenta, a pousses | rapida, con aggravamenti preannunciati da momenti di benessere | lenta, lineare | rapida, lineare | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1127 | Perché nella teoria dei sistemi si parla di modello di causalità circolare? | Perché si dà importanza alle connessioni reciproche tra le parti di un sistema e all'influenza tra di loro | Perché non si ritiene importante la ricerca delle cause | Perché si pensa che un sistema sia meglio rappresentabile da un cerchio che da una linea | Perché si valorizzano i rapporti causa-effetto nella spiegazione dei fenomeni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1128 | Che cos'è, nella comunicazione, il livello di relazione? | E' il complesso di messaggi che informano sul modo in cui deve essere ricevuta una notizia e quindi definiscono la relazione tra i comunicanti | Corrisponde alla comunicazione gestuale | E' tutto ciò che, riferendosi alla relazione, è sempre in primo piano in ogni comunicazione | Si riferisce ai discorsi i cui contenuti riguardano la relazione tra i comunicanti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1129 | L'apatia è : | la mancanza di risonanze sentimentali | l'enfaticizzazione dei sentimenti | la mancanza di volontà | la perdita del linguaggio interiore | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1130 | Secondo il Codice Civile italiano, devono essere interdetti il maggiore di età o il minore emancipato quando: | si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi | si trovano in condizione di eccezionale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi | si trovano in condizioni di infermità di mente tali da ledere gli interessi dei propri familiari | si trovano in condizione di saltuaria infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1131 | Il soggetto confuso è frequentemente: | perplesso | depresso | scarsamente ansioso | sicuro di sé | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1132 | Quale dei seguenti sintomi è assente nella sindrome presuicidaria? | Fuga delle idee | Restringimento del campo di pensiero | Isolamento | Idea di morte | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1133 | Secondo la teoria organismica di Goldstein, l'organismo : | ben più della somma delle parti che lo costituiscono | molto meno delle sue parti costitutive | costituito in parti uguali da psiche e soma | costituito semplicemente dalla somma delle sue parti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---------------------------|
| 1134 | Cos'è lo schema corporeo? | La rappresentazione mentale del proprio corpo | La formazione della struttura ossea | La raggiunta maturazione dell'intero apparato scheletrico | La rappresentazione grafica del proprio corpo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1135 | La dislessia consiste nell'incapacità di: | imparare a leggere | apprendere il disegno | apprendere il linguaggio | imparare a scrivere | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1136 | Quale tra i seguenti non è un sintomo della discalculia? | Difficoltà nel percepire il materiale concreto | Difficoltà di ragionamento astratto | Timore di perdere il contatto con il reale | Difficoltà di memoria uditiva | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1137 | La desensibilizzazione sistematica è una terapia: | comportamentale | di riabilitazione neuromotoria | farmacologica | disintossicante | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1138 | L'agorafobia è : | la paura degli spazi aperti | la paura degli aerei | la paura della morte | la paura delle armi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1139 | La balbuzie può essere: | tutte le altre risposte sono corrette | reattiva | tonica | clonica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1140 | Il testo di Goodenough prevede il disegno di: | un omino | una casa | una famiglia | un albero | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1141 | Il concetto di holding (accudimento) è stato introdotto da: | Jung | Winnicott | Klain | Freud | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1142 | La presbifrenia è : | una demenza senile caratterizzata da confabulazioni | una demenza presenile caratterizzata da aspetto veccheggianti | una forma di oligofrenia | una forma di eccitamento maniacale senile | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1143 | Tra i fattori ereditari che influenzano lo sviluppo psichico di un individuo non rientra: | l'influenza della famiglia | l'attività motoria | la costituzione somatica | il ritmo di sviluppo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1144 | La possibilità di compiere l'atto sessuale solo con la mediazione di un oggetto prende il nome di: | feticismo | onanismo | sadismo | anorgasmia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1145 | Il sonno REM nella depressione è per lo più: | diminuisce | si prolunga | aumenta | rimane invariato | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1146 | Cos'è la dominanza laterale? | La preminenza di organi o di arti situati in una determinata parte (destra o sinistra) del corpo | La maggiore specializzazione dell'emisfero destro | Un disturbo neurologico | Un difetto dell'apparato scheletrico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1147 | La legge 833/1978 vieta: | i manicomi | gli accertamenti sanitari obbligatori per malattia mentale | i servizi territoriali di psichiatria | i reparti psichiatrici in ospedale generale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1148 | L'elemento psichico dello psichismo ossessivo è : | il dubbio | il delirio di rovina | il delirio persecutorio | l'euforia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1149 | Quale dei seguenti termini non si riferisce a meccanismi di difesa? | Riflessione | Identificazione | Regressione | Rimozione | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1150 | L'ipocondria è: | può coesistere con una malattia somatica reale | alla lunga determina una malattia somatica | non può mai coesistere con una malattia somatica reale | può coesistere solo con una malattia somatica reale, ma diversa da quella di cui il paziente si preoccupa | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1151 | L'allucinosi è: | una percezione senza oggetto | una diplopia | un'allucinazione elementare | uno stato allucinatorio cronico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1152 | Il delirio paranoicale si distingue dal delirio paranoideo, oltre che per altri caratteri, anche per: | l'assenza di disturbi psicosensoriali | la tendenza alla confabulazione | segni di deficit intellettivo | l'assurdità del tema | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1153 | In cosa consiste il trattamento psicologico dei capricci infantili? | Nell'evitare di prestare attenzione ai bambini che attuano comportamenti disadattivi per evitare di rinforzarli | Nel rispondere prontamente a ogni richiesta del bambino | Nel punire sistematicamente i comportamenti disadattivi | Nel proteggere il bambino dalle difficoltà e dalle frustrazioni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1154 | Quale dei seguenti non costituisce un trattamento per la cura della bulimia? | Riposo e antibiotici | Psicoterapia a impronta cognitiva | Impiego di farmaci antidepressivi | Psicoterapia a impronta psicoanalitica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1155 | La demenza è un disturbo che si manifesta più frequentemente durante: | età senile | adolescenza | età evolutiva | infanzia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1156 | L'uso protratto di anfetamine può comportare: | la slatentizzazione di una psicosi | crisi oculogire | il sorgere di una psicosi | la slatentizzazione di una nevrosi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1157 | La pseudoinsufficienza mentale può essere determinata da: | tutte le altre risposte sono corrette | disturbi neuropsicologici | disturbi emotivi | deficit sensoriali | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1158 | Dov' è situato il centro del linguaggio di Wernicke? | Lobulo parietale inferiore dell'emisfero sinistro | Prima e seconda circonvoluzione temporale destra | Seconda e terza circonvoluzione frontale destra | Area calcarina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1159 | La sindrome di Down può essere legata a: | tutte le altre risposte sono corrette | trisomia 21 in mosaico | trisomia 21 da traslocazione G/G | trisomia 21 libera | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1160 | I disturbi somatoformi comprendono tutti i seguenti, tranne: | disturbo di derealizzazione | ipocondria | disturbo da dolore somatoforme | disturbo da conversione | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|--|---|---|--|---------------------------|
| 1161 | La claustrofobia è : | la paura dei luoghi chiusi | la paura degli animali | la paura degli estranei | la paura del contagio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1162 | L'acrofobia è : | la paura delle altezze | la paura dei temporali | la paura dei terremoti | la paura delle dita | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1163 | In quale condizione si può verificare mutismo elettivo? | Nevrosi | Paralisi | Sordità | Deficit intellettivo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1164 | La formazione reattiva è : | un meccanismo di difesa | un tipo di nevrosi | un tipo di psicosi | un sintomo depressivo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1165 | Le convulsioni febbrili si differenziano da quelle epilettiche per: | tutte le altre risposte sono corrette | esame obiettivo negativo | anamnesi negativa | durata | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1166 | A quale età tende a strutturarsi la nevrosi ossessiva? | Oltre i 10 anni | 2-4 anni | 5-7 anni | 6-8 anni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1167 | L'ereutofobia è la paura: | di arrossire | degli animali | del colore rosso | delle malattie infettive | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1168 | Da chi fu ideata la prima scala di sviluppo intellettuale? | Binet-Simon | Duss | Freud | Jung | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1169 | La sublimazione consiste nel: | trasformare gli impulsi in attività socialmente approvate | rimuovere gli impulsi libidici | trasformare gli impulsi non accettati nel loro opposto | trovare giustificazioni per il proprio comportamento | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1170 | La depressione in età evolutiva è prevalentemente: | reattiva | endogena | strutturata | primaria | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1171 | La sindrome di Gilles de la Tourette è caratterizzata da: | tic e coprolalia | autismo e stereotipie | epilessia e manie | riduzione del Q.I. | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1172 | L'ipsaritmia è : | un'alterazione dell'attività elettrica cerebrale | un'alterazione del sonno | un'alterazione del controllo sfinterico | un'alterazione ormonale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1173 | La blesit può essere: | tutte le altre risposte sono corrette | sintomo di immaturità nell'articolazione fonetica | sintomo di deficit di sviluppo cognitivo | sintomo di paralisi cerebrale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1174 | L'anoressia mentale è : | tutte le altre risposte sono corrette | più frequente nel sesso femminile | più frequente nell'adolescenza | a volte associata ad amenorrea | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1175 | L'autismo è sintomo di: | psicosi | isteria | fobie | stress da guida | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1176 | E' vero che uno stato di malessere organico influisce sulla psiche? | Sì, ma soltanto quando l'individuo presenta anche disturbi psichici | Sì, sempre | No, in alcun caso | Raramente | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1177 | In presenza di encopresi psicogena la diagnosi differenziale va posta con: | tutte le altre risposte sono corrette | insufficienza mentale grave | colite ulcerosa | malattia di Hirschprung | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1178 | Le reazioni isteriformi dell'anziano sono spesso dovute a: | malattie organiche | cambiamenti climatici repentini | soggiorni in alta montagna | viaggi in aereo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1179 | Il disturbo di evitamento di personalità deve essere differenziato da: | tutte le altre risposte sono corrette | evitamento nel disturbo di panico con agorafobia | bisogno di assicurazione nel disturbo dipendente di personalità | isolamento sociale nel disturbo schizoide di personalità | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1180 | Il flooding (inondamento) è una tecnica psicoterapeutica: | diretta a bloccare il meccanismo di mantenimento delle fobie rappresentato dal comportamento di evitamento | atta a stimolare il pensiero creativo | mirante a indurre il paziente depresso a fronteggiare situazioni temute | mirante al superamento delle difficoltà interpersonali del paziente fobico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1181 | Chi abbia un atteggiamento di continua riflessione sullo stato somatico, alla ricerca di segni di malattia, si definisce: | ipocondriaco | maniaco | psicolabile | isterico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1182 | L'egocentrismo patologico è una manifestazione psichica tipica di: | psicopatie | intossicazione da psicofarmaci | comportamento criminale | schizofrenia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1183 | Le cenestopatie sono: | sensazioni corporee sgradevoli, imprecise e migranti | disturbi tipo astasia/abasia | allucinazioni olfattive | cefalee muscolo-tensive | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1184 | L'amnesia retrograda è un disturbo della memoria caratterizzato principalmente da: | disturbo della rievocazione degli engrammi | disturbo della fissazione degli engrammi | disturbo della localizzazione spaziotemporale del ricordo | aprassia costruttiva | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1185 | L'amnesia sistematizzata è una lacuna di ricordi che si riferisce: | a un tema fondamentale e ai fatti a questo collegati | a un determinato periodo | a nozioni di argomenti vari | alla possibilità di fare calcoli | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1186 | La nozione di normalità è sinonimo di: | benessere psichico | benessere fisico | salute fisica e mentale | assenza di malattie | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1187 | L'autismo è una psicosi che si presenta prevalentemente: | nella prima infanzia | in età adulta | nell'adolescenza | al momento della nascita | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|---|--|--|--|---------------------------|
| 1188 | Quale dei seguenti sintomi non caratterizza la sindrome di Down? | Macrocefalia | Insufficienza mentale | Brachicefalia | Epicanto | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1189 | L'intervento di Jatene implica: | la correzione della trasposizione dei grossi vasi | la chiusura di un difetto interatriale | la rimozione di un difetto interatriale | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1190 | In presenza di perforazione intestinale, l'esame radiologico evidenzia: | doppio binario | presenza di addensamento a livello gastrico | presenza di aria al di sotto del diaframma | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1191 | La lussazione traumatica è frequente a livello della: | spalla | mano | anca | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1192 | La gastrectomia totale consiste nell'asportazione di un intero organo. Quale? | Stomaco | Milza | Intestino | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1193 | Indicare quale tra le seguenti affermazioni è falsa: | il pneumotorace colpisce solo l'età adulta | il pneumotorace può essere «a valvola» | il pneumotorace può essere «spontaneo» | il pneumotorace può apparire in alcuni casi «aperto» | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1194 | Trauma toraco-addominale sinistro. Indicare la complicanza: | rottura della milza | fratture multiple | pneumotorace | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1195 | Quale, tra le seguenti, può essere causa di addome acuto? | Diverticolite | Morbo di Crohn | Frattura di un arto | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1196 | L'intervento di Nissen è : | una funduplicatio | una gastrectomia subtotale | l'asportazione dello stomaco | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1197 | Stenosi ipertrofica del piloro. Qual è il trattamento chirurgico indicato? | Piloromiotomia extramucosa | Gastrectomia subtotale | Asportazione dello stomaco | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1198 | La frattura di Poteau-Colles interessa: | metafisi distale del radio | fibula e tibia | omero | polso e avambraccio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1199 | Copioso sanguinamento della mano. Indicare a che livello deve essere posto il laccio emostatico: | al braccio | al polso | al gomito | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1200 | Indicare la localizzazione dei diverticoli di Zenker: | esofago | stomaco | reni | retto | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1201 | Acalasia. Indicare il trattamento utile: | miotomia extramucosa secondo Heller | terapia farmacologica | endoscopica | radioterapia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1202 | La colpotomia è un intervento chirurgico che consiste nel praticare un'incisione: | nella vagina per svuotare un ascesso localizzato nel piccolo bacino | per il drenaggio di un ematoma | in cui parte del colon viene estroflessa | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1203 | Indicare quale tra le seguenti opzioni si riferisce ai fattori di rischio per neoplasie a livello gastrico: | alimentazione sbagliata | disfunzioni epatiche | nessuna delle altre risposte è corretta | età maggiore ai 30 anni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1204 | Il trattamento chirurgico della tiroide implica il rischio di complicanze. Indicare quale tra i seguenti. | Lesione ricorrentiale | Lesione vascolare | Nessuna delle altre risposte è corretta | Infezione sistemica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1205 | In casi di atresia dell'esofago con presenza di fistola tracheoesofagea superiore, le caratteristiche morfologiche dell'addome lo mostrano: | incavato | disteso | nessuna delle altre risposte è corretta | dilatato | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1206 | Il dolore della pancreatite si segnala per: | l'irradiazione a «barra» | l'irradiazione della spalla destra | nessuna delle altre risposte è corretta | l'andamento colico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1207 | Quale tra questi non è un sintomo caratteristico del pneumotorace? | Febbre | Alterazioni respiratorie | Alterazioni circolatorie | Dispnea | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1208 | Pneumotorace a valvola. Indicare la prima manovra da eseguire: | detendere il torace | misurare la pressione arteriosa | effettuare una lastra | TC del torace | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1209 | Qual è l'eziopatogenesi della sindrome di Ciuffini-Pancoast? | La presenza di formazioni neoplastiche nelle radici del plesso branchiale | Una neoplasia alla base polmonare destra | Una neoplasia alla gola | L'insorgenza di fratture costali | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1210 | Il callo osseo è definibile come: | l'esito cicatriziale di una frattura | una neoplasia benigna allo scheletro | nessuna delle altre risposte è corretta | una lesione ossea | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1211 | Indicare quale zona può essere lesa accidentalmente nella chirurgia della tiroide: | il nervo laringeo superiore | il nervo vago | nessuna delle altre risposte è corretta | l'arteria tiroidea | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1212 | Il segno di Blumberg indica l'infiammazione: | peritoneale | laringea | nessuna delle altre risposte è corretta | della tiroide | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1213 | Cos'è l'apparecchio di Forlanini? | Un macchinario utilizzato per provocare il pneumotorace | Un macchinario per misurare la pressione arteriosa | Nessuna delle altre risposte è corretta | Un macchinario emoanalizzatore | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1214 | Il filtro di Mobin-Uddin è utilizzabile per: | scongiorare rischi di embolia polmonare | evitare forme di dialisi peritoneale | nessuna delle altre risposte è corretta | ridurre la pressione renale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|---|---|--|--|---------------------------|
| 1215 | In un caso di neoplasia polmonare di modeste dimensioni, l'intervento indicato è : | lobectomia | nessuna delle altre risposte è corretta | pneumectomia | segmentectomia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1216 | Tracheotomia. L'incisione della trachea deve essere eseguita: | a livello della II-III cartilagine | nessuna delle altre risposte è corretta | a livello della V-VI cartilagine | a livello della VI-VII cartilagine | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1217 | L'ernia di Morgagni è definibile come: | ernia diaframmatica anteriore | nessuna delle altre risposte è corretta | ernia del muschio | ernia della linea alba | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1218 | Carcinoma della testa pancreatica. Indicare qual è l'intervento chirurgico da praticare: | duodenocefalopancreasectomia | nessuna delle altre risposte è corretta | billroth I | billroth II | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1219 | Carcinoma della prostata. Qual è la terapia indicata? | Ormonoterapia | Nessuna delle altre risposte è corretta | Emiprostectomia | Tumorectomia per via endoscopica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1220 | In quali casi il morbo di Crohn necessita di terapia chirurgica? | Stenosi intestinale | Nessuno | Presenza di fistole | Malattia perianale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1221 | Indicare quale, tra queste, è una delle possibili cause di rettorragia: | rettocolite ulcerosa | ulcera duodenale | cancro dell'esofago | cancro del colon-retto | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1222 | La localizzazione più frequente del melanoma, dopo cute e occhio, è: | ano | sistema nervoso centrale | pancreas | sistema linfatico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1223 | La formazione di un volvolo è favorita da: | briglie aderenziali | nessuna delle altre risposte è corretta | occlusione intestinale | ernia iatale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1224 | Quali valori può assumere il grado di differenziazione di un tumore (G)? | 4 | 7 | 1 | 3 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1225 | In caso di invaginazione colocolica si pu intervenire risolutivamente attraverso una delle seguenti manovre: | tutte le altre risposte sono corrette | può risolversi spontaneamente | utilizzando un clisma opaco | effettuando l'evaginazione manuale a cielo aperto | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1226 | Calcolosi della colecisti: indicare le modalità di intervento. | Colecistectomia laparoscopica | Radioterapia | Terapia farmacologica | Terapia con ultrasuoni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1227 | Atresia esofagea. Indicare quante tipologie sono possibili. | 5 | 9 | 7 | 2 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1228 | Quali tra i seguenti tumori del fegato è più frequente in età pediatrica? | Epatoblastoma | Sarcoma | Mieloma | Emangiosarcoma | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1229 | La cifosi è definibile come: | aumento della fisiologica curvatura dorsale del rachide | spostamento di una vertebra rispetto a quella sottostante | deficit permanente laterale del rachide | curvatura delle vertebre lungo l'asse longitudinale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1230 | Atresia esofagea con fistola superiore. Indicare il segno clinico: | nessuna delle altre risposte è corretta | distensione addominale | addome acuto | addome a tavola | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1231 | Il segno di Murphy indica: | calcolosi della colecisti | patologie a carico dei reni | ulcera duodenale | rischio di neoplasie gastriche | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1232 | L'ileo paralitico può insorgere a seguito di: | tutte le altre risposte sono corrette | peritonite acuta | manipolazioni operatorie | infezioni acute di organi extra-addominali | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1233 | Atresia delle vie biliari. Indicare il sintomo in età precoce: | nessuna delle altre risposte è corretta | ittero con bilirubina non coniugata | ittero con bilirubina coniugata | ittero a prevalente bilirubina diretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1234 | Indicare quali tra i seguenti elementi possono generare ulcere cutanee: | tutte le altre risposte sono corrette | neoplastici | metabolici | infettivi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1235 | Quale tra i seguenti accertamenti appare inutile in caso di calcolosi renale da acido urico? | Rx diretta | Urografia | Scintigrafia renale | TC | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1236 | Megacolon. Indicare la terapia efficace: | resezione del segmento a valle della dilatazione | ileostomia | ileano-anastomosi | colectomia totale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1237 | Quanti sono i segmenti epatici secondo Couinaud? | 8 | 4 | 5 | 7 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1238 | Quali possono essere le complicanze post-operatorie immediate compromettenti la funzione respiratoria? | Ostruzione delle vie aeree | Infezione delle vie urinarie | Infezione della ferita chirurgica | Occlusione intestinale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1239 | La preparazione fisica all'intervento chirurgico si effettua su base: | tutte le altre risposte sono corrette | alimentare | intestinale | vescicale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1240 | Si definisce ormone una sostanza in grado di: | entrare in circolo e determinare «effetti» su cellule bersaglio | essere sintetizzata da una cellula e agire sulla stessa cellula | entrare nel circolo linfatico e determinare «effetti» su cellule bersaglio | stimolare il sistema immunitario verso cellule bersaglio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1241 | La disfunzione erettile può essere associata a: | diabete | uretriti | prostatite acuta | neoplasia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1242 | Il primo segno di sviluppo puberale nella donna è : | la comparsa di sviluppo mammario | la perdita di peso | il menarca | il rigonfiamento dell'addome | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|---|---|--|--|---------------------------|
| 1243 | Il metabolismo basale è influenzato: | dagli ormoni tiroidei | dal progesterone | dal cortisolo | dall'estradiolo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1244 | Gli ormoni steroidei: | vengono rapidamente sintetizzati da precursori e secreti nel torrente circolatorio | sono conservati come pro ormoni nelle cellule bersaglio | vengono sintetizzati e agiscono nelle cellule secettrici | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1245 | All'aumentare del glucosio plasmatico, aumenta la sintesi di: | insulina | cortisolo | GM-CSF | eritropoietina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1246 | La principale complicanza nell'ipercolesterolemia familiare è : | la cardiopatia ischemica | l'angina pectoris | l'ictus cerebri | l'aneurisma polmonare | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1247 | Il fattore che regola la spermatogenesi è : | l'FSH | il calcitriolo | nessuna delle altre risposte è corretta | l'arginina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1248 | Di quali delle seguenti condizioni è responsabile l'insulinoma? | Ipoglicemia spontanea | Ipoglicemia postprandiale | Intolleranza al glucosio | Iperglicemia e alcalosi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1249 | Come viene definita una secrezione paracrina? | La secrezione di ormoni che agiscono su cellule vicine | Nessuna delle altre risposte è corretta | La secrezione di ormoni che agiscono a distanza | La secrezione di ormoni che si riversano nel circolo sanguigno | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1250 | Tra i seguenti, quale aminoacido è essenziale? | Leucina | Glutamina | Arginina | Prolina | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1251 | Durante la menopausa i sintomi principali sono: | vampate di calore e sudorazione notturna | cefalea a grappolo | sonnolenza e irritabilità | perdite di memoria | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1252 | Si possono mettere in relazione l'aumento del peso corporeo e l'aumento della pressione arteriosa? | Sì, ed è significativo nei principali studi epidemiologici | Non sempre, dipende dal peso | No, in nessun caso | Sì, ma non è significativo nei principali studi epidemiologici | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1253 | Quale parametro si utilizza nella pratica clinica per effettuare una diagnosi di obesità? | L'indice di massa corporea (BMI) | La tabella dei rischi cardiovascolari | la formula di Broca | Le tabelle del peso ideale sulla base dell'altezza | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1254 | In medicina il colloide è definito come: | la formula di immagazzinamento della tireoglobulina nel lume del follicolo tiroideo | la secrezione delle cellule parafollicolari | l'essudato delle arterie del collo | la forma di immagazzinamento dello iodio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1255 | La lesione da pressione è : | una lesione cutanea protratta nel tempo non tendente alla guarigione | una lesione cutanea che guarisce spontaneamente | un'ulcera del piede diabetico | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1256 | Nel paziente anziano si osserva prevalentemente: | artrosi | sindrome da immunoricostruzione | sindrome mieloproliferativa | ittero da sindrome di Dubin-Johnson | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1257 | Per evitare la formazione di una lesione da pressione sacrale, quale posizione deve evitare il paziente? | Supina | Laterale sinistra 90° | Nessuna delle altre risposte è corretta | In piedi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1258 | Quale sostanza viene utilizzata per ridurre il rischio di infezioni da anaerobi in caso di piaghe da decubito? | H2O2 | Penicillina | Alcool etilico | Soluzione di cloruro di sodio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1259 | La genesi di una lesione da pressione è rappresentata da: | infiammazione e distruzione dell'epidermide | necrosi progressiva | apoptosi delle cellule sottocutanee | riduzione del derma | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1260 | La lesione da pressione nell'anziano si forma prevalentemente nella zona: | sacrale | ascellare | malleolare | calcaneare | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1261 | Quale procedura è particolarmente utile adottare in caso di paziente anziano allettato? | Tutte le altre risposte sono corrette | La mobilizzazione | La fisioterapia | L'eliminazione degli sfregamenti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1262 | Per causare una lesione da pressione, quanta pressione deve essere esercitata? | Nessuna delle altre risposte è corretta | 17 mmHg | 36 mmHg | 43 mmHg | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1263 | L'indice di Norton serve per valutare: | il rischio di insorgenza di piaghe da decubito nel paziente anziano | lo stato di vigilanza di una persona anziana | la vitalità degli spermatozoi nell'uomo | la condizione di salute del neonato | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1264 | Quale strumento chirurgico viene utilizzato per pulire una lesione da pressione? | Tutte le altre risposte sono corrette | Pinze di Cocker | Bisturi | Forbici e pinze | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1265 | Quanto tempo passa tra l'ovulazione e la successiva mestruazione? | sempre 14 giorni | 12-14 giorni | 28 giorni | 14-28 giorni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1266 | Che cosa si intende per aborto interno? | L'aborto senza espulsione del feto | L'aborto con espulsione del feto | L'aborto con espulsione del feto nella cavità addominale | Tutte le altre risposte sono corrette | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1267 | Durante l'ovulazione, la temperatura vaginale è : | < 36.5°C | 37°C | > 37°C < 39°C | > 38°C | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1268 | Una rarissima sede per una gravidanza ectopica : | addominale | angolare | ampollare | non esiste una sede rara per le gravidanze ectopiche | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1269 | Nella donna adulta la misura della vagina è: | 6-8 cm | 10-15 cm | 18-22 cm | 24-26 cm | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|---|---|---|--|---------------------------|
| 1270 | La lochiazione viene definita come: | il processo fisiologico che si verifica dopo il parto consistente in perdite ematiche dall'utero che durano per V-VI settimane | una emorragia vaginale da lacerazione | lo stato di depressione successivo al parto | perdita di sangue preparto | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1271 | Cosa si intende per bregma? | La regione circostante la grande fontanella | La regione circostante la piccola fontanella | La regione laterale destra del feto | La regione laterale sinistra del feto | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1272 | In quale delle seguenti tipologie di parto si utilizza la manovra di Mauriceau-Smellie-Veit? | Nel parto podalico | Nel parto di bregma | Nel parto di spalla | Nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1273 | Quanto latte al giorno viene prodotto tra il IV e il V mese di puerperio? | 700-800 cc | 900-1000 cc | 1100-1300 cc | >1400 cc | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1274 | Quale dei seguenti non costituisce uno degli scopi per i quali è stato creato il servizio pubblico di assistenza alla famiglia e alla maternità? | Produzione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia in ordine alla procreazione responsabile | Tutela della salute fisica della donna | Tutela del prodotto del concepimento | Assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla paternità responsabile | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1275 | Nella XL settimana di gestazione la quantità di liquido amniotico è : | 800 cc | 1200 cc | 1700 cc | 300 cc | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1276 | In Italia, per legge, si può interrompere volontariamente la gravidanza entro: | 90 giorni | 150 giorni | 180 giorni | 30 giorni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1277 | Si parla di patologia del secondamento dopo quanto dal parto? | 30-60 minuti | 80-150 minuti | 24 ore | 10-20 minuti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1278 | Nell'oligoidramnios la quantità di liquido amniotico è di: | < 500 cc | 1200-1500 cc | < 2000 cc | 1000 cc | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1279 | Fino a quale settimana si parla ancora di embrione? | Fino alla VIII settimana | Fino alla X settimana | Fino alla XVI settimana | Fino alla VII settimana | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1280 | Quanto dura una gravidanza? | 40 settimane | 48 settimane | 30 settimane | 36 settimane | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1281 | Di solito quando avviene la perdita del tappo mucoso da parte della donna in gravidanza? | Al momento dell'inizio del travaglio | Al momento dell'espulsione della placenta | Al momento della prima visita ginecologica post partum | Al momento dell'espulsione del feto | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1282 | Qual è la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza? | L. 194/1978 | D.Lgs. 502/1992 | L. 40/2004 | L. 833/1978 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1283 | Il test di gravidanza su sangue ricerca quale dei seguenti parametri? | bHGC | T4 | LH | CEA | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1284 | Biologicamente i gemelli omozigoti sono: | gemelli nati da 1 ovulo e 1 spermatozoo | gemelli nati da 1 ovulo e 2 spermatozoi | gemelli sempre di sesso diverso | gemelli nati da 2 ovuli e 1 spermatozoo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1285 | Cosa viene definito in ginecologia con il termine secondamento? | Il distacco e l'espulsione della placenta | Il distacco della placenta | L'espulsione dell'eventuale secondo feto | Le prime contrazioni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1286 | Di solito al momento del parto la presentazione del feto è : | di vertice | supina | di faccia | podalica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1287 | Che cos' è l'Indice di Pearl? | Un indice statico di affidabilità di un metodo contraccettivo | Un indice dello stato di salute del neonato | Un indice statico di fertilità maschile | Un indice statico di fertilità femminile | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1288 | Quale delle seguenti opzioni identifica la spirale contraccettiva? | IUD | Pillola | SPC | Ogino-Knaus | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1289 | In media il ciclo mestruale dura: | 28 giorni | 32 giorni | 27 giorni | 25 giorni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1290 | Nel canale cervicale, gli spermatozoi possono sopravvivere per: | 24-72 ore | 4-5 giorni | 6-12 ore | 1-2 ore | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1291 | Dopo i primi novanta giorni in quale caso può essere consentita l'IVG? | Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, ovvero siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna | La legge non consente l'IVG dopo i primi novanta giorni | Solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna | Solo quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1292 | Il prelievo dei villi coriali va eseguito nella: | X-XI settimana di gravidanza | I-II settimana di gravidanza | III-V settimana di gravidanza | VII-IX settimana di gravidanza | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|---|---|--|---|---------------------------|
| 1293 | A che mese di gestazione va sospesa l'attività sessuale? | Nessuna delle altre risposte è corretta | IV | VI | VIII | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1294 | L'amenorrea può essere: | tutte le altre risposte sono corrette | uterina | ipotalmica | ipofisaria | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1295 | Il polidramnios si ha quando la quantità di liquido amniotico è : | 2000 cc | 300 cc | 900 cc | 1200 cc | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1296 | Quale tra i seguenti non è un organo genitale femminile esterno? | Vagina | Clitoride | Grandi labbra | Monte di Venere | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1297 | La montata latte ha luogo dopo alcuni giorni dal parto. Quanti? | 4-5 giorni | 1 giorno | 7-8 giorni | 2-3 giorni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1298 | Il risultato di un pap test, in base alla classificazione di Papanicolau è suddiviso in quante classi? | 5 classi | c'è una sola classe | 2 classi: positivo e negativo | 4 classi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1299 | Quale tra i seguenti non è considerato motivo legittimante la richiesta di IVG entro i primi 90 giorni? | Il superamento della soglia della giusta età biologica per la gravidanza | Quando la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporti un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna | Quando vi siano previsioni di anomalie o malformazioni del concepito | In presenza di particolari condizioni economiche, o sociali o familiari | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1300 | Indicare quando va calcolato l'indice di Apgar: | al 1° e al 5° minuto di vita | tra il 4° e l'8° minuto di vita | dopo 10 minuti dalla nascita | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1301 | A due anni di vita il peso fisiologico di un bambino dovrebbe attestarsi attorno a: | il triplo di quello alla nascita | il doppio di quello alla nascita | quattro volte quello alla nascita | sei volte quello alla nascita | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1302 | Indicare quale tra le seguenti patologie costituisce una pericolosa complicanza della varicella: | nevrasite | enterite | lesioni cutanee | cicatrici cutanee | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1303 | A quale età ha inizio la dentizione decidua? | 6-8 mesi | 12-14 mesi | 2 anno | 4-6 anni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1304 | Indicare quale tra le seguenti neoplasie risulta tra le più frequenti in età pediatrica: | leucemia e linfomi | linfoma di Hodgkin | sarcoma | melanoma | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1305 | Il riflesso di Moro indica: | un tipico «auto-abbraccio» del neonato | la capacità di rispondere a stimoli sonori | la capacità di rispondere a stimoli visivi | la capacità di rispondere al dolore | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1306 | Il CBCL (Child Behavior Checklist): | presenta scale di valutazione del comportamento psicopatologico infantile | presenta scale di valutazione del comportamento neurologico | presenta scale di valutazione dei disturbi cardiaci infantili | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1307 | Qual è il tumore solido più frequente in età pediatrica? | Neuroblastoma | Mieloma | Sarcoma | Lipoma | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1308 | Indicare la procedura corretta del massaggio cardiaco nel bambino: | mani sul torace, pollici sul III medio dello sterno | polso destro sul III inferiore dello sterno e polso sinistro sul dorso della mano destra | polso sinistro sul III inferiore dello sterno e polso destro sul dorso della mano destra | tutte le altre risposte sono corrette | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1309 | Le crisi convulsive durante la febbre sono dovute a: | deficit fisiologico di crescita sinaptica | epilessia precoce | autismo infantile | nessuna delle altre risposte è corretta | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1310 | Quale tra i seguenti fattori non è incluso nell'indice di Apgar? | Valutazione del nistagmo oculare | Frequenza del battito cardiaco | Riflesso laringeo | Colorito della pelle | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1311 | I disturbi delle capacità motorie nel bambino sono caratterizzati da: | complessiva mancanza di coordinazione motoria | deficit del sistema nervoso periferico | tutte le altre risposte sono corrette | coordinazione motoria inferiore in relazione all'età cronologica | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1312 | Il fabbisogno proteico del lattante si attesta attorno a: | 1.5-2 g/Kg/die | 5-6 g/Kg/die | 20-40 g/Kg/die | 0.51 g/Kg/die | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1313 | I denti decidui sono in numero di: | 20 | 24 | 30 | 18 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1314 | Il fabbisogno lipidico del lattante si attesta attorno a: | 4-6 g/Kg/die | 40-150 g/Kg/die | 150-200 g/Kg/die | 2-6 g/Kg/die | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1315 | Indicare l'età in cui i bambini iniziano generalmente a camminare: | 12-15 mesi | 15-18 mesi | 18-20 mesi | 5-6 mesi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1316 | Quale tra queste vaccinazioni non è obbligatoria in Italia? | Anti-parotite | Anti-tetanica | Anti-epatite B | Anti-polio | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1317 | Quali tra questi è un possibile danno da ossigeno terapia? | Fibroplasia retrolenticolare | Acidosi metabolica | Tutte le altre risposte sono corrette | Acidosi respiratoria | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1318 | Qual è il farmaco controindicato in caso di varicella in età pediatrica? | Acido acetilsalicilico | Cortisone | Paracetamolo | Cortisolo | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|--|---|---|---|---------------------------|
| 1319 | Il periodo neonatale va: | dal 1° al 30° giorno di vita | dal 1° giorno al primo anno di vita | dalla 1a alla 48a ora di vita | dal 1° al 7° giorno di vita | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1320 | La circonferenza cranica di un neonato raggiunge la media di: | 35 cm | 45 cm | 22 cm | 28 cm | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1321 | Indicare il numero delle più diffuse tipologie di glicogenosi in pediatria: | 4 | 5 | 6 | 12 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1322 | Il periodo d'incubazione della varicella copre generalmente: | 14-21 giorni | 14-60 giorni | 24-48 ore | 5-8 giorni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1323 | Tra gli schemi motori già presenti alla nascita non troviamo: | la capacità di seguire con movimenti oculari uno stimolo visivo | la risposta di afferrare oggetti che sfiorano il palmo della mano o la pianta dei piedi | la respirazione autonoma e separata dalla suzione | la capacità di orientare il capo e gli occhi verso un rumore e in particolare verso la voce umana | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1324 | Indicare quale tra le seguenti patologie non è congenita: | NEC | fibrosi cistica | atresia del duodeno | atresia dell'esofago | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1325 | Il contenuto di un litro di latte umano, in calorie, è pari a: | 680-700 | 790-820 | 100-500 | 550-600 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1326 | Qual è il volume globulare medio di un neonato? | 100-105 m3 | 70-80 m3 | 90-100 m3 | 90-95 m3 | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1327 | Indicare quale delle seguenti strutture non si forma nella quinta e sesta settimana di gestazione: | il tubo neurale | il prosencefalo | il diencefalo e i gangli della base | il tronco encefalico | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1328 | Nella 7ª settimana di gestazione, nel feto: | tutte le altre risposte sono corrette | si presentano lente estensioni del capo | si evidenziano sussulti non coordinati | si avverte la presenza di contrazioni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1329 | Lo standard considerato fisiologico del valore della bilirubinemia nel neonato è pari a: | 10 mg/dl | 1 mg/dl | 2 mg/dl | 5 mg/dl | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1330 | Indicare quale tra i seguenti test non è indicato nella diagnosi prenatale di patologie genetiche: | il prelievo di campioni di sangue fetale | l'ecografia fetale | lo studio di campioni di sangue materno | l'analisi dei tessuti materni | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1331 | Indicare a quale età emerge la positività per HIV in un lattante: | 12-18 mesi | 2-4 giorni | 3-6 mesi | 6-24 mesi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1332 | Tra i denti permanenti, quali tra i seguenti compaiono più precocemente: | il primo molare | gli incisivi | i canini e i molari | i canini e gli incisivi | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1333 | Quanti liquidi deve assumere un neonato al giorno? | 150 ml | 50 ml | 75 ml | 100 ml | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1334 | Indicare quale tra i seguenti indici specifici non riguarda valutazione delle fasi dell'età pediatrica: | il quoziente intellettivo | l'aumento ponderale | la circonferenza cranica | lo sviluppo sessuale | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1335 | Indicare il corretto punto di prelievo del sangue nel neonato: | tutte le altre risposte sono corrette | vene femorali | vene del piede | vene dell'arto superiore | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1336 | Le allucinazioni sono: | percezioni senza oggetto | percezioni distorte | disturbi del contenuto del pensiero | disturbi della forme del pensiero | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1337 | Nel rapporto psicoterapeutico, il transfert è definibile come: | la ripetizione di vissuti infantili, incongrui con la situazione attuale, spostati sullo psicoanalista | un meccanismo di difesa che consiste nel negare i propri conflitti | un meccanismo di difesa che consiste nel proiettare all'esterno i vissuti inaccettabili | la reazione emotiva dello psicoanalista a espressioni e comportamenti dell'analizzato | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1338 | Cosa sostiene, riguardo l'eziologia della schizofrenia, la «teoria del doppio legame» elaborata da Bateson? | I bambini ricevono messaggi conflittuali tra i vari ambiti da parte dei genitori | Il modo di rapportarsi dei pazienti è scisso in funzione dell'ambito di interrelazione | I bambini crescono in una condizione di scarsa fiducia che altera la corretta evoluzione psichica | Esiste un'importante dissociazione tra i contenuti ideativi e quelli volitivi dei pazienti | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1339 | Cosa si intende in Psichiatria con l'espressione «pensiero magico»? | La convinzione che i propri pensieri, parole o azioni possano causare o prevenire un qualche evento | La ripetizione ossessiva di formule magiche e scaramantiche | La convinzione di potersi trasformare | La convinzione di poter trasmettere il proprio pensiero magicamente | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1340 | Nella teoria psicoanalitica, l'Es costituisce: | La parte arcaica, pulsionale e stabilmente inconscia della psiche | Un complesso di inferiorità | Una specifica parte o sezione della personalità il cui ruolo è assimilante a quello di censore | Un complesso di colpa | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1341 | I test proiettivi o della personalità sono: | reattivi che forniscono informazioni sulla struttura del carattere | atteggiamenti particolari che lo psichiatra assume per evocare risposte emotive | reattivi che consentono di predire la risposta a terapie farmacologiche | la lista delle associazioni verbali di Jung | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1342 | Tra i meccanismi di difesa, la rimozione indica: | il procedimento per cui viene reso inconscio un evento traumatico | il rigetto delle pulsioni negative | il riapparire di sintomi e disturbi infantili in età adulta | l'oblio consapevole di esperienze luttuose | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1343 | L'amenorrea nell'anoressia mentale femminile: | è di regola secondaria e conseguente al dimagrimento | è più spesso primaria che secondaria | è una conseguenza diretta del vomito autoindotto | è sempre assente | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|--|---|---|--|---------------------------|
| 1344 | Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione: | di tutte le funzioni cognitive | solo della memoria | solo dell'orientamento temporo-spaziale | solo dell'attenzione | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1345 | La sospettosità pervasiva nei confronti degli altri è tipica: | del disturbo paranoide di personalità | dell'autismo schizofrenico | del disturbo ossessivo compulsivo | della personalità evitante | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1346 | La sindrome di Korsakov si riferisce a: | un disturbo specifico della memoria | una tipica nevrosi fobica | un disturbo particolare della condotta sessuale | una tipologia di schizofrenia | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1347 | Nelle teorie psicodinamiche l'inconscio rappresenta: | un luogo psichico in cui si depositano i materiali rimossi | la genesi infantile dei desideri sessuali | una forza cieca, caotica, irrazionale | un'espressione psichica della libido | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1348 | La legge di riforma psichiatrica (n. 180 del 1978) è nota come: | legge «Basaglia» | legge «Burani» | legge «Segni» | legge «Pannella» | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1349 | Quale dei seguenti autori descrisse la catatonia? | Kahlbaum | Chiarugi | Roth | Charchot | INFERMIERISTICA SPECIFICA |
| 1350 | Il decorso tipico del disturbo bipolare è caratterizzato da: | alternanza di fasi di eccitamento e di depressione | alternanza di fasi depressive con stati di tipo schizofrenico | alternanza di fasi di depressione con fasi di catatonia | alternanza di fasi di eccitamento con stati di tipo schizofrenico, con periodi di remissione | INFERMIERISTICA SPECIFICA |

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| Id | Quesito | Risp_ esatta | Risp_errata_1 | Risp_errata_2 | Risp_errata_3 | Materia |
|------|--|---|---|--|--|---------|
| 1351 | Quale delle seguenti patologie è a trasmissione diretta tra individui? | Sifilide | Peste | Rabbia | Malaria | IGIENE |
| 1352 | In caso di ferita traumatica e in assenza di conoscenza dello stato vaccinale, la profilassi antitetanica prevede: | tutte le altre risposte sono corrette | disinfezione della ferita | somministrazione di immunoglobuline | terapia antibiotica | IGIENE |
| 1353 | La chemioprolifassi primaria prevede la somministrazione di: | antibiotici | vaccini | fans | qualsiasi farmaco antivirale | IGIENE |
| 1354 | Con la refrigerazione gli alimenti vengono conservati a temperatura: | tra 0°C e 4°C | ambiente | < 0°C | > 4°C | IGIENE |
| 1355 | Completare la seguente frase con l'opzione corretta: "Un oggetto si definisce sterile quando è privo di _____" | qualsiasi microrganismo o spora | spore | microrganismi patogeni | microorganismi anaerobi | IGIENE |
| 1356 | Classifichiamo il lisoformio come: | un disinfettante | un insetticida | un battericida | un acaricida | IGIENE |
| 1357 | Il botulismo è classificato come: | un'intossicazione alimentare | un'avvelenamento da funghi | un'epatite a eziologia sconosciuta | un'infezione in seguito a intervento chirurgico | IGIENE |
| 1358 | Identifica il vettore di infezione tra i seguenti: | mosche | aria | alimenti | suolo | IGIENE |
| 1359 | Cosa si intende per contumacia: | il confino di un paziente in ambiente domiciliare o ospedaliero per un determinato periodo di tempo | l'obbligo per il paziente di sottoporsi a profilassi antibiotiche | la mancata presentazione della certificazione medica al datore di lavoro | la dimissione di un paziente dalla struttura ospedaliera | IGIENE |
| 1360 | La Rickettsiosi è un'infezione che utilizza come vettore: | la zecca | il cane | i molluschi | la zanzara | IGIENE |
| 1361 | Quale dei seguenti vaccini è costruito con frazioni di microrganismi: | Antipertosse | Antimalarico | Antirosolia | Antitubercolare | IGIENE |
| 1362 | Quando non si può somministrare un vaccino? | Durante terapia immunosoppressiva | Durante terapia antifungina | Durante l'adolescenza | Durante l'allattamento | IGIENE |
| 1363 | Quale dei seguenti elementi chimici deve essere assente nell'acqua potabile? | Argento | Calcio | Magnesio | Potassio | IGIENE |
| 1364 | Quale malattia è stata eradicata a livello mondiale? | Vaiolo | Micobatteriosi | Peste | Lebbra | IGIENE |
| 1365 | Per quale malattia a tutt'oggi non esiste ancora un vaccino? | Toxoplasmosi | Epatite virale B | Epatite A | Morbillo | IGIENE |
| 1366 | Per la sterilizzazione viene utilizzato: | ossido di etilene | alcol etilico | acido cloridrico | cloro | IGIENE |
| 1367 | Una malattia infettiva è a trasmissione eterogenea se: | necessita di un vettore | ha differenti manifestazioni cliniche | colpisce organismi di specie diverse | si trasmette con diverse modalità | IGIENE |
| 1368 | Da cosa può essere provocata la tossinfezione alimentare: | staphylococcus aureus | treponema pallidum | VZV | micobatteri ambientali | IGIENE |
| 1369 | In quale tipo di prevenzione si effettua il monitoraggio periodico fetale? | Secondaria | Terziaria | Tutte le altre risposte sono corrette | Primaria | IGIENE |
| 1370 | La profilassi indiretta viene attuata mediante: | disinfezione ambientale | isolamento | inchiesta epidemiologica | notifica | IGIENE |
| 1371 | Quale tra i seguenti è un composto alogeno? | Cloro | Aldeidi | Acqua distillata | Alcool | IGIENE |
| 1372 | La temperatura ottimale per un individuo sano a riposo è: | 18-20°C | 25-29°C | 21-25°C | 14-16°C | IGIENE |
| 1373 | In seguito a pastorizzazione, per quanto tempo si conserva il latte in frigorifero? | 4 giorni | 7 giorni | 2 giorni | 3 giorni | IGIENE |
| 1374 | In caso di immunoprofilassi passiva cosa viene somministrato al paziente? | Immunoglobuline | Immunosoppressori | Eristrociti | Chemioterapici | IGIENE |
| 1375 | Per definizione che cos'è un'autoclave? | Una caldaia usata per la sterilizzazione | Una macchina per distruggere i rifiuti | Un carrello per il trasporto della biancheria | Un'autoambulanza dotata di lettiga automatizzata | IGIENE |
| 1376 | Il periodo di incubazione di una malattia indica l'arco di tempo tra: | il contagio dell'agente patogeno e la manifestazione dei sintomi correlati | il contatto con l'agente patogeno e la risposta del sistema immunitario | l'inizio dei sintomi e la guarigione definitiva | il momento in cui l'agente patogeno entra nell'organismo e la guarigione | IGIENE |
| 1377 | Prima di effettuare un prelievo di sangue venoso si deve disinfettare la parte interessata per almeno: | uno o due minuti | cinque minuti | tutte le altre risposte sono corrette | quattro secondi | IGIENE |
| 1378 | Cosa si utilizza per la disinfezione di strumenti endoscopici: | la glutaraldeide | la bollitura | l'autoclave | l'acido fenico | IGIENE |
| 1379 | Che cosa si intende per antisepsi? | Disinfezione di tessuti viventi | Disinfezione della sala operatoria | Sterilizzazione di tessuti vegetali | Sterilizzazione di strumentario chirurgico | IGIENE |
| 1380 | Qual è la caratteristica di una malattia endemica? | Ha frequenza costante | E' ad eziologia sconosciuta | Si trasmette geneticamente | Presenta bruschi aumenti di frequenza in tempi brevi | IGIENE |
| 1381 | Quale delle seguenti malattie ha bisogno di un vettore per diffondersi? | Malaria | Polmonite | Rosolia | Epatite A | IGIENE |
| 1382 | Tra le seguenti malattie quale può porre nella condizione di portatore cronico? | Epatite B | Toxoplasma | Rosolia | Malaria | IGIENE |
| 1383 | La clorexidina viene classificata come: | un disinfettante | una vitamina | un antimicotico | un agente sterilizzante | IGIENE |

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|--|---|--|--|--------|
| 1384 | L'isolamento del paziente è obbligatorio in caso di: | Tubercolosi | Malaria | Polmonite da P. carinii | Aids | IGIENE |
| 1385 | Per quale tipo di sterilizzazione si utilizzano i raggi UV? | Di superfici varie | Di biancheria e garza | Della cute e delle mucose | Del cavo orale | IGIENE |
| 1386 | La cosiddetta malattia di Lyme può essere trasmessa da: | zecche | mosche tse-tse | zanzare | pulci | IGIENE |
| 1387 | Vetro o metallo si sterilizzano mediante: | stufe a secco | fenoli | alcoli | bollitura | IGIENE |
| 1388 | Un vaccino può essere composto da: | tutte le altre risposte sono corrette | microrganismi morti | microrganismi attenuati | anatossine | IGIENE |
| 1389 | I rifiuti ospedalieri si definiscono? | Speciali | Velenosi | Umidi | Tossici | IGIENE |
| 1390 | Cosa non fa parte della prevenzione primaria? | Screening di massa | Vaccinazione | Disinfezione | Educazione sanitaria | IGIENE |
| 1391 | Una sola di queste malattie non è trasmissibile per via aerea. Quale? | Epatite A | Varicella | Tubercolosi | Scarlattina | IGIENE |
| 1392 | Quale delle seguenti malattie è anche a trasmissione verticale? | Rosolia | Amebiasi | Polmonite | Bronchiolite | IGIENE |
| 1393 | Il guanto sterile non va indossato: | Prima del posizionamento del sondino naso gastrico | Prima della medicazione del catetere arterioso | Prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica | Prima del posizionamento del catetere vescicale | IGIENE |
| 1394 | L'utilizzo dei guanti è una misura: | aggiuntiva al lavaggio delle mani | alternativa al lavaggio sociale delle mani | alternativa al lavaggio antisettico delle mani | alternativa al lavaggio chirurgico delle mani | IGIENE |
| 1395 | Quando NON deve essere utilizzata la frizione con soluzione alcolica delle mani? | Se le mani sono imbrattate di sangue | Dopo il contatto con oggetti inanimati | Dopo la rimozione dei guanti | Se le mani non sono visibilmente sporche | IGIENE |
| 1396 | Tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo NON vanno eliminati: | farmaci scaduti | agenti chimici pericolosi | liquidi radiologici | contenitori medicinali citotossici | IGIENE |
| 1397 | La glutaraldeide viene utilizzata per la sterilizzazione di: | endoscopi | garze e batuffoli | stetoscopi | fonendoscopi | IGIENE |
| 1398 | Fra i comportamenti da tenere nel rifacimento letto, quale, tra i seguenti, è corretto: | Rimuovere dal letto le lenzuola e deporle nel cesto della biancheria sporca tenendole lontano dalla divisa | Rimuovere la biancheria dal letto, tenendola lontano dalla divisa e adagiandola momentaneamente sul pavimento in attesa di riporla nell'apposito sacco al termine della procedura | Rimuovere la biancheria dal letto, scuoterla per eliminare i microrganismi, tenendola lontano dalla propria divisa e successivamente deporla nel cesto della biancheria sporca | Rimuovere la biancheria dal letto tenendola adesa al proprio corpo e scuotendola prima di riporla nel sacco della lavanderia | IGIENE |
| 1399 | Durante l'esecuzione dell'igiene intima femminile è corretto procedere: | Versando l'acqua sui genitali pulire le grandi labbra e successivamente le piccole labbra | Versando l'acqua sui genitali pulire in senso lineare dalla zona anale alla vagina | Versando l'acqua sui genitali pulire in senso lineare dalla zona vaginale al meato urinario | Versando l'acqua sui genitali pulire le piccole labbra e successivamente le grandi labbra | IGIENE |
| 1400 | Al termine dell'esecuzione dell'igiene intima maschile, è importante ricoprire il glande per: | prevenire formazione di edema | evitare l'imbarazzo della persona | prevenire infezioni | prevenire infiammazioni | IGIENE |
| 1401 | Durante l'igiene del cavo orale del paziente incosciente, il paziente va posizionato: | Sul fianco e sollevando la testata del letto di almeno 30 gradi | Sul fianco non sollevando la testata del letto | Supino sollevando la testata del letto di almeno 45 gradi | Supino sollevando la testata del letto di almeno 30 gradi | IGIENE |
| 1402 | Le seguenti sono tutte complicanze che derivano da un'inadeguata attenzione nella pulizia del letto, tranne una: quale? | Difficoltà nel movimento a letto | Ulcere da pressione | Sensazione di disagio | Irritazioni cutanee | IGIENE |
| 1403 | Riguardo l'igiene del cavo orale di una persona non cosciente, quali tra le seguenti affermazioni sono esatte? 1. Controllare che l'aspiratore sia funzionante e nei pressi 2. Posizionare la persona seduta 3. Utilizzare le dita della mano non dominante per tenere aperta la bocca 4. Cospargere con un agente idratante le labbra dopo aver completato l'igiene orale. | 1,4 | 1,2,3,4 | 1,2,4 | 2,3 | IGIENE |
| 1404 | Che tipo di lavaggio va effettuato prima di indossare i guanti sterili per l'inserimento di un catetere vescicale? | Lavaggio sociale | Lavaggio chirurgico | Nessuna delle altre risposte è corretta | Lavaggio antisettico | IGIENE |
| 1405 | Lavare le mani non basta per favorire la prevenzione, questa azione deve essere accompagnata da alcuni accorgimenti: | Le unghie devono essere tenute corte e pulite | Le unghie possono essere ricoperte da smalto solo se di colore chiaro | Nessuna delle altre risposte è corretta | Le unghie possono essere ricoperte da smalto antibatterico | IGIENE |
| 1406 | La rosolia è una malattia di natura: | virale | genetica | sia virale che batterica | batterica | IGIENE |
| 1407 | I Batteri sono: | microorganismi che possono causare infezioni | microorganismi con cellula molto complessa | microorganismi sempre pericolosi | microorganismi che vivono solo in assenza di ossigeno | IGIENE |
| 1408 | L'epatite è una affezione che riguarda: | il fegato | il pancreas | il cuore | il colon retto | IGIENE |
| 1409 | La toxoplasmosi è una malattia: | sia dell'uomo che degli animali | solo dell'uomo | solo dei gatti | solo degli animali | IGIENE |
| 1410 | Il periodo di incubazione dell'epatite A è di: | circa un mese | circa tre mesi | circa un anno | circa sei mesi | IGIENE |
| 1411 | L'acronimo AIDS significa: | Acquired Immuno Deficiency Syndrome | Acquired Immuno Deficity Syndrome | Acquired In Deficit Syndrome | Acquired Immuno Deficiency Sistem | IGIENE |
| 1412 | La malaria è una malattia: | che ha recidive e può diventare cronica | che non ha recidive | che ha recidive ma non può diventare cronica | che raramente ha recidive | IGIENE |

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|--|---|---|---|--------|
| 1413 | La penicillina si ricava: | da un fungo | da un batterio | da una pianta | da un virusa | IGIENE |
| 1414 | La comune meningite dei bambini è causata da: | un virus | un fungo | un protozoo | un batterio | IGIENE |
| 1415 | I soggetti portatori sani di una malattia: | non manifestano la malattia ma possono trasmetterla | non hanno la malattia | non manifestano la malattia e non possono trasmetterla | manifestano la malattia | IGIENE |
| 1416 | Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere: | Il lavaggio delle mani | Il ricambio quotidiano della biancheria del letto | La dotazione di disinfettanti e antibiotici | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1417 | Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate: | Prima di indossarli e dopo averli rimossi | Solo quando evidentemente contaminate | Solo se si è venuti a contatto con liquidi organici | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1418 | Qual è il più importante fattore di rischio per lo sviluppo di una batteriuria associata a cateterizzazione? | La durata della cateterizzazione | Una scorretta igiene perineale | L'inadeguata assunzione di liquidi | L'utilizzo di cateteri vescicali in lattice | IGIENE |
| 1419 | Al termine di un'iniezione, l'infermiere deve gettare siringa e ago: | Negli appositi contenitori senza rimettere il cappuccio protettivo sull'ago | Solo dopo aver reincappucciato l'ago | Tutte le altre alternative sono corrette | Nei rifiuti speciali solo dopo aver reincappucciato l'ago | IGIENE |
| 1420 | Per "antipsepsi" si intende: | Un insieme di norme atte a impedire o a rallentare la moltiplicazione di germi patogeni e non patogeni | Un processo che permette l'eliminazione di ogni microrganismo vivente (batteri, spore, miceti e virus) | Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili | La detersione eseguita mediante l'uso di mezzi e sostanze ad alto potere detergente | IGIENE |
| 1421 | La dieta del paziente affetto da insufficienza renale cronica non sottoposto a dialisi deve: | Limitare l'apporto di potassio | Aumentare la quota di liquidi | Limitare l'apporto di grassi saturi | Limitare l'apporto di proteine | IGIENE |
| 1422 | L'uso dei guanti monouso: | Non deve mai essere un'alternativa all'igiene delle mani | Può essere un'alternativa all'igiene delle mani in alcune situazioni | E' una valida alternativa all'igiene delle mani | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1423 | L'accertamento dello stato nutrizionale prevede la raccolta dei seguenti dati OGGETTIVI: | Misure antropometriche | Ambiente | Abitudini di vita | Religione | IGIENE |
| 1424 | La procedura più importante per prevenire le infezioni correlate all'assistenza infermieristica: | Igiene delle mani | Utilizzo di battericidi | Sterilizzazione degli ambienti | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1425 | Quale fra le seguenti manovre è indicata per prevenire lo sviluppo di infezioni alle vie urinarie nel paziente portatore di catetere vescicale? | Utilizzare un sacchetto di raccolta sterile, munito di apposita valvola per lo svuotamento | A ogni svuotamento del sacchetto di raccolta, disconnettere il circuito e lavare l'interno del sacchetto con acqua distillata | Non svuotare mai il sacchetto di raccolta, ma sostituirlo con uno nuovo ogni volta che si riempie | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1426 | Qual è la modalità corretta di detersione della ferita chirurgica? | Procedere sempre dall'area pulita verso l'area più sporca | Procedere dall'alto verso il basso | Per convenzione si procede sempre da sinistra verso destra | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1427 | Per prevenire l'insorgenza del piede diabetico la persona deve essere educata a: | Asciugare bene fra le dita con un panno morbido | Lavare i piedi una volta alla settimana con soluzione alcalina | Lavare i piedi con acqua molto calda | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1428 | Qual è il materiale biologico più utile per la diagnosi microbiologica di tubercolosi polmonare? | L'espettorato | La saliva | Il sangue | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1429 | Il lavaggio delle mani, come precauzione standard, mira principalmente a prevenire: | Le infezioni ospedaliere | La trasmissione di agenti virali | Le infezioni respiratorie | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1430 | Per aiutare un paziente ad espettorare le secrezioni catarrali è utile: | Associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse | Farlo tossire frequentemente, sia di giorno che di notte | Invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso anteriormente | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1431 | Durante la somministrazione di nutrizione tramite PEG, il paziente: | Deve mantenere la postura semiseduta con lo schienale del letto inclinato di 30/40 gradi | Non può deglutire liquidi per OS | Necessita di un controllo della glicemia almeno ogni 2 ore | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1432 | In ambito infermieristico, l'uso dei guanti: | Non deve mai essere un'alternativa all'igiene delle mani | È una valida alternativa all'igiene delle mani | Non deve necessariamente essere seguito dall'igiene delle mani | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1433 | Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale? | Le infezioni | Il vomito | La disidratazione | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1434 | Per ottenere l'effetto desiderato dei disinfettanti si devono osservare regole ben precise. Quale tra i seguenti sistemi di conservazione NON è corretto? | Lasciare aperta la confezione | Apporre la data di apertura sulla confezione | Conservare il prodotto in luoghi freschi e asciutti | Tutte le risposte sono corrette | IGIENE |
| 1435 | Qual è la misura che riduce sensibilmente l'incidenza di infezioni nella cateterizzazione urinaria a permanenza? | Il mantenimento del sistema di drenaggio continuamente chiuso e sterile | La pulizia settimanale della zona genitale del paziente e del meato urinario | L'irrigazione vescicale di routine | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1436 | Durante il riposo a letto, quale posizione deve adottare un paziente di chirurgia toracica nel post-operatorio? | Posizione di semi-Fowler, con il terzo superiore del letto a 30-45 gradi | Posizione prona | Posizione supina | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1437 | Quale fra le seguenti malattie può essere trasmessa per via aerea? | La tubercolosi | IVU | L'AIDS | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1438 | Nella valutazione dello screening nutrizionale possono essere applicate le seguenti scale: | MNA (Mini nutritional assessment) | Nessuna delle altre alternative è corretta | Di Painad | Di Tinetti | IGIENE |

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|--|---|---|--|--------|
| 1439 | "Rimuovere immediatamente qualsiasi catetere intravascolare che non sia più strettamente necessario." Questa affermazione è: | Vera, tutti i cateteri venosi, arteriosi, centrali o periferici devono essere rimossi il prima possibile e comunque non appena non siano più strettamente necessari, per diminuire il rischio di infezioni | Falsa perché devono essere lasciati in sito anche cateteri inutilizzati se si prevede che possano avere un utilizzo successivo (possibile aggravamento del paziente, possibile insorgenza di complicanze) | Falsa, i cateteri venosi centrali e quelli arteriosi vanno rimossi solo nel momento della dimissione del paziente dall'ospedale | Falsa perché devono essere lasciati in sito anche cateteri inutilizzati se il paziente è anziano e il patrimonio venoso scarso | IGIENE |
| 1440 | Secondo le più recenti Linee Guida per la prevenzione del rischio infettivo la medicazione del sito d'inserzione del CVC, con medicazione trasparente, deve essere effettuata: | ogni 7 giorni | mai | ogni 3 giorni | ogni giorno | IGIENE |
| 1441 | Secondo le raccomandazioni dell'OMS quanti e quali sono i "momenti fondamentali" per l'igiene delle mani? | 5:Prima del contatto con il paziente; prima di una manovra asettica; dopo esposizione ad un liquido biologico; dopo il contatto con il paziente;dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente | 5: Prima del contatto con il paziente; prima di una manovra asettica; dopo una manovra asettica; dopo il contatto con il paziente; dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente | 3: Prima del contatto con il paziente; prima di una manovra asettica; dopo esposizione ad un liquido biologico | Non esistono raccomandazioni OMS in merito | IGIENE |
| 1442 | Quale tra i seguenti interventi NON è appropriato in caso di paziente portatore di catetere vescicale? | Utilizzare talco dopo l'igiene perineale | Fissare il catetere alla coscia o all'addome | Tenere la sacca di drenaggio sotto il livello della vescica dell'assistito | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1443 | Per un soggetto HIV positivo, che tipo di precauzioni vanno adottate? | Standard | Contatto | Aerea | Droplets | IGIENE |
| 1444 | Quando il paziente è in posizione supina, potrebbero svilupparsi lesioni da pressioni nelle seguenti zone: | nuca, sacro, scapole, talloni | malleolo, gomito, orecchio | orecchio, sacro, ginocchio | sacro, ginocchio, scapole | IGIENE |
| 1445 | Per quanto riguarda l'alimentazione di una persona anziana, in assenza di controindicazioni, si consiglia di: | aumentare l'apporto di calcio nella dieta | eliminare le fibre dalla dieta | limitare l'apporto di liquidi | aumentare l'apporto di sodio quotidiano | IGIENE |
| 1446 | La medicazione di un catetere venoso centrale deve essere effettuata passando la soluzione disinfettante: | dall'interno verso l'esterno in modo circolare | dall'esterno verso l'interno in modo circolare | dall'esterno verso l'interno a raggiera | nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1447 | Il lavaggio antisettico delle mani è indicato: | Prima di eseguire procedure invasive | Al termine delle attività di strumentazione perioperatoria | Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1448 | Come si trasmette il virus Sars-Cov-2: | In modo diretto, indiretto e per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso | Solo per contatto diretto | Solo per contatto stretto | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1449 | Il calibro del catetere vescicale si misura in: | In Charrier | In Mercier | In Gauge | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1450 | Nella cura delle lesioni da pressione è fondamentale e irrinunciabile: | L'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione | La detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile | L'applicazione di garze grasse sulla lesione | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1451 | L'apertura di una ferita è chiamata: | Deiscenza | Infezione | Formazione di ernia | Sventramento | IGIENE |
| 1452 | Quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza? | Infezione delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica, polmoniti e sepsi | Polmoniti, tubercolosi, infezione delle vie urinarie ed infezione della ferita chirurgica | Infezione delle vie urinarie, gastroenteriti, infezione della ferita chirurgica e congiuntivite | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1453 | Cosa s'intende per bilancio idrico? | L'insieme dei processi che consentono di bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nell'arco delle 24 ore, cioè il rapporto tra liquidi introdotti ed eliminati | La stima approssimativa dei liquidi reintegrati attraverso la dieta | L'insieme dei processi che consentono di bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nell'arco delle 12 ore, cioè il rapporto tra liquidi introdotti ed eliminati | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1454 | Per garantire un adeguato riposo e sonno è necessario tenere in considerazione il microclima, che è caratterizzato da: | temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione, rumore | arredi in generale, illuminazione, temperatura, umidità, ventilazione, rumore | tipologia di materasso, temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1455 | Il fabbisogno medio di acqua per una persona adulta è di circa: | 1,5-2 litri al giorno | 2,5-3 litri al giorno | 1-1,2 litri al giorno | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1456 | In quale tipo di pazienti è più importante la cura dei piedi? | Nei pazienti diabetici | Nei pazienti nefropatici | Nei pazienti influenzati | Nei pazienti traumatizzati | IGIENE |

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|---|--|---|---|--------|
| 1457 | Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata? | Quando si indossano i guanti, rimuoverli nel passare da un sito del corpo pulito ad uno contaminato | Usare i guanti tutte le volte che ci si aspetti di venire in contatto con sangue o altro materiale potenzialmente infetto, membrane, mucose o cute non intatta | L'utilizzo dei guanti non è sostitutivo dell'igiene delle mani | Rimuovere i guanti dopo aver assistito il paziente | IGIENE |
| 1458 | Secondo le più recenti Linee Guida per la prevenzione del rischio infettivo il CVP nel neonato deve: | essere sostituito solo quando vi siano segni di infezione o infiammazione (flebite) o malfunzionamento e prontamente rimosso alla sospensione della terapia endovenosa | essere sostituito ogni 24 ore e lasciato in sede per altre 24 ore dopo la sospensione della terapia endovenosa | essere sostituito ogni 72 ore fino alla sospensione della terapia endovenosa | essere sostituito ogni 96 ore fino alla sospensione della terapia endovenosa | IGIENE |
| 1459 | La pratica del lavaggio delle mani effettuata correttamente consente: | la riduzione del rischio di trasmissione di patogeni dall'operatore al paziente, dal paziente all'operatore e da paziente a paziente, anche attraverso l'ambiente | l'aumento del rischio di trasmissione di patogeni da operatore a paziente e da paziente a paziente | la riduzione del rischio di trasmissione di patogeni dall'operatore al paziente ma l'aumento del rischio di trasmissione da paziente ad operatore | l'azzeramento del rischio di trasmissione di patogeni dall'operatore al paziente e da paziente a paziente | IGIENE |
| 1460 | "Eseguire la tricotomia aumenta il rischio di infezione del sito chirurgico, in special modo se si utilizzano i rasoi manuali e il rischio aumenta se questa viene praticata il giorno prima dell'intervento". Secondo le Linee Guida questa affermazione è: | Vera: la tricotomia non andrebbe mai praticata (a meno che i peli non interferiscano con l'intervento). Se si effettua la tricotomia praticarla il giorno stesso dell'intervento preferibilmente con clipper elettrico con lame monouso | Falsa: la tricotomia diminuisce il rischio di infezione e deve essere praticata sempre, con qualunque strumento e senza indicazioni sui tempi | Vera ma incompleta: la tricotomia deve sempre essere effettuata nei pazienti immunodepressi e negli individui di colore | Falsa: la tricotomia non dovrebbe essere praticata solo per interventi agli arti inferiori ma deve sempre essere effettuata negli interventi sull'addome, preferibilmente con rasoio manuale monouso bilama | IGIENE |
| 1461 | Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza: | infezione delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi | tubercolosi, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, infezioni delle vie urinarie | Infezione vie urinarie, gastroenteriti, infezione della ferita chirurgica, tubercolosi | polmoniti, tubercolosi, infezioni delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica | IGIENE |
| 1462 | Nell'esecuzione del lavaggio sociale delle mani è buona norma adottare le seguenti precauzioni tranne una. Quale? | Usare gli spazzolini per le unghie | Usare un detergente | Asciugarsi con salviettine monouso o aria calda | Asportare anelli, bracciali orologio | IGIENE |
| 1463 | Nel riposizionamento a letto, quale fra le seguenti posizioni l'infermiere dovrà fare assumere alla persona con lesione da pressione in sede sacrale, al fine di alleviare la pressione sulle prominente ossee dorsali e sacrali? | Laterale destra o sinistra | Posizione di anti-Trendelenburg | Semi-Fowler | Incrociata | IGIENE |
| 1464 | Quale dei seguenti atteggiamenti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere? | Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere il lavaggio delle mani | Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere il ricambio della biancheria | Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere l'utilizzo dei flussi d'aria laminari | Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere la corretta dislocazione dei farmaci | IGIENE |
| 1465 | Quale delle seguenti affermazioni sulla distribuzione delle calorie nel trattamento dietetico di una persona con diabete di tipo 2 è corretta? | Almeno la metà delle calorie assunte quotidianamente deve derivare dai carboidrati | Deve contenere un apporto calorico pari tra carboidrati, grassi e proteine | L'apporto calorico deve essere determinato prevalentemente dall'assunzione di frutta | La percentuale maggiore delle calorie assunte quotidianamente deve essere determinata dall'apporto protidico | IGIENE |
| 1466 | Per eseguire l'igiene del cavo orale in un paziente incosciente, è opportuno metterlo nella: | posizione laterale | posizione di Trendelenburg | posizione di Fowler | posizione seduta | IGIENE |
| 1467 | Individuare, tra i seguenti, un possibile effetto indesiderato della somministrazione di clistere evacuativo. | Crisi vagale | Iperglicemia transitoria | Cefalea | Bradipnea e sonnolenza | IGIENE |
| 1468 | Per quale motivo è necessario far rimuovere alla persona le protesi dentarie mobili prima del suo ingresso in camera operatoria? | Per evitare il rischio di caduta nel retrobocca/vie aeree/vie digestive con ostruzione delle stesse | Per evitare il rischio di caduta solo nelle vie digestive con ostruzione delle stesse | Per evitare il rischio di caduta in bocca/retrobocca ed espulsione delle stesse | Per evitare il rischio di caduta solo nella cavità nasale con ostruzione della stessa | IGIENE |
| 1469 | Un paziente degente in terapia intensiva per complicanze post-operatorie ha in corso la nutrizione enterale attraverso sondino nasogastrico. La miscela prescritta prevede l'integrazione di elementi nutrizionali quali arginina, glutammina, acidi grassi omega 3. Questa integrazione ha lo scopo di: | migliorare la risposta immunitaria | migliorare la motilità | migliorare la tollerabilità | prevenire la comparsa di diarrea | IGIENE |
| 1470 | Al rientro dalla sala operatoria dopo intervento per un'occlusione intestinale, l'infermiere effettua il primo controllo post-operatorio a una persona di 68 anni. Con quale frequenza è raccomandabile eseguire i successivi controlli dei parametri e delle condizioni cliniche del paziente? | Ogni ora per le prime 4 ore e successivamente ogni 4 ore | Dopo un'ora e poi pressione arteriosa e frequenza cardiaca ogni 6 ore, emocromo a 6-8 ore dal rientro in reparto e, se le condizioni sono stabili, al bisogno | Ogni ora per le successive 24 ore | Il paziente necessita di una presenza costante per almeno 48 ore che possa segnalare al personale ogni variazione utile dei parametri vitali | IGIENE |

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|---|---|--|---|--------|
| 1471 | Per quanto riguarda la gestione della ferita, il tipo di medicazione in schiuma in poliuretano idrofilico si utilizza per: | ferite con perdita totale o parziale di spessore, con scarso o medio drenaggio: la schiuma provvede all'assorbimento e protezione | ferite infette: la schiuma ha un'azione antimicrobica e antiparassitaria | ferite profonde o moderatamente secernenti: la schiuma provvede all'assorbimento | ferite a tutto spessore o a spessore parziale: la schiuma promuove la granulazione e il debridement autolitico per rimuovere il tessuto necrotico | IGIENE |
| 1472 | L'igiene del cavo orale, l'aspirazione delle secrezioni e il posizionamento dell'assistito con il tronco sollevato di 30-45° sono interventi infermieristici atti a prevenire: | la polmonite associata a intubazione endotracheale | l'insorgenza di lesioni a carico del cavo orale | la dislocazione del tubo endotracheale | la rimozione accidentale del catetere di Swan-Ganz | IGIENE |
| 1473 | L'iperemia della cute, che non scompare dopo digitopressione, denota una lesione da pressione: | al primo stadio | al terzo stadio | al secondo stadio | al quarto stadio | IGIENE |
| 1474 | Quale tra le seguenti NON è un'indicazione al posizionamento di catetere vescicale? | Neoplasia del bacinetto renale o dell'uretere, per il quale sia stato posizionato uno stent | Quando è necessario iniettare mezzi di contrasto in vescica a scopo diagnostico | Ritenzione urinaria o assenza di riflesso neurologico vescicale | Mantenere la vescica vuota in caso di interventi chirurgici a carico delle vie urinarie | IGIENE |
| 1475 | Nel riposizionamento a letto, per favorire la ventilazione e migliorare la gittata cardiaca, l'infermiere dovrà far assumere al paziente la posizione: | di Fowler | genupettorale | supina | prona | IGIENE |
| 1476 | Durante il lavaggio chirurgico delle mani è assolutamente necessario: | bagnare mani e avambracci tenendo le mani più in alto dei gomiti | bagnare mani e avambracci tenendo i gomiti più in alto delle mani | bagnare prima gli avambracci e poi le mani | usare la soluzione alcolica di clorexidina gluconato | IGIENE |
| 1477 | Quali caratteristiche deve avere un sapone utilizzato per il lavaggio di un paziente ospedalizzato? | PH neutro, poco schiumogeno, facile da risciacquare, non profumato, costo contenuto | PH leggermente basico per migliorare la disidratazione cutanea, facile da risciacquare, non profumato | Possono essere utilizzati tutti i tipi di saponi | Solo pH neutro e basso costo | IGIENE |
| 1478 | Il pronto soccorso avvisa il reparto di degenza che sta inviando per il ricovero una persona affetta da scabbia. Quali precauzioni dovrà adottare il personale di assistenza per evitare la trasmissione della malattia? | Indossare un camice monouso e i guanti da cambiare ogniqualvolta abbia contatti con la persona, programmare interventi di pulizia straordinaria per la stanza di degenza e, se possibile, accoglierla in una stanza singola | Indossare i mezzi di protezione previsti dall'isolamento per contatto all'entrata della stanza e rimuoverli prima di uscire | Metterla subito in isolamento ed evitare qualsiasi tipo di contatto | Indossare un camice e i guanti per tutti i contatti con la persona, che sarà posta in degenza con altri soggetti portatori di stati infetti di altri generi | IGIENE |
| 1479 | Quali interventi infermieristici sono indicati per la prevenzione della polmonite associata a intubazione endotracheale in un assistito degente in Terapia Intensiva e intubato da 8 giorni? | Praticare l'igiene del cavo orale, aspirare le secrezioni, posizionare l'assistito con il tronco sollevato di 30-45 gradi | Praticare l'igiene del cavo orale, evitare l'aspirazione delle secrezioni sottoglottiche, posizionare l'assistito con il tronco sollevato di 90 gradi | Praticare l'igiene del cavo orale, eseguire il monitoraggio emogasanalitico biorario, posizionare l'assistito supino | Praticare l'igiene del cavo orale, incrementare la sedazione, posizionare l'assistito supino | IGIENE |
| 1480 | Il carcinoma della cervice uterina si associa in più del 95% dei casi a infezione da: | Papillomavirus umano (HPV) | Virus di Epstein-Barr (EBV) | Candida Albicans | Virus erpetico ottavo (HHV8) | IGIENE |
| 1481 | La sacca di raccolta delle urine collegata al catetere vescicale deve essere mantenuta: | al di sotto del livello della vescica | al livello della vescica | non è importante considerare il livello rispetto alla vescica | al di sopra del livello della vescica | IGIENE |
| 1482 | Cosa si intende con l'espressione "bilancio idrico": | il monitoraggio dei liquidi sia introdotti sia eliminati dal paziente | la media aritmetica dei parametri vitali rilevati al paziente nelle ultime 48 ore | il monitoraggio dei soli liquidi introdotti dal paziente | il monitoraggio dei soli liquidi eliminati dal paziente | IGIENE |
| 1483 | Quale tra i seguenti provvedimenti riveste maggiore efficacia nella prevenzione delle infezioni ospedaliere? | L'igiene delle mani | L'utilizzo di flussi ad aria laminare | L'utilizzo di disinfettanti per pavimenti | La nebulizzazione di formaldeide | IGIENE |
| 1484 | Quale delle seguenti indicazioni si deve dare a una persona sottoposta a chemioterapia per eseguire l'igiene del cavo orale? | Utilizzare spazzolini a setole morbide | Usare garze morbide e filo interdentale ogni sera | Usare solo collutori a base alcolica | Usare dei rilevatori di placca per rimuoverla completamente | IGIENE |
| 1485 | La cura quotidiana del meato urinario in presenza di catetere vescicale prevede l'utilizzo di: | acqua e sapone | clorexidina al 2% | pomata antibiotica | iodopovidone al 10% | IGIENE |
| 1486 | "Lesione cutanea a spessore totale con degenerazione o necrosi del tessuto sottocutaneo, e con possibile estensione fino alla fascia muscolare, ma non oltre" è la definizione di una lesione al: | terzo stadio | primo stadio | quarto stadio | secondo stadio | IGIENE |
| 1487 | Quale delle seguenti affermazioni riguardo all'uso dei guanti come mezzo di barriera è corretta? | I guanti riducono l'incidenza della contaminazione delle mani ma non prevengono le lesioni dovute ad aghi | I guanti non sterili vanno indossati prima di reincappucciare gli aghi usati | I guanti sterili vanno indossati prima di venire in contatto con secreti ed escreti corporei | I guanti sterili vanno indossati prima di indossare il camice sterile | IGIENE |

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|---|---|--|---|--------|
| 1488 | Il sistema di isolamento basato sulle precauzioni universali richiede: | di considerare tutti i pazienti potenzialmente infetti per le malattie che si trasmettono attraverso il sangue e altri liquidi biologici | l'utilizzo di misure di barriera ogni qualvolta si entri in contatto con il paziente | l'isolamento del paziente in stanza singola | l'isolamento immediato e stretto, tramite precauzioni standard e aggiuntive, dei pazienti sintomatici | IGIENE |
| 1489 | L'agente patogeno della malaria è: | il Plasmodium falciparum | il Dictyostelium discoideum | il Saccharomyces cerevisiae | il Bacillus subtilis | IGIENE |
| 1490 | L'effettuazione di una medicazione semplice è: | eseguita dall'operatore socio-sanitario in collaborazione con l'infermiere | un'urgenza medica e dunque eseguita in sala operatoria dal chirurgo | decisa dall'operatore socio-sanitario in autonomia | eseguita esclusivamente dall'infermiere | IGIENE |
| 1491 | L'impiego dell'acqua ossigenata permette: | una veloce ed efficace rimozione degli essudati | l'eliminazione di tutti i microrganismi | di rinfrescare la pelle del paziente | l'eliminazione di tutta la flora batterica | IGIENE |
| 1492 | "Parziale perdita di spessore del derma, che si presenta come un'ulcera aperta, superficiale, con colore rosso, senza fibrina" è caratteristica di una lesione da pressione: | al secondo stadio | al primo stadio | non classificabile | al sesto stadio | IGIENE |
| 1493 | Nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni da pressione, occorre evitare di: | frizionare e sfregare la cute, specialmente in corrispondenza delle prominenze ossee | valutare insieme al personale infermieristico la necessità di posizionare un materasso antidecubito | mantenere il più possibile la cute pulita e asciutta | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1494 | Durante la preparazione del sistema di un drenaggio toracico a valvola ad acqua che cosa deve fare l'infermiere? | Garantire l'asepsi, riempire la camera di aspirazione con acqua sterile fino al segno presente sulla camera di drenaggio | Riempire la camera con soluzione fisiologica, senza adottare manovre di particolare sterilità | Garantire l'asepsi, riempire la camera di aspirazione con acqua sterile oltre il segno presente sulla camera di drenaggio | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1495 | Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da: | batteri | protozoi | virus respiratori | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1496 | Nella fase preoperatoria, quando deve essere effettuata l'eventuale tricotomia dell'area di incisione cutanea? | Immediatamente prima dell'intervento chirurgico | Sei ore prima dell'intervento chirurgico | La sera prima dell'intervento chirurgico | Immediatamente dopo l'intervento chirurgico | IGIENE |
| 1497 | Vengono definite Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA): | Le infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima o al momento dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione | Nessuna delle altre risposte è corretta | Le infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima dell'erogazione dell'assistenza potevano già essere manifeste clinicamente o in incubazione | Le infezioni dovute unicamente a batteri, contratte durante l'assistenza sanitaria e che prima o al momento dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione | IGIENE |
| 1498 | In quali fasi del processo di assistenza l'intervento dell'OSS può rendersi necessario? | Attuazione degli interventi infermieristici | Pianificazione e attuazione degli interventi infermieristici | Pianificazione, attuazione e valutazione degli interventi infermieristici | Tutte le fasi del processo di assistenza | IGIENE |
| 1499 | Quali sono i parametri presi in considerazione da E. Norton per valutare il rischio d'insorgenza delle lesioni da decubito? | Condizioni fisiche, stato mentale, deambulazione, mobilizzazione, incontinenza | Igiene, alimentazione, sudorazione, peso, mobilità a letto | Condizioni fisiche, igiene, alimentazione, stato mentale, idratazione | Deambulazione, mobilizzazione, peso, idratazione, incontinenza | IGIENE |
| 1500 | Quali dei seguenti fattori possono influenzare negativamente la guarigione di una ferita? | Sepsi e deficit nutrizionali | Dieta iperproteica | Vomito e diarrea | Febbre | IGIENE |
| 1501 | Il lavaggio antisettico delle mani ha l'obiettivo di: | ridurre il numero di batteri residenti e transitori dalle mani | eliminare i residui biologici e tutti i batteri, spore comprese, dalle mani | eliminare tutti i batteri residenti e transitori dalle mani | eliminare i residui biologici dalle mani | IGIENE |
| 1502 | Per effettuare la medicazione di una ferita asettica l'infermiere deve procedere: | dal centro alla periferia, mantenendo l'asepsi chirurgica | dal centro alla periferia, mantenendo l'asepsi medica | indifferentemente dalla periferia al centro o viceversa, mantenendo l'asepsi chirurgica | dalla periferia al centro, mantenendo l'asepsi chirurgica | IGIENE |
| 1503 | Per effettuare un clistere il paziente deve assumere la seguente posizione: | laterale sinistra con la gamba destra flessa | prona con le gambe flesse | indifferente purché il paziente sia comodo | laterale con la gamba sinistra flessa | IGIENE |
| 1504 | La nutrizione parenterale si somministra: | nella via ematica | nello stomaco, nel duodeno nel digiuno | nel circolo collaterale | per via orale | IGIENE |
| 1505 | La terapia dietetica nel paziente affetto da epatite cronica scompensata è: | iposodica e ipoproteica | iposodica e iperglucidica | iposodica e ipocalorica | iposodica e iperproteica | IGIENE |
| 1506 | Il lavaggio delle mani prima di iniziare una procedura infermieristica è necessario: | sempre | solo se si indossano guanti sterili | solo se l'infermiere presenta delle soluzioni di continuo (ferite, abrasioni) sulle mani | solo se non si indossano guanti puliti | IGIENE |
| 1507 | Per effettuare l'urinocoltura in una persona con minzione spontanea, deve essere raccolto: | un campione di urina del mitto intermedio in contenitore sterile previa detersione e disinfezione del meato uretrale | un campione di urina mediante cateterismo estemporaneo in contenitore sterile | un campione di urina del mitto intermedio in contenitore pulito previa detersione e disinfezione del meato uretrale | un campione di urina dalla diuresi delle 24 ore in contenitore sterile previa disinfezione | IGIENE |

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|---|--|---|--|--------|
| 1508 | In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte a evitare punture e tagli accidentali? | Sempre, indipendentemente dalla natura del soggetto sul quale sono stati impiegati | Solo quando sono stati utilizzati per soggetti HIV-positivi | Solo nell'ambito del servizio di pronto soccorso | Solo quando sono stati utilizzati per soggetti tossicodipendenti | IGIENE |
| 1509 | In una persona portatrice di drenaggio toracico: | il vaso di raccolta deve essere costantemente posto sotto il livello del torace della persona | si consiglia alla persona il decubito supino | non si deve mai sostituire il vaso di raccolta | il vaso di raccolta deve contenere soluzione sterile con eventuale antibiotico | IGIENE |
| 1510 | Al termine di un'iniezione, l'infermiere deve gettare la siringa e l'ago negli appositi contenitori: | senza rimettere il cappuccio protettivo sull'ago | rimettendo il cappuccio protettivo sull'ago | sterilizzando l'ago prima di incappucciarlo | spezzando l'ago, dopo averlo staccato dalla siringa | IGIENE |
| 1511 | Cos'è il condom? | Un presidio per consentire la raccolta delle urine | Un presidio per consentire l'eliminazione del versamento pleurico | Un presidio per consentire la nutrizione parenterale | Un presidio per consentire l'eliminazione fecale | IGIENE |
| 1512 | Dopo aver somministrato la terapia orale mediante sondino a una persona impossibilitata a deglutire, l'infermiere deve: | chiudere il sondino per almeno mezz'ora | nessuna delle altre alternative è corretta | lasciare aperto il sondino | ricollegare il raccoglitore al sondino | IGIENE |
| 1513 | La cura di un'area della cute sottoposta a radioterapia prevede di: | Mantenere il sito asciutto e pulito per tutto il periodo di trattamento | Eeguire impacchi giornalieri con alcol | Applicare crema all'ossido di zinco una volta al giorno | Mantenere il sito umido | IGIENE |
| 1514 | Quali sono i metodi di alimentazione mediante sondino enterale? | Tutte le altre risposte sono corrette | In continuo, mediante una pompa che eroga la quantità prescelta di alimentazione nel numero di ore specificato | Infusione intermittente (con o senza pompa) | Con una siringa per somministrare volumi maggiori di alimento (bolo) a intervalli di tempo prestabiliti nell'arco della giornata | IGIENE |
| 1515 | Le precauzioni standard per prevenire la trasmissione delle infezioni, prevedono: | Utilizzo dei DPI, lavaggio corretto delle mani e delle superfici cutanee dopo contatto con fluidi corporei, gestione attenta di strumenti taglienti, isolamento degli assistiti infetti | Isolamento degli assistiti solo nel caso di infezioni chirurgiche | Utilizzo di guanti monouso sterili | Unicamente il lavaggio chirurgico delle mani | IGIENE |
| 1516 | Quale prodotto per l'igiene del cavo orale può ulteriormente ridurre l'incidenza di polmonite associata a ventilazione meccanica? | Clorexidina Gluconato al 2% | Candeggina 00 | Acqua Ossigenata | Soluzione fisiologica 0,9% | IGIENE |
| 1517 | I principali interventi volti a prevenire le lesioni da pressione nei soggetti a rischio sono: | mobilizzazione dell'assistito, nutrizione adeguata e protezione della cute | nutrizione adeguata e sfregamento quotidiano della cute delle zone a rischio | riposo a letto e dieta dimagrante | nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1518 | Lo strumentario chirurgico si definisce sterile se è: | privo di qualsiasi tipo di microrganismo, anche sotto forma di spora | nessuna delle altre risposte è corretta | privo di microrganismi patogeni | privo di microrganismi non patogeni | IGIENE |
| 1519 | Il lavaggio sociale delle mani: | prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani | si effettua solo dopo aver effettuato una medicazione | non è necessario se si indossano i guanti | si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio | IGIENE |
| 1520 | Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da legionellosi, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori? | Sono sufficienti le precauzioni standard: non sono necessari dispositivi di protezione individuale aggiuntivi in quanto la malattia non è trasmessa da persona a persona | Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e filtrante facciale a protezione 10 nei contatti con il malato | Non dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso nei contatti col malato | Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso, filtrante facciale a protezione 10 e occhiali nei contatti con il malato | IGIENE |
| 1521 | La trasmissione di Salmonella typhi avviene: | per via oro-fecale | per via aerea | per via sessuale | per contatto parenterale | IGIENE |
| 1522 | Per "deiscenza di una ferita" si intende: | apertura o mancata chiusura delle labbra della ferita stessa | una ferita che presenta adesioni con superfici contigue | una ferita che presenta espulsione di molti liquidi | una ferita che presenta cellule morte | IGIENE |
| 1523 | Un disinfettante si definisce batteriostatico: | quando inibisce la proliferazione batterica inattivando i microrganismi | quando non è in grado di agire sui virus | quando elimina la carica batterica | quando uccide i batteri inattivandoli | IGIENE |
| 1524 | La lebbra è una malattia provocata da quale dei seguenti microrganismi? | Mycobacterium | Pasteurella | Brucella | Xylella | IGIENE |
| 1525 | Quale tra i seguenti NON è l'agente eziologico di una tossinfezione alimentare? | Clostridium tetani | Bacillus cereus | Salmonella enteritidis | Clostridium perfringens | IGIENE |
| 1526 | In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza, è indicato scegliere cateteri: | in silicone o in siliconato in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi | vescicali a tre vie per eseguire lavaggi vescicali in caso di infezioni | vescicali in lattice in caso di cateterizzazioni per lunghi periodi | vescicali a tre vie per eseguire esami uro dinamici e culturali in sicurezza | IGIENE |
| 1527 | Lo smaltimento degli escreti dei soggetti contaminati da tossina botulinica, deve avvenire attraverso: | incenerimento o passaggio in autoclave a temperature di almeno 120 °C | il medesimo percorso dei farmaci scaduti | passaggio in autoclave anche a temperature di 90 °C | incenerimento immediato | IGIENE |
| 1528 | Nel rifacimento del letto occupato: | è utile la presenza di due persone | nessuna delle altre risposte è corretta | è utile chiedere al paziente di mantenere il respiro | è importante obbligare tutti gli altri pazienti a uscire dalla stanza | IGIENE |

IGIENE - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|--|---|--|--|--------|
| 1529 | Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta ERRATO per la prevenzione di crampi addominali, flatulenza e distensione gastrica? | Al termine dell'alimentazione eseguire un lavaggio del lume della sonda, disconnettere la siringa e solo successivamente clampare la sonda | Al termine della somministrazione, eseguire il lavaggio del lume, clampare la sonda e solo successivamente disconnettere la siringa o il circuito | A ogni somministrazione, riempire la siringa a cono centrale con la formula alimentare, rimuovendo eventuali bolle d'aria formatesi durante l'aspirazione della stessa | All'inizio della somministrazione, clampare la sonda gastrostomica o il sondino nasogastrico, rimuovere il tappo e successivamente connettere la siringa a cono centrale o il circuito | IGIENE |
| 1530 | Indicare la sequenza corretta delle azioni che l'infermiere deve compiere per eseguire l'igiene delle mani con soluzione alcolica. 1. Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani. 2. Frizionare con la mano destra, con movimento rotatorio, in avanti e indietro le dita strette tra di loro nel palmo sinistro e viceversa. 3. Frizionare con il palmo della mano destra il dorso della mano sinistra, intrecciando le dita tra di loro e viceversa. 4. Frizionare palmo contro palmo, intrecciando le dita tra di loro. 5. Frizionare le mani palmo contro palmo. 6. Frizionare il dorso delle dita con il palmo opposto tenendo le dita strette tra di loro. 7. Frizionare, con movimento rotatorio, il pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa. | 1 - 5 - 3 - 4 - 6 - 7 - 2 | 1 - 7 - 5 - 6 - 2 - 3 - 4 | 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 3 - 5 | 7 - 5 - 3 - 2 - 6 - 1 - 4 | IGIENE |
| 1531 | Durante le manovre di igiene intima del paziente allettato: | è preferibile posizionare la padella e si procede al lavaggio con acqua e sapone | si fa assumere al paziente il decubito laterale per consentire un migliore accesso alle regioni da pulire con disinfettante sterile | si utilizza acqua tiepida con soluzione iodata | nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1532 | Per quali tipi di patogeni vengono utilizzati gli antibiotici? | I Batteri | I Funghi | I Virus | Nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1533 | La clorexidina è un disinfettante che agisce: | sui miceti e sui batteri gram-positivi e gram-negativi | sui miceti, sulle spore e sui virus | sui batteri gram-positivi e sui virus | nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1534 | Per la prevenzione delle infezioni CVC correlate è raccomandato di praticare l'igiene delle mani: | prima e dopo la palpazione della sede d'inserzione | solo prima della palpazione della sede d'inserzione | solo prima delle procedure di sostituzione | nessuna delle altre risposte è corretta | IGIENE |
| 1535 | La pulizia dell'orifizio anale viene eseguita con il paziente: | posizionato sul fianco | nessuna delle altre risposte è corretta | in posizione prona | in posizione Fowler | IGIENE |
| 1536 | Uno degli scopi di una medicazione a piatto attuata su una ferita chirurgica semplice in via di normale guarigione è: | proteggere da infezioni | ritardare la cicatrizzazione | prevenire il sanguinamento | rilasciare endorfine | IGIENE |
| 1537 | La trasmissione dell'epatite C (HCV): | avviene per via ematica | nessuna delle altre risposte è corretta | avviene per via respiratoria | non è dimostrata scientificamente | IGIENE |
| 1538 | Un soggetto allergopatico che deve subire un intervento chirurgico in anestesia generale viene sottoposto a una premedicazione. Tale procedura prevede l'utilizzo di: | cortisonici | antipiretici | probiotici | antibiotici | IGIENE |

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| Id | Quesito | Risp_esatta | Risp_errata 1 | Risp_errata 2 | Risp_errata 3 | Materia |
|------|--|--|--|---|---|------------------------|
| 1539 | Le aziende sanitarie dispongono di un patrimonio proprio? | Sì, secondo i principi che regolano la proprietà privata | No, perché i beni di cui dispongono sono di proprietà dello Stato | No, perché i beni di cui dispongono sono di proprietà della Regione | No, perché i beni di cui dispongono sono di proprietà del Comune | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1540 | Chi, secondo il D.Lgs. 229/1999, provvede all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture pubbliche o private? | Le Regioni | Il Governo | Le ASL | Il Ministero della Salute | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1541 | Le mutue sono state abolite definitivamente dalla legge 833/1978? | Sì | In parte | No | Solo alcune | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1542 | Il Direttore generale di un'ASL è coadiuvato: | Dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario | Dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario e da un coordinatore dei servizi sociali | Dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario e dal Collegio dei revisori | Dal Direttore amministrativo, dal Direttore generale e dal Collegio sindacale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1543 | Chi istituisce e delimita le singole ASL? | Le Regioni | I Comuni | Lo Stato | Il Ministero della salute | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1544 | La Carta dei servizi sanitari, con quale delle seguenti norme è stata introdotta? | Con il D.P.C.M. 19 maggio 1995 | Con la L. 833/1978 | Con la L. 502/1992 | Nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1545 | L'Istituto Superiore di Sanità è: | un organo tecnico e scientifico del SSN | un'azienda privata | un dipartimento del Ministero della salute | un organo privato afferente al Ministero della salute | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1546 | Il Piano Sanitario Nazionale ha durata: | triennale | quadriennale | biennale | quinquennale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1547 | Il Direttore amministrativo di una ASL: | è nominato dal Direttore generale | è nominato dalla Regione | è scelto mediante pubblico concorso | è nominato dal Ministro della Salute | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1548 | Il Direttore sanitario di una ASL: | ha meno di 65 anni | può avere qualsiasi età | ha più di 65 anni | nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1549 | Il Direttore sanitario di una ASL: | è nominato dal Direttore generale | è nominato dalla Regione | è scelto mediante pubblico concorso | è nominato dal Ministero della Salute | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1550 | Cosa sono i SERT? | Servizi per le tossicodipendenze | Servizi immunotrasfusionali | Servizi di vigilanza sanitaria | Nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1551 | Quale tra le seguenti attività non rientra in quelle che il distretto garantisce? | Attività di ricovero ordinario | Assistenza specialistica ambulatoriale | Assistenza termale | Assistenza residenziale e semiresidenziale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1552 | Il bilancio di previsione di un'azienda sanitaria viene approvato? | Dalla Regione | Dalla Provincia | Dal Ministero della salute | Dal Sindaco | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1553 | Cosa significa l'acronimo IRCCS? | Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico | Istituto di ricovero a carattere scientifico | Istituto di ricovero convenzionato a carattere scientifico | Istituto di riabilitazione convenzionato a carattere specialistico | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1554 | Da quale delle seguenti norme è disciplinata l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG)? | Dalla L. 194/1978 | Dalla L. 502/1992 | Dalla L. 833/1978 | Nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1555 | Il collegio sindacale di una ASL dura in carica: | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1556 | Di chi è la competenza dell'organizzazione sanitaria militare, secondo la legge 833/1978? | Dello Stato | Delle Regioni | Del Governo | Del Ministero della Salute | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1557 | Le funzioni delegate alle Regioni dalla legge 833/1978 includono anche: | Controlli della produzione dei gas tossici e di sostanze pericolose | Produzione di prodotti dietetici | Produzione di attrezzature per il commercio e il deposito di sostanze radioattive | Nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1558 | Il D.P.R. 257/1971 ha istituito: | il Consiglio superiore di sanità | il Consiglio sanitario nazionale | il Ministero della Salute | tutte le altre risposte sono corrette | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1559 | Quale ulteriore organo è previsto dal D.Lgs. 517/1999 per le aziende ospedaliere universitarie rispetto alle aziende sanitarie locali? | l'organo di indirizzo | il Consiglio dei sanitari | il Collegio sindacale | il Collegio di direzione | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1560 | Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore generale sono disciplinate: | dalla Regione | dal Ministero della Salute | dal Direttore sanitario | dalla Regione, sentito il parere del Ministero della Salute | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1561 | Con il D.M. 6 luglio 2010, n. 167 il Ministero ha dettato la disciplina di quale Osservatorio? | Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità | Osservatorio nazionale rifiuti | Osservatorio nazionale volontariato | Osservatorio nazionale screening | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1562 | In quale testo normativo è contenuta la frase: «Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, se non per disposizione di legge»? | Nella Costituzione | Nel Codice penale | Nel Codice civile | Nel Codice deontologico | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1563 | Il decreto legislativo 81/2008 si applica: | A tutti i settori lavorativi | Solo ai settori privati | Solo ai settori pubblici con tipologia di lavoro a rischio | Solo ai settori privati con tipologie di lavoro a rischio | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1564 | Nell'ambito dell'attività di farmacovigilanza, l'AIFA: | predispone piani di controllo dei medicinali in commercio | esercita la vigilanza sugli istituti zooprofilattici | esercita la vigilanza sui laboratori per il controllo sull'attività sportiva | effettua controlli su vaccini | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1565 | Il fascicolo sanitario elettronico (FSE): | copre l'intera vita del paziente | dura un anno | dura dieci anni dura cinque anni | nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|---|------------------------|
| 1566 | Quale provvedimento ha dato attuazione al fascicolo sanitario elettronico? | Il D.P.C.M. 29-9-2015, n. 178 | Il D.M. 2-11-2011 | Il D.M. 2-7-2012 | Il D.P.C.M. 20-6-2011 | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1567 | L'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori pone il divieto al datore di lavoro di effettuare, in qualsiasi forma e ai fini dell'assunzione, indagini: | sulle opinioni di religione, politiche e sindacali | sullo stato di salute | sulle condizioni sociali | tutte le altre risposte sono corrette | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1568 | La Circolare del Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute) del 1985, n. 52 è intitolata: | lotta contro le infezioni ospedaliere | lotta contro il lavoro in nero | lotta contro la malpratica | nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1569 | I Comitati infezioni ospedaliere (CIO) sono formati: | da team multidisciplinari | da ingegneri e infettivologi | da chirurghi e infermieri | dai preposti di tutti i reparti di un'azienda ospedaliera | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1570 | Lo stato di necessità è disciplinato: | dal Codice penale | dal Codice civile | dal Codice deontologico | dalla Costituzione | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1571 | L'interdizione è prevista per: | il maggiore di età e il minore emancipato, dalla quale infermità mentale deriva l'incapacità di provvedere ai propri interessi | il maggiore di età e il minore non emancipato, dalla quale infermità mentale deriva l'incapacità di provvedere ai propri interessi | il maggiore di età e tutti i minori, dalla quale infermità mentale deriva l'incapacità di provvedere ai propri interessi | nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1572 | Secondo quanto previsto dalla Costituzione, un trattamento sanitario è: | obbligatorio solo se previsto dalla legge | sempre obbligatorio | sempre facoltativo | nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1573 | Il collegio medico predisposto per l'accertamento di morte di un paziente deve esprimere: | un giudizio unanime | un giudizio per ogni professionalità afferente al collegio | non sempre un giudizio unanime | nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1574 | Il D.Lgs. 7-12-1993, n. 517 ha modificato: | il D.Lgs. 502/1992 | la L. 833/1978 | la L. 42/1999 | nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1575 | Le ASL godono di: | personalità giuridica pubblica | personalità giuridica privata | autonomia giuridica | nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1576 | Quale articolo della Costituzione parla di ispezione personale? | Articolo 13 | Articolo 22 | Articolo 12 | Articolo 43 | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1577 | L'Hospice è: | una residenza per pazienti terminali | un istituto di ricerca oncologica | una struttura di supporto per minori abbandonati | una struttura per anziani disabili | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1578 | Qual è la funzione primaria del Ministero della Salute? | La tutela e la salvaguardia della salute pubblica | Il coordinamento delle Regioni, Comuni e Province in materia sanitaria | Il coordinamento delle Aziende Sanitarie | La scelta degli interventi e dei farmaci | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1579 | Il D.L. 158/2012 (cd. decreto Balduzzi), in riferimento all'assistenza sanitaria primaria, ha introdotto: | la creazione di aggregazioni funzionali territoriali e unità complesse di cure primarie | la separazione operativa tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti | l'erogazione delle cure primarie nei soli ospedali | la creazione di ambulatori separati | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1580 | Chi individua i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)? | Lo Stato | Le Regioni | Le Province | Le ASL | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1581 | La sigla AIFA è l'acronimo di: | Agenzia Italiana del Farmaco | Associazione Italiana Farmacie | Associazione italiana del Farmaco Alternativo | Associazione Italiana Farmacisti | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1582 | Secondo il D.Lgs. 502/1992, entro quanti giorni deve avvenire la nomina del Direttore generale in caso di vacanza dell'ufficio? | 60 giorni | 90 giorni | 15 giorni | 30 giorni | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1583 | Le prescrizioni farmaceutiche elettroniche sono: | fruibili su tutto il territorio nazionale e su quello regionale | non sono possibili | fruibili solo sul territorio nazionale | fruibili solo sul territorio regionale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1584 | Cosa significa l'acronimo ECM? | educazione continua in medicina | educazione contrattuale in medicina | nessuna delle altre risposte è corretta | esperimenti continui in medicina | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1585 | Secondo la legge 833/1978, le funzioni amministrative delegate alle Regioni sono: | sub-delegate ai Comuni | non vengono delegate | nessuna delle altre risposte è corretta | sub-delegate alle Province | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1586 | Quale delle seguenti strutture non appartiene al Consiglio superiore di sanità: | Istituto superiore di sanità | Segretariato generale | Sezioni | Comitato di presidenza | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1587 | Il Ministro della salute presiede l'AIFA ? | No | Sì, solo quando si prendono decisioni di direttivo | Sì, solo in casi specifici | Sì, sempre | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1588 | Quale dei seguenti provvedimenti ha predisposto il passaggio alle Regioni ordinarie delle competenze in materia sanitaria? | Il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 | Il D.P.R. 16 gennaio 1973, n. 5 | Il D.P.R. 18 gennaio 1970, n. 7 | Il D.P.R. 17 gennaio 1971, n. 6 | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1589 | La relazione sullo stato di salute del paese è tenuta da quale tra queste autorità? | Il Ministero della Salute | Il Consiglio superiore di sanità | L'Istituto superiore di sanità | Il Governo | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1590 | Il Piano Sanitario Regionale (PSR) ha una durata di: | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 2 anni | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1591 | Chi secondo quanto previsto nel D.Lgs. 502/1992, presiede il Consiglio dei sanitari? | Il Direttore sanitario | Il Direttore amministrativo | Il Coordinatore dei servizi sociali | Il Direttore generale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1592 | Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, le funzioni dell'ISPESL sono state trasferite: | all'INAIL | all'Istituto superiore di sanità | al Ministero della salute | all'INPS | LEGISLAZIONE SANITARIA |

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 1593 | Cosa si intende per sorveglianza sanitaria? | Insieme di atti medici, finalizzati alla salute e sicurezza dei lavoratori | Insieme di visite specialistiche offerte ai lavoratori | Ciclicità dei controlli medici e non offerti ai lavoratori | Periodicità dei controlli medici dei lavoratori | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1594 | Una lavoratrice: | non può essere licenziata dall'inizio della gravidanza fino a tutto il periodo di interdizione dal lavoro prescritto dalla legge | non può essere licenziata dalla fine della gravidanza fino al compimento di due anni di età del bambino | nessuna delle altre risposte è corretta | non può essere mai licenziata | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1595 | La Circolare del Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute) del 1985, n. 52 ha istituito: | l'infermiera addetta al controllo delle infezioni | il servizio di prevenzione e protezione | nessuna delle altre risposte è corretta | i comitati volontari in materia di infezioni ospedaliere | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1596 | Secondo l'articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute è: | fondamentale | importante | obbligatorio | imprescindibile | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1597 | Quale dei seguenti è uno strumento ordinario di raccolta dei dati di pazienti ricoverati presso istituti di ricovero pubblici e privati? | La cartella clinica | La SDO | Nessuna delle altre risposte è corretta | Il modello ISTAT | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1598 | La SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) deve essere firmata: | dal medico curante e dal Responsabile di divisione | dal Responsabile di divisione e dal Direttore sanitario | dal Direttore generale e dal medico curante | dal medico curante | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1599 | Chi, nell'ambito dell'organizzazione aziendale verifica l'idonea compilazione e trasmette le schede di dimissioni ospedaliere al Ministero della Salute e alla Regione? | il Direttore sanitario | il Direttore amministrativo | il Primario della divisione | il Direttore generale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1600 | La legge 22-5-1978, n. 194 disciplina: | l'interruzione volontaria di gravidanza | il parto in anonimato | nessuna delle altre risposte è corretta | la potestà genitoriale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1601 | Secondo la normativa vigente, la morte di un paziente: | si identifica con la cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo | si identifica con la cessazione di tutte le funzioni cardiache | si identifica con la cessazione di tutte le funzioni respiratorie | si identifica con la cessazione di tutte le funzioni circolatorie | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1602 | Secondo le uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale, riportate nella legge 833/1978, lo Stato detta norme dirette ad assicurare condizioni di salute in materia di: | tutela igienica degli alimenti e delle bevande | tutela della maternità a rischio | tutte le altre risposte sono corrette | tutela dei lavoratori nei cantieri | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1603 | Il Direttore sanitario di un'azienda sanitaria è laureato: | in medicina e chirurgia | non è laureato | in qualsiasi disciplina | in economia | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1604 | A quale periodo risale il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)? | 1992 – 1993 | 1980 – 1981 | 1990 – 1991 | 1994 – 1995 | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1605 | Secondo il D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999, il SSN è: | il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi sanitari regionali e degli enti ed istituti di rilievo nazionale | il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi sanitari regionali | l'insieme dei piani e strategie sanitarie regionali | un metodo di programmazione pluriennale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1606 | Chi nomina il Direttore sanitario di un'azienda sanitaria? | Il Direttore generale | La nomina avviene per concorso pubblico | La Regione | Il Direttore amministrativo | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1607 | Chi sostituisce il Direttore generale di un'azienda sanitaria in caso di assenza o impedimento? | Il Direttore amministrativo o il Direttore sanitario con precedenza per il più anziano | Sempre il Direttore sanitario | Sempre il Direttore amministrativo | Un coordinatore qualificato | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1608 | In base al principio di sussidiarietà costituzionale, secondo quanti diversi livelli di responsabilità e di governo è articolato il SSN? | Due, quello centrale e quello regionale | Uno, quello regionale | Uno, quello centrale | Due, quello centrale e quello locale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1609 | Con quale delle seguenti norme è stato istituito il Sistema Sanitario Nazionale? | Dalla L. 833/1978 | Dalla L. 833/1972 | Dal D.Lgs. 502/1992 | Dall'articolo 32 della Costituzione | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1610 | In quale dei seguenti casi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 502/1992, alle Regioni non è consentito l'accreditamento di nuove strutture? | Nel caso in cui non venga adottato il Piano Sanitario Regionale dopo un anno dall'entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale | Nessuna delle altre risposte è corretta | In caso di mancanza di fondi | In caso di sovrannumero di strutture accreditate | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1611 | Alla luce della normativa vigente, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria, spettano: | alle Regioni e alle Province autonome | al Ministero della Salute | ai Comuni | al Governo | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1612 | Il Direttore amministrativo di una ASL: | è laureato in discipline giuridico/economiche | nessuna delle altre risposte è corretta | è laureato in medicina e chirurgia | non è laureato | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1613 | Secondo l'articolo 32 della Costituzione, i trattamenti sanitari: | sono scelti liberamente dall'interessato, salvi i casi previsti dalla legge | sono scelti dall'interessato su consiglio medico | sono scelti dal medico | sono scelti dall'interessato | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1614 | Cosa compete al collegio sindacale di un'azienda sanitaria? | La verifica della legittimità degli atti | Nessuna delle altre risposte è corretta | L'analisi dei costi | Le strategie di organizzazione | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1615 | Il principio in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento se non per disposizione di legge è contenuto: | nella Costituzione | nel T.U. leggi sanitarie | nel D.Lgs. 502/1992 | nello statuto dei lavoratori | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1616 | Quale dei seguenti organismi svolge attività di ricerca nel campo sanitario? | il Ministero della Salute | la Regione | l'Azienda ospedaliera | l'Azienda sanitaria | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1617 | Il trattamento per i disturbi mentali è: | volontario e, talvolta, obbligatorio | non c'è alcuna specifica previsione | sempre volontario | sempre obbligatorio | LEGISLAZIONE SANITARIA |

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|---|---|--|--|------------------------|
| 1618 | Il sindaco, secondo la L. 833/1978, è: | l'autorità sanitaria locale | il commissario della giunta regionale | il commissario del Ministero della Salute | l'autorità governativa locale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1619 | Cosa si intende per accreditamento istituzionale? | Le autorizzazioni ad erogare prestazioni per conto del SSN | Nessuna delle altre risposte è corretta | L'erogazione di prestazioni sanitarie per conto della Regione | La trasformazione di una struttura privata in pubblica | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1620 | Che cosa si intende per TEAM? | La tessera europea di assicurazione malattia | La tessera di identità | La tessera sanitaria | Il codice fiscale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1621 | Il Fondo perequativo nazionale ha introdotto quale delle seguenti norme? | La L. Cost. 3/2001 | Il D.P.C.M. 15 Maggio 1995 | La L. 502/1992 | La L. 833/1978 | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1622 | Secondo il decreto legislativo 81/2008, al termine pericolo va dato il significato di: | tutte le altre risposte sono corrette | nessuna delle altre risposte è corretta | proprietà intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni | qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1623 | Quale fonte giuridica stabilisce che il diritto di sciopero è esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano? | La Costituzione | Il Codice deontologico | Il Codice penale | Il Codice civile | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1624 | Il D.Lgs. 196/2003 ha introdotto il concetto di: | privacy | diritto di informazione | diritto di cura | diritto di partecipazione | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1625 | Con quale delle seguenti norme è stata introdotta in Italia la Scheda di Dimissione Ospedaliera? | Con il D.M. 28/12/1991 | Con Circolare del Ministero della Sanità n. 52 del 1985 | Con la L. 502/1992 | Con la L. 833/1978 | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1626 | Chi ha diritto di accedere ai documenti amministrativi, secondo la L. 241/1990? | Chiunque abbia un interesse da tutelare che sia giuridicamente rilevante | Nessuno | Solo l'interessato | I parenti degli interessati | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1627 | In quali dei seguenti casi un infermiere facente parte di una equipè dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia non può avvalersi dell'obiezione di coscienza? | Quando il suo intervento è indispensabile per la salute della donna | Quando non si configura uno stato di necessità | Quando a richiederla è una minore di anni 18 | Quando a richiederla è una donna che ha già praticato una interruzione | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1628 | I componenti del collegio medico accertante l'avvenuta morte di un paziente sono: | un medico legale, un medico specialista in rianimazione e un neurofisiopatologo | due medici | un medico specialista in rianimazione e un medico legale | un neurologo e un medico legale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1629 | Quale tra i seguenti non è un organo del Consiglio Superiore di Sanità? | Il Ministro della Salute | L'Assemblea generale | Il Comitato di presidenza | Le Cinque sezioni | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1630 | La cartella clinica è conservabile: | anche solo in forma digitale, anche dalle strutture private accreditate | solo su supporto cartaceo | solo in forma digitale | anche solo in forma digitale esclusivamente dalle strutture pubbliche | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1631 | Le prestazioni sanitarie dell'azienda sanitaria locale sono erogate attraverso: | Distretti sanitari | Collegi di direzione | Mandamenti | Circoscrizioni | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1632 | L'osservatorio nazionale di farmacovigilanza è uno strumento di controllo e monitoraggio: | dell'AIFA | dell'Istituto Superiore di Sanità | del Consiglio Superiore di Sanità | del Ministero della Salute | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1633 | Chi presiede il Consiglio superiore di sanità? | Nessuna delle altre risposte è corretta | Il Presidente della Repubblica | Il Presidente del Consiglio | Il Ministro della salute | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1634 | Il Direttore amministrativo è un organo dell'azienda sanitaria? | No | Sì | No, tranne casi particolari | Sì, di concerto con il direttore sanitario | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1635 | I dipartimenti di prevenzione garantiscono funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, tra le quali non rientrano: | l'assistenza specialistica ambulatoriale | la prevenzione e controllo di malattie infettive | la sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori | la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1636 | Con l'acronimo RSA si intende: | le residenze sanitarie assistenziali | la rappresentanza sindacale autorizzata | il riconoscimento scientifico di accreditamento | la responsabilità sanitaria e amministrativa | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1637 | Quali sono le funzioni del Collegio di direzione di una ASL? | Coadiuvare il Direttore generale per il governo delle attività cliniche | La consulenza tecnico-sanitaria | Vigilare sulla regolarità amministrativa e contabile | Vigilare sull'osservanza della legge | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1638 | L'ufficio relazioni con il pubblico (URP) è stato introdotto: | nessuna delle altre risposte è corretta | con L. 502/1992 | con L. 833/1978 | con D.P.C.M. 19 Maggio 1995 | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1639 | Chi viene rappresentato nella commissione mista conciliativa? | Tutte le altre risposte sono vere | La Regione | Gli Organismi di volontariato e tutela | L'ASL | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1640 | Secondo il decreto legislativo 81/2008 il lavoratore è: | tutte le altre risposte sono vere | una persona che svolge un'attività indipendentemente dalla tipologia di contratto | una persona che svolge un'attività e che percepisce o non una retribuzione | una persona che svolge un'attività al solo fine di apprendere un mestiere | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1641 | Su quale, tra i seguenti servizi, non è basato il funzionamento dei consultori familiari: | prestazioni alberghiere (vitto e alloggio) | servizio ginecologico | corsi di preparazione al parto | assistenza al singolo e alla coppia | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1642 | Qual è tra le seguenti la fonte disciplinare degli obblighi del personale dipendente del SSN? | La contrattazione collettiva | Il testo unico delle leggi sanitarie | La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale | Il codice civile | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1643 | Quale articolo dell'allegato n. 7 del D.P.C.M. 19-5-1995 prevede che il paziente ha diritto di ottenere segretezza riguardo alla propria malattia? | Articolo 7 | Articolo 3 | Articolo 4 | Articolo 5 | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1644 | Per quanti anni deve essere conservato il registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope delle unità operative? | 2 anni | 4 anni | 10 anni | 15 anni | LEGISLAZIONE SANITARIA |

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|---|--|---|---|------------------------|
| 1645 | Cosa si intende per responsabilità penale? | Responsabilità che deriva dalla commissione di un reato | Responsabilità che deriva da un atto illecito che arreca danno patrimoniale | Responsabilità che deriva dalla violazione di un regolamento di disciplina | Nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1646 | La legge 10 agosto 2000, n. 251 ha introdotto: | la dirigenza infermieristica | l'ordine degli infermieri | la dirigenza infermieristica e l'ordine degli infermieri | nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1647 | Secondo la legge 1 febbraio 2006, n. 43, l'aggiornamento professionale avviene con modalità: | identiche a quelle mediche | obbligatorie | facoltative | nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1648 | L'articolo 3 della legge 1 febbraio 2006, n. 43: | istituisce gli ordini delle professioni sanitarie | delega il Governo per l'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie | delinea il profilo dirigenziale infermieristico | nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1649 | La cartella clinica è: | un atto pubblico redatto da pubblico ufficiale | un atto pubblico redatto da incaricato di pubblico servizio | un atto privato redatto da medico o infermiere | un atto privato redatto da operatore sanitario | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1650 | Qual è il braccio operativo di un Dipartimento di salute mentale? | Il Centro di salute mentale | Il Centro notturno | Il Dipartimento stesso | Il Distretto | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1651 | L'aggettivo venefico è utilizzato dal codice penale per contraddistinguere un mezzo: | insidioso | doloso | tossico | lesivo | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1652 | Cosa si intende per negligenza? | Omissione di atto doveroso | Mancanza di professionalità | Mancanza di impegno | Nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1653 | La responsabilità penale è: | personale | di tutta l'equipè | solo del medico | nessuna delle altre risposte è corretta | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1654 | In base al D.M. 739/1994, l'infermiere agisce: | sia individualmente che in collaborazione | solo in collaborazione | senza alcuna autonomia | individualmente | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1655 | Quali dei seguenti articoli disciplina la rivelazione del segreto professionale? | Articolo 622 del codice penale | Articolo 623 del codice penale | Nessuna delle altre risposte è corretta | Articolo 621 del codice penale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1656 | Con quale delle seguenti norme è disciplinato il reato di falsità materiale? | Articolo 477 del codice penale | Articolo 326 del codice penale | Articolo 483 del codice penale | Articolo 622 del codice penale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1657 | Quale tra i seguenti non rientra nel percorso previsto per la qualità nell'utilizzo della cartella infermieristica? | Diagnosi medica | Attuazione dell'assistenza | Valutazione finale | Pianificazione dell'assistenza | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1658 | Cosa si intende per responsabilità civile? | Responsabilità che deriva da un atto illecito che arreca danno patrimoniale | Responsabilità che deriva dalla violazione di un regolamento di disciplina | Nessuna delle altre risposte è corretta | Responsabilità che deriva dalla commissione di un reato | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1659 | L'infermiere: | sostiene i familiari e le persone di riferimento dell'assistito | sostiene solo i familiari | assiste solo il paziente | non è tenuto a sostenere i familiari dell'assistito | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1660 | La cartella clinica, in ambito legislativo, gode: | di fede privilegiata | di relativa importanza | di fondamentale importanza | di particolare importanza | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1661 | La cartella clinica è: | a formazione progressiva | a formazione settimanale | nessuna delle precedenti | a formazione ciclica | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1662 | La documentazione infermieristica: | ha valore di atto pubblico in senso lato | ha valore di atto pubblico in senso stretto | non ha valore | ha valore certificativo | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1663 | In quale dei seguenti casi è possibile richiedere ad un altro reparto farmaci stupefacenti? | In casi di emergenza | In casi gravissimi | Non è mai possibile | In casi di urgenza | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1664 | L'infermiere: | conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l'assistito | ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico-terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e sulla relazione con la persona | non riceve alcuna informazione relativa al progetto diagnostico-terapeutico | non conosce il progetto diagnostico dell'assistito | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1665 | Chi, tra l'incaricato di pubblico servizio e il pubblico ufficiale, può incorrere nel reato di rivelazione ed utilizzazione del segreto di ufficio? | Entrambi | Nessuno dei due | Solo il Pubblico Ufficiale | Solo l'incaricato di Pubblico Servizio | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1666 | Quale articolo disciplina il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreto di ufficio? | Articolo 326 del codice penale | Nessuna delle altre risposte è corretta | Articolo 325 del codice penale | Articolo 327 del codice penale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1667 | Qual è la differenza tra la cartella clinica e la cartella infermieristica, dal punto di vista giuridico? | La cartella clinica è atto pubblico in senso stretto, la cartella infermieristica in senso lato | La cartella infermieristica è atto pubblico in senso stretto | Nessuna poiché entrambe possono essere redatte dal medico o dall'infermiere | La cartella clinica è atto pubblico in senso lato | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1668 | Cosa si intende per responsabilità disciplinare? | Responsabilità che deriva dalla violazione di un regolamento di disciplina | Nessuna delle altre risposte è corretta | Responsabilità che deriva dalla commissione di un reato | Responsabilità che deriva da un atto illecito che arreca danno patrimoniale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1669 | Un reato colposo è caratterizzato da: | negligenza, imprudenza e imperizia | nessuna delle altre risposte è corretta | proposito deliberato di produrre l'evento | preterintenzione | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1670 | Una lesione personale si dice lieve quando produce una malattia: | superiore ai 20 giorni ma inferiore ai 40 | inferiore ai 40 giorni | non superiore ai 20 giorni | superiore ai 20 giorni ma inferiore ai 30 | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1671 | Una lesione personale si dice grave quando produce una malattia: | superiore ai 40 giorni | inferiore ai 50 giorni | superiore ai 20 giorni | superiore ai 30 giorni | LEGISLAZIONE SANITARIA |

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|------------------------|
| 1672 | Un infermiere che compila una scheda di triage è: | pubblico ufficiale | Nessuna delle altre risposte è corretta | incaricato di pubblico servizio | ausiliario | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1673 | Quale dei seguenti articoli punisce l'esercizio abusivo della professione? | articolo 348 del codice penale | articolo 2278 del codice penale | articolo 326 del codice penale | articolo 456 del codice penale | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1674 | Quale articolo della legge 10 agosto 2000, n. 251 disciplina la professione sanitaria infermieristica? | Articolo 1 | Nessuna delle altre risposte è corretta | Articolo 3 | Articolo 2 | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1675 | Secondo la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 «Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina», in una situazione di urgenza, ove il paziente interessato non è in grado di conferire consenso, l'intervento: | viene effettuato immediatamente | non viene effettuato | mira a limitare i danni | è procrastinato | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1676 | Quale tra le seguenti non rientra tra le attribuzioni dell'infermiere? | Identificazione dei bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici | Respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno | Somministrazione dei medicinali prescritti | Assistenza completa dell'infermo | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1677 | L'iscrizione all'Ordine per un infermiere è: | è necessaria in ogni caso | indispensabile per essere assunti in strutture private | necessaria per esercitare la professione | indispensabile per essere assunti in strutture pubbliche | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1678 | Secondo il D.M. 16-12-2010, gli infermieri possono erogare all'interno delle farmacie: | prestazioni professionali specifiche | prestazioni specialistiche | prestazioni di medicina non convenzionale | prestazioni di assistenza odontoiatrica | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1679 | Chi accerta la corretta tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope delle unità operative? | Il Direttore del servizio farmaceutico | Il Coordinatore infermieristico | Il Dirigente medico | Il Direttore sanitario | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1680 | La denominazione Professione sanitaria ausiliaria, sostituita con la legge 42/1999 dalla denominazione Professione sanitaria era contenuta: | nel R.D. 1265/1934 | nel R.D. 1275/1934 | nel R.D. 1268/1934 | nel R.D. 1224/1934 | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1681 | La modifica apportata all'articolo 1 della legge in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (legge 3 aprile 2001, n. 120) consente l'uso degli stessi: | al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario | al solo personale medico | al personale sanitario non medico | al solo personale sanitario non medico | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1682 | Quali sono le finalità dell'assistenza dell'infermiere pediatrico? | Preventive, riabilitative, palliative | Solo palliative | Solo preventive | Solo riabilitative | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1683 | Secondo la normativa vigente, quale tra le seguenti non è una responsabilità giuridica dell'infermiere? | Morale | Penale | Civile | Disciplinare | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1684 | Cosa si intende per imperizia? | Tutte le altre risposte sono corrette | Mancanza di esperienza | Mancanza di competenza | Mancanza di abilità | LEGISLAZIONE SANITARIA |
| 1685 | Nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM), è da ritenersi esonerato dall'obbligo di acquisizione dei crediti per tutto il periodo di formazione, il personale sanitario che: | Frequenta corsi annuali di formazione post laurea propri del profilo di appartenenza | Opera come libero professionista | Presta il servizio in strutture private | Non ha ancora completato il periodo di prova | |
| 1686 | L'operazione di scarico di una sostanza stupefacente o psicotropa nell'apposito registro deve essere firmata: | Dall'operatore che esegue la somministrazione | Dal Coordinatore Infermieristico dell'Unità Operativa | Dal Direttore di Farmacia | Dai medici dell'Unità Operativa | |
| 1687 | Com'è chiamata la raccolta dei dati effettuata nel momento in cui il paziente entra nella struttura sanitaria o viene preso in carico? | Accertamento iniziale | Valutazione | Accertamento diagnostico | Diagnosi infermieristica | |
| 1688 | Che cosa si intende per aggiornamento professionale? | Attività successiva al corso di laurea diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze e le competenze professionali | Attività formativa svolta durante il corso di laurea | Attività successiva al corso di laurea obbligatoria solo per gli infermieri libero professionisti | Nessuna delle altre risposte è corretta | |
| 1689 | Per Evidence Base Nursing si intende: | Il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica e le preferenze del paziente, in un contesto di risorse disponibili | Il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando la loro esperienza clinica in un contesto di risorse disponibili | Il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica, in un contesto di risorse disponibili | Il processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, le preferenze del paziente, in un contesto di risorse disponibili | |
| 1690 | Per ospedalizzazione domiciliare si intende: | L'insieme delle prestazioni altamente specialistiche, di prassi erogate in ospedale, garantite al domicilio | L'accesso quotidiano del malato cronico in ospedale tramite regime di day-hospital | La fornitura di apparecchiature per la cura dei malati terminali al domicilio | Nessuna delle altre risposte è corretta | |

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|---|--|---|---|--|
| 1691 | In quale delle seguenti situazioni deve essere esplicitamente richiesto il consenso informato in forma scritta? | Sia per la trasfusione che per la donazione di sangue | Solo ed unicamente per le trasfusioni di sangue | Sia per la trasfusione che per la donazione di sangue, ad eccezione dei servizi di pronto soccorso | Nessuna | |
| 1692 | Chi definisce i LEA (Livelli Essenziali di assistenza)? | Lo Stato | Le Regioni | Le Asl | Il Ministero della Salute | |
| 1693 | La formulazione degli obiettivi nella pianificazione assistenziale: | tutte le altre risposte sono corrette | facilita la definizione degli interventi assistenziali | permette di identificare la situazione attesa in seguito all'assistenza | è fondamentale riferimento per la fase di valutazione | |
| 1694 | Le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni: | Standard ed aggiuntive | Universali | Standard | Per i liquidi biologici in persone con HIV positivo | |
| 1695 | Quale delle seguenti affermazioni rispetto alle precauzioni standard è corretta? | Le precauzioni standard sono destinate all'assistenza di tutti i pazienti in ospedale, indipendentemente dalla diagnosi o dalla condizione di presunta infezione | Le precauzioni standard sono destinate all'assistenza di tutti i pazienti che si recano in ambulatorio | Le precauzioni standard sono destinate all'assistenza di pazienti immunodepressi | Le precauzioni basate sulla trasmissione sono destinate all'assistenza di pazienti nella stessa stanza di degenza | |
| 1696 | Cos'è l'Hospice? | Una residenza per malati in stadio terminale per qualunque patologia | Nessuna delle altre alternative è corretta | Una residenza per malati oncologici in stadio terminale | Un Istituto per la ricerca sul cancro | |
| 1697 | Quando è necessario applicare la procedura per la corretta identificazione del paziente? | Ogni qualvolta deve essere effettuata una prestazione alla persona assistita | Somministrazione di farmaci | Effettuazione di prelievi di sangue o di altri campioni biologici per gli esami clinici | Somministrazione di sangue ed emocomponenti | |
| 1698 | Il D.lgs. N. 81/2008 e s.m.i. titola: | Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro | Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 | Tuel | Testo unico per la regolamentazione dei diritti e dei doveri dei pubblici dipendenti | |
| 1699 | Il Servizio Sanitario Nazionale si fonda: | sul principio dell'universalità delle cure | sulla competizione con le strutture private | sul concetto di SSN come unico fornitore di prestazioni sanitarie | sul coinvolgimento delle assicurazioni | |
| 1700 | Le Regioni possono legiferare in materia sanitaria? | Sì, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale nonché dei Livelli Essenziali di Assistenza, come individuati da quest'ultima | Sì, ma solo su delega statale | No, poiché la tutela della salute è garantita costituzionalmente ed è di competenza esclusiva dello Stato | Sì, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, a esclusione dei Livelli Essenziali di Assistenza di competenza esclusiva dello Stato | |
| 1701 | In Italia, sono iscritti e quindi assistiti dal Servizio sanitario nazionale: | tutti i cittadini | i soli cittadini che ne fanno domanda | i soli cittadini maggiorenni | i soli cittadini in stato di povertà | |
| 1702 | L'iscrizione all'ordine professionale, per l'infermiere: | Rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione, in qualsiasi forma | Non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione | Rappresenta sempre un obbligo di legge | Rappresenta un obbligo ai fini dell'acquisizione del titolo e dell'abilitazione | |
| 1703 | Quali sono i principi fondamentali su cui si basa il servizio sanitario nazionale con la Legge 833/1978? | Universalità, eguaglianza ed equità | Accreditamento e globalità | Gratuità e riduzione dei tempi di attesa per i cittadini italiani | Privacy e sicurezza dei dati | |
| 1704 | Relativamente all'accreditamento di un'organizzazione sanitaria, indicare tra le seguenti alternative quella ERRATA. | L'accreditamento è un insieme di attività non sistematiche eseguite da un'organizzazione prima di offrire un prodotto/servizio al cliente-utente, valutandone e analizzandone i bisogni | Il cosiddetto "accreditamento istituzionale" è obbligatorio per erogare servizi per conto del Sistema Sanitario Nazionale | L'accreditamento è un processo che prevede la valutazione di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi | L'accreditamento è il processo mediante il quale un organismo preposto arriva a riconoscere formalmente che un'organizzazione sanitaria soddisfa determinati requisiti espliciti ed è dunque capace di svolgere determinati compiti | |
| 1705 | Nell'attività d'équipe, la responsabilità penale ricade: | su ogni singolo componente, poiché è strettamente personale e individuale | solo sul capo-équipe e sui medici a lui più vicini | sull'operatore che ha causato il danno | nessuna delle altre alternative è corretta | |
| 1706 | Secondo la Costituzione italiana, la salute: | è un diritto fondamentale della persona e un interesse della collettività | è un bene fondamentale del singolo individuo | non può essere annoverata tra i diritti dell'individuo | è la semplice assenza di malattia | |
| 1707 | L'esercizio abusivo della professione infermieristica è da considerarsi: | un reato penale | un reato civile | non un reato, ma solo un dolo | un reato preterintenzionale | |

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|--|--|---|---|--|
| 1708 | La medicina preventiva si occupa di: | misure atte a conservare e migliorare la salute della comunità | malattie professionali | infortuni sul lavoro | problemi medici aventi rapporto con il diritto | |
| 1709 | In caso di trasfusione di emoderivati, la normativa indica: | l'obbligo del consenso del ricevente e l'astensione dal trasfondere in caso di diniego | il mero obbligo del consenso del ricevente | la necessità del consenso solo per sangue e non per gli emoderivati | l'opportunità del consenso scritto del ricevente | |
| 1710 | L'art. 1 della legge n. 251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria di ostetrica svolgono assistenza: | Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi | Nessuna delle altre alternative è corretta | Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di valutazione multidisciplinare | Con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici Codici Deontologici | |
| 1711 | Le buone pratiche clinico-assistenziali, come declinato dall'Art. 5 della legge 24/2017 (Legge Bianco- Gelli) e s.m.i. in materia di responsabilità sanitaria, devono: | Seguire le raccomandazioni previste dal sistema nazionale delle linee guida | Non debbono seguire necessariamente le raccomandazioni previste dal sistema nazionale delle linee guida | Sono decise dal medico responsabile della cura del malato | Nessuna delle altre risposte è corretta | |
| 1712 | In base al d.lgs. 502/1992, l'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture autorizzate: | dalla Regione | dal Ministero dell'Interno | dalla conferenza Stato-Regioni-Province | dallo Stato o dal Presidente del Consiglio | |
| 1713 | Quali sono le principali funzioni dell'assistenza infermieristica, secondo quanto stabilito dal d.m. 739/1994 (Profilo professionale dell'infermiere)? | Prevenzione delle malattie, assistenza dei malati e dei disabili, educazione sanitaria | Sostenere, assistere e informare la persona e la collettività | Identificazione dei bisogni clinici, pianificazione, attuazione e valutazione degli interventi infermieristici | Collaborazione con gli altri operatori sanitari nel rispetto delle loro specifiche competenze | |
| 1714 | Riferendosi alle attività svolte in collaborazione con il medico e riguardanti l'iter diagnostico e terapeutico, il d.m. 739/1994 stabilisce che l'infermiere: | garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche | per le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, si avvale delle figure di supporto | esegue le prescrizioni diagnostiche stabilite dal medico | prepara il paziente alle procedure terapeutiche | |
| 1715 | I Piani sanitari regionali devono essere approvati: | dalla Regione | dal Consiglio dei Ministri | dal Ministero della Salute e dell'Economia | dal Parlamento, su proposta del Ministero della Salute e di quello delle Infrastrutture | |
| 1716 | Che cosa sono gli Ordini e i Collegi Professionali? | Sono organi di autogoverno di una categoria professionale, sono costituiti per legge di Stato e hanno natura giuridica di ente di diritto pubblico | Sono un'autonoma associazione di persone che, volontariamente, si uniscono per soddisfare i propri comuni bisogni economici, sociali e professionali | Sono costituiti da un insieme di persone fisiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune | Sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizioni territoriali di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, avendo cura di promuovere il loro sviluppo nell'ambito delle economie locali | |
| 1717 | Il d.lgs. 502/1992, nell'ambito delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, prevede che la diversa utilizzazione di una struttura sociosanitaria: | sia sempre soggetta ad autorizzazione | non sia possibile, in quanto si tratta di strutture dedicate | sia soggetta ad autorizzazione solo in caso di modificazione delle tariffe applicate | non sia mai soggetta ad autorizzazione | |
| 1718 | Spesso durante il ricovero ospedaliero si rendono necessari degli interventi diagnostici e/o terapeutici che comportano dei rischi. Per questo motivo è stato necessario introdurre: | il consenso informato quale mezzo per legittimare tali atti | la modulistica informativa da distribuire agli utenti | figure professionali preposte a somministrare ai pazienti la modulistica informativa | la cartella clinica informatizzata, per poter documentare in modo dettagliato tutte le prestazioni erogate | |
| 1719 | Individuare l'affermazione corretta sui Livelli essenziali di assistenza (LEA). | I LEA sono le prestazioni e i servizi che il servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini | I LEA costituiscono le prestazioni di cui tutti i cittadini hanno bisogno per la tutela della propria salute | I LEA costituiscono le linee guida per gli operatori del servizio sanitario nazionale che servono per tutelare il diritto alla salute | I LEA costituiscono i servizi che il sistema sanitario nazionale è in grado di erogare per promuovere la salute e applicare coerentemente il diritto alla sua tutela | |
| 1720 | Secondo la legge 43/2006, quali requisiti sono richiesti per l'affidamento delle funzioni di coordinamento? | Master in coordinamento e tre anni di servizio nello specifico profilo | Laurea di primo livello e cinque anni di servizio nello specifico profilo | Laurea magistrale | Cinque anni di servizio nello specifico profilo | |
| 1721 | Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 502/1992, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): | comprendono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione | nessuna delle altre risposte è corretta | sono definiti dalle Regioni, previo confronto con il Ministero della Salute | si suddividono nei seguenti ambiti: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera, assistenza sociosanitaria | |
| 1722 | Il decreto ministeriale 739 del 14 settembre 1994: | vincola l'esercizio della professione | è un regolamento approvato dall'Ordine delle Professioni, ove esistente | è un regolamento stabilito dall'Associazione Professionale, ove esistente | è un regolamento non vincolante per l'esercizio della professione | |

LEGISLAZIONE SANITARIA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 1723 | Indicare quale fra i seguenti fatti interessanti per la pubblica sanità NON deve essere immediatamente denunciato all'autorità sanitaria e all'ufficiale sanitario. | Patologie cronico-degenerative | Mancato smaltimento di rifiuti pericolosi | Presenza in commercio di medicinali guasti | Adulterazione di sostanze alimentari | |
| 1724 | Indicare, fra quelle elencate, l'affermazione corretta sul segreto professionale. | È un dovere moralmente assoluto e un obbligo giuridico | Si applica alle procedure terapeutiche, non a quelle diagnostiche | La sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dagli Albi dispensano il soggetto dall'osservanza del segreto professionale | La sua rivelazione può essere in forma scritta, ma esclusivamente all'autorità competente | |
| 1725 | Se, pur conoscendo l'importanza del lavaggio delle mani come misura più importante di controllo delle infezioni ospedaliere, si omette volontariamente di adottare questa precauzione prima e dopo aver garantito assistenza ai pazienti, si parla di: | negligenza | imperizia | imprudenza | eccesso di zelo | |
| 1726 | Ai sensi della legge 251/2000, gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche: | svolgono assistenza con autonomia professionale, utilizzando metodologie di pianificazione per gli obiettivi dell'assistenza | non possono svolgere autonomamente attività dirette alla prevenzione e alla cura per la salvaguardia della salute individuale e collettiva | svolgono assistenza con autonomia professionale limitata, espletando esclusivamente le funzioni previste dai propri codici deontologici | svolgono assistenza con autonomia professionale limitata, utilizzando metodologie di pianificazione per gli obiettivi dell'assistenza previste dalle norme istitutive dei relativi profili professionali | |